


Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Ingegneria del software

A.A. 2025/2026

Sessione di laurea Novembre/Dicembre 2026

# Rilevamento unsupervised di anomalie meteorologiche con reti generative avversarie spazio-temporali

Relatore:
Simone Monaco

Candidato:
Alberto Pedalino

# Indice

**Elenco delle figure** **iv**

**1 Introduzione** **1**
1.1 Contesto e motivazioni . . . . . 1
1.2 Anomalie meteorologiche senza etichette . . . . . 1
1.3 Approccio proposto . . . . . 2
1.4 Obiettivi e contributi della tesi . . . . . 3
1.5 Organizzazione del documento . . . . . 3

**2 Fondamenti teorici e stato dell'arte** **5**
2.1 Rilevamento di anomalie in serie multivariate e spazio-temporali 5
2.1.1 Dalla deviazione dal valore atteso ai modelli profondi . 6
2.1.2 Relazioni fra le serie e dati di addestramento contaminati 7
2.1.3 Reti generative avversarie per il rilevamento di anomalie 9
2.1.4 STGAN . . . . . 10
2.1.5 Il problema della valutazione . . . . . 12
2.2 Apprendimento automatico e dati meteorologici . . . . . 13
2.2.1 Dalla previsione numerica ai modelli basati sui dati . . 13
2.2.2 Eventi estremi e anomalie nei campi meteorologici . . . 14
2.3 Contesto spaziale su griglie e grafi . . . . . 15
2.4 Quantificazione dell'incertezza . . . . . 17
2.5 Da STGAN al rilevatore della tesi . . . . . 18
2.6 Posizionamento del lavoro . . . . . 20

**3 Dati e preprocessing** **22**
3.1 Campi ERA5 e dominio . . . . . 22
3.2 Acquisizione e preparazione dei dati . . . . . 24
3.3 Anni di addestramento, di validazione e di test . . . . . 27
3.4 Caratteristiche dei campi . . . . . 28
3.5 Qualità e limiti dei dati . . . . . 31
3.6 I dati PVGIS del lavoro preliminare . . . . . 32

**4 Metodologia** **35**
4.1 Formulazione del problema . . . . . 35
4.2 Architettura e addestramento avversario . . . . . 36
4.2.1 Generatore ConvGRU sul campo intero . . . . . 36
4.2.2 Discriminatore locale . . . . . 38
4.2.3 Obiettivi di addestramento . . . . . 39
4.3 Ingresso: finestra recente, codifica temporale e normalizzazione stagionale . . . . . 40
4.3.1 Finestra recente e trend . . . . . 40
4.3.2 Codifica temporale ciclica . . . . . 40
4.3.3 Normalizzazione stagionale . . . . . 41
4.4 Pesi delle variabili nell'errore di ricostruzione del generatore . 42
4.5 Valori esclusi negli anni di validazione . . . . . 43
4.6 Componenti dello score e dropout Monte Carlo . . . . . 45
4.6.1 Dropout nel generatore e nel discriminatore . . . . . 45
4.6.2 Estrazioni Monte Carlo e componenti dello score . . . . 45
4.6.3 Score combinato e score del rilevatore . . . . . 46
4.7 Normalizzazione climatologica degli score . . . . . 47

**5 Esperimenti** **49**
5.1 Misura di scelta della configurazione . . . . . 49
5.2 Configurazione e ricerca degli iperparametri . . . . . 50
5.3 Protocollo di valutazione . . . . . 52

**6 Risultati e discussione** **54**
6.1 Ricerca degli iperparametri . . . . . 54
6.2 G e D: un legame debole . . . . . 56
6.3 La normalizzazione climatologica . . . . . 60
6.4 Che cosa giudica il discriminatore . . . . . 60
6.5 Conferma sugli anni di test e scelta dello score . . . . . 67
6.6 Confronto con le baseline . . . . . 68
6.7 Cluster di segnalazioni per tipo e dimensione . . . . . 73
6.7.1 Un cluster per tipo . . . . . 79
6.8 La dispersione del dropout . . . . . 91
6.9 Anomalie meteorologiche note . . . . . 95
6.10 Sensibilità alla soglia . . . . . 95

**7 Conclusioni e sviluppi futuri** **98**
7.1 Il problema affrontato . . . . . 98
7.2 Sintesi dei risultati . . . . . 98
7.3 Sviluppi futuri . . . . . 98

**Bibliografia** **100**

# Elenco delle figure

2.1 Schema di STGAN. Il generatore combina tre rami e produce la stima $\hat{X}_{v,t} = G_\theta(v, t)$, che sostituisce l'ultimo elemento della sequenza reale; il discriminatore valuta entrambe le sequenze. Lo score somma l'errore di previsione e la differenza fra le due uscite del discriminatore. Ridisegnato a partire da Deng et al. [5]. . . . . 11

3.1 Dominio dei campi ERA5: $81 \times 131$ celle di 0.5°, fra 20° e 60° di latitudine nord e fra 15° di longitudine ovest e 50° di longitudine est. Il rettangolo indica l'area delle località PVGIS della Sezione 3.6, in Piemonte. Linee di costa da Natural Earth. 25

3.2 Dai file di ERA5 ai dati letti dal modello. I campi sono scaricati mese per mese dal Climate Data Store e conservati solo se superano la verifica; la preparazione li riunisce in array su disco, da cui il modello legge le sole finestre che usa. . . . . 26

3.3a Lo stesso mese ha livelli e variabilità diversi da una cella all'altra. 29

3.3b Il ciclo giornaliero cambia con il luogo e con la stagione. . . . 29

3.4 Con il min–max di STGAN la copertura nuvolosa domina; dopo la normalizzazione stagionale tutte le percentuali sono fra il 3.3% e il 16.6%, tranne quella dell'umidità del suolo (0.9%). Percentuale di ciascuna variabile nella variazione quadratica media su 24 ore (equazione (3.1)), dopo il min–max di STGAN e dopo la normalizzazione stagionale e il min–max del rilevatore, in scala logaritmica. Anni 1980–1999; le percentuali dopo la normalizzazione stagionale sono ricavate dai pesi della Sezione 4.4, che sono proporzionali all'inverso di $m_f$. La linea tratteggiata indica la percentuale uguale per tutte le variabili, un quindicesimo. . . . . 30

3.5 Precipitazione e copertura nuvolosa perdono la correlazione entro poche celle. Correlazione delle differenze dal normale per mese e ora di due celle in funzione della loro distanza: mediana e quartili per fasce di 100 km, su 300 celle scelte a caso e un istante ogni nove degli anni 1980–1999 (un passo dispari, che legge tutte le ore del giorno). Il primo punto, entro 100 km, si basa su 36 coppie di celle. . . . . 31
3.6 Le 1149 località dei dati PVGIS. Ogni punto è una posizione del reticolo con passo di 5 km per la quale sono disponibili le serie orarie. . . . . 33

4.1 Ordine dei passaggi del rilevatore su un istante, dai campi ERA5 alla segnalazione. In corsivo, gli anni su cui è stimata ciascuna quantità: le scale della normalizzazione stagionale e i pesi sugli anni di addestramento, la climatologia dello score e la soglia sugli anni di validazione. . . . . 36
4.2 Struttura del generatore (a) e del discriminatore (b). Il generatore unisce cella per cella i tre rami, recente, trend e calendario, e produce la ricostruzione dell'istante. Il discriminatore giudica ogni cella sulla propria patch, a partire dalla storia recente e dal campo corrente, osservato o ricostruito. I riquadri tratteggiati indicano i dropout, con probabilità 0.2 (Sezione 4.6). . . . . 37

6.1 La configurazione scelta è la prova con la distanza MMD più bassa. Le prove della ricerca degli iperparametri nel piano delle prime due componenti principali dei quattro iperparametri (71% della varianza). Il colore è la distanza MMD sugli anni di validazione, più scuro dove è più bassa; i cerchi arancioni indicano le tre prove della regione migliore. Nel riquadro, la direzione in cui cresce ciascun iperparametro: "tasso di appr." G e D sono i tassi di apprendimento del generatore e del discriminatore, peso $\lambda_G$ il peso di ricostruzione, "aggiornamenti D:G" gli aggiornamenti del discriminatore e del generatore per batch. La figura non mostra l'ordine delle prove, discusso nel testo. . . . . 55

6.2 Nello spazio G e D sono poco legati, e il legame cambia con la stagione: la correlazione di Spearman oscilla attorno a zero, quella di Pearson è negativa in circa due giorni su tre, soprattutto in estate. Correlazione spaziale fra G e D in ogni istante degli anni di validazione, calcolata sulle 10611 celle: media giornaliera (linea sottile) e media mobile su 30 giorni (linea spessa). . . . . 58
6.3 La correlazione nel tempo fra G e D è vicina a zero quasi ovunque: è negativa in due celle su tre, soprattutto a sud, e positiva in molte celle fra 35° e 50°N. Correlazione temporale di Spearman fra G e D in ogni cella, sugli anni di validazione. Il blu indica che D scende quando G sale, il rosso che i due salgono insieme; la scala va da $-0.3$ a 0.3, e la freccia indica che alcune celle superano 0.3. La cornice rossa lungo il margine del dominio è probabilmente un effetto del modello. Linee di costa da Natural Earth. . . . . 59
6.4a Senza normalizzazione le segnalazioni di G si concentrano a sud e in estate. . . . . 61
6.4b Con la normalizzazione climatologica le segnalazioni sono distribuite in modo quasi uniforme. . . . . 61
6.5a In ogni luogo il giudizio del discriminatore sull'osservazione scende quando G sale: tutte le celle sono blu, con correlazioni intorno a $-0.7$. . . . . 62
6.5b Lo stesso vale per il giudizio sulla ricostruzione. . . . . 62
6.6 Le tre zone attorno a un cluster, in un istante, su una porzione della griglia: il nucleo, il contorno e la zona lontana; le celle intermedie non rientrano in nessuna. Ogni quadrato è una cella. 63
6.7 Nel nucleo dei cluster di $G_{\mathrm{n}}$ il discriminatore giudica reali sia l'osservazione sia la ricostruzione, e D, la differenza dei due giudizi, è al percentile 27. Percentile mediano di $G_{\mathrm{n}}$, di G, di $D_{\mathrm{reale}}$, di $D_{\mathrm{generato}}$ e di D nel nucleo dei cluster di $G_{\mathrm{n}}$, nel loro contorno e nella zona lontana, sugli anni di validazione. La linea tratteggiata indica 50, il valore atteso senza legame con i cluster. $G_{\mathrm{n}}$, che definisce i cluster, e G, l'errore di ricostruzione del generatore senza normalizzazione come nello score combinato, sono alti nel nucleo quasi per costruzione e servono da riferimento. . . . . 64
6.8a G, l'errore di ricostruzione del generatore, il 9 agosto 2003 alle 12 UTC, l'istante con la media di G più alta degli anni di validazione, come percentile fra le celle di quell'istante. . . . . 66
6.8b Dove G è più alto, D è fra i valori più bassi. . . . . 66

6.9 I metodi che leggono una cella in un istante formano un gruppo (nel riquadro), la variazione in tre ore resta da parte, e $G_{\mathrm{n}}$ si sovrappone a entrambi. Indice di Jaccard delle segnalazioni di ogni coppia di metodi sugli anni di test, in percentuale, con la soglia di ciascuno al 95-esimo percentile del proprio score sugli anni di validazione; ogni coppia compare una volta. . . . . 71
6.10 I cluster sono quasi tutti piccoli, ma i valori segnalati stanno quasi tutti in pochi cluster enormi. I cluster di $G_{\mathrm{n}}$ sugli anni di test, divisi per dimensione, cioè per numero di valori segnalati (coppie cella–istante) che contengono: piccoli (meno di 20), medi (da 20 a 999) ed enormi (1000 o più). In alto la percentuale dei cluster di ciascuna classe, in basso la percentuale dei valori segnalati che vi stanno. Un cluster di un solo valore, il più frequente, è una cella segnalata in un solo istante, senza segnalazioni accanto né subito prima o dopo. . . . . 74
6.11 Il tipo dominante dipende dal metodo: in $G_{\mathrm{n}}$ e nella variazione in tre ore dominano velocità verticale e precipitazione, nella distanza dal normale e in CBLOF l'umidità del suolo, in COPOD e HBOS la velocità d'attrito. Percentuale dei valori segnalati per tipo di cluster, sugli anni di test, per tutti i quindici tipi: nei cluster di $G_{\mathrm{n}}$ (prima colonna) e in quelli di ciascuna baseline, ognuno formato dalle proprie segnalazioni. I tipi sono ordinati dal più frequente in $G_{\mathrm{n}}$; ogni colonna somma a 100, e più il colore è scuro, più la percentuale è alta. . . . . 76
6.12a $G_{\mathrm{n}}$ cala più lentamente di quasi tutte le baseline. . . . . 77
6.12b Sui cluster di $G_{\mathrm{n}}$ tutte le baseline calano allo stesso modo di $G_{\mathrm{n}}$. 77
6.13a $G_{\mathrm{n}}$ cala allo stesso modo per tutti i tipi di cluster. . . . . 80
6.13b Le variabili, invece, calano in modo diverso: alcune tornano ai livelli di fondo entro due celle fuori dal bordo del cluster, come la precipitazione, altre restano a lungo lontane dal normale, come la temperatura a due metri. . . . . 80
6.13c $G_{\mathrm{n}}$ non è il solo a calare allo stesso modo per tutti i tipi di cluster: è fra i metodi più uniformi, con la variazione in tre ore, HBOS e COPOD, mentre la distanza dal normale, MCD e PCA cambiano di 20 su 100 o più da un tipo all'altro. . . . 81
6.14a Il nucleo è una fascia stretta in cui la velocità verticale è per lo più sotto il normale. . . . . 83
6.14b $G_{\mathrm{n}}$ nello stesso istante della Figura 6.14a, come percentile, con lo stesso nucleo e la stessa cella. . . . . 83

6.14c Nella cella cerchiata $G_{\mathrm{n}}$ resta oltre la soglia, salvo una breve pausa, per circa un giorno e mezzo, e la distanza dal normale sale e scende insieme a $G_{\mathrm{n}}$. . . . . 83
6.14d Il cluster dal nucleo verso l'esterno, nell'istante delle mappe: percentile mediano di ogni score secondo le celle dal bordo del cluster, con le baseline come nella Figura 6.12a; fuori, solo le celle più vicine a questo nucleo che ad altre segnalazioni. . . . 84
6.15a Il nucleo è diviso in più parti, in cui la precipitazione è quasi ovunque sopra il normale. . . . . 86
6.15b $G_{\mathrm{n}}$ nello stesso istante della Figura 6.15a, come percentile, con lo stesso nucleo e la stessa cella. . . . . 86
6.15c Nella cella cerchiata la distanza dal normale è alta già nei giorni prima, e $G_{\mathrm{n}}$ supera la soglia solo quando arriva la precipitazione. . . . . 86
6.15d Il cluster dal nucleo verso l'esterno, nell'istante delle mappe: percentile mediano di ogni score secondo le celle dal bordo del cluster, con le baseline come nella Figura 6.12a; fuori, solo le celle più vicine a questo nucleo che ad altre segnalazioni. . . . 87
6.16a Il nucleo è una fascia stretta sull'Africa nord-occidentale in cui la copertura nuvolosa è quasi ovunque sopra il normale. . 89
6.16b $G_{\mathrm{n}}$ nello stesso istante della Figura 6.16a, come percentile, con lo stesso nucleo e la stessa cella. . . . . 89
6.16c Nella cella cerchiata $G_{\mathrm{n}}$ e la distanza dal normale salgono e scendono insieme, e $G_{\mathrm{n}}$ resta oltre la soglia per dodici ore. . . 89
6.16d Il cluster dal nucleo verso l'esterno, nell'istante delle mappe: percentile mediano di ogni score secondo le celle dal bordo del cluster, con le baseline come nella Figura 6.12a; fuori, solo le celle più vicine a questo nucleo che ad altre segnalazioni. . . . 90
6.17a In proporzione a G la dispersione del dropout è quasi costante, e cala solo sui valori di G più alti. . . . . 93
6.17b Attraverso i cluster il rapporto è quasi costante, con un minimo poco dentro il bordo. . . . . 93
6.17c A parità di G, più dispersione va con dati più lontani dal normale, fino alla penultima classe. . . . . 93
6.18a La dispersione del dropout è più alta a sud e lungo il margine del dominio. . . . . 94
6.18b Il rapporto fra dispersione e G varia poco nel dominio. . . . . 94

# Capitolo 1

# Introduzione

## 1.1 Contesto e motivazioni

Le anomalie meteorologiche, cioè condizioni dell'atmosfera lontane da quelle abituali, come una perturbazione intensa, una tempesta di vento o un'ondata di caldo, sono i casi in cui i modelli addestrati su dati storici tendono a sbagliare di più [1]. Il lavoro è nato in questo contesto, nell'ambito della previsione della produzione fotovoltaica [2], dove un previsore è affidabile nelle condizioni che i dati di addestramento rappresentano bene e meno in quelle poco frequenti. Riconoscere queste condizioni è però un problema a sé, distinto dalla previsione: richiede di stabilire, per ogni luogo e ogni istante, quanto le condizioni osservate si allontanano da quelle abituali. È il compito del rilevamento di anomalie, a cui questa tesi è dedicata.

I campi meteorologici delle rianalisi, come ERA5 [3], descrivono lo stato dell'atmosfera su una griglia regolare, con molte variabili e per diversi decenni. Sono quindi una base adatta per cercare anomalie in modo sistematico, su un dominio ampio e senza limitarsi alle grandezze di un singolo impiego.

## 1.2 Anomalie meteorologiche senza etichette

Tre caratteristiche dei dati rendono il problema difficile e guidano le scelte dei capitoli successivi.

La prima è l'assenza di etichette. Non esiste un elenco completo di anomalie meteorologiche con cui addestrare un classificatore o misurare direttamente l'accuratezza di un rilevatore. Il rilevamento deve essere unsupervised e la sua valutazione deve ricorrere a strumenti indiretti.

La seconda è che i dati di addestramento non sono garantiti privi di anomalie. Molti rilevatori apprendono il comportamento normale da un

insieme che si assume pulito [4]; con dati meteorologici non etichettati questa ipotesi non è verificabile. Ne segue una scelta di obiettivo: rilevare le condizioni nuove rispetto agli anni di addestramento. Le anomalie presenti negli anni di addestramento, nella misura in cui il modello le apprende, non vengono segnalate.

La terza è la struttura spaziale. Le condizioni di un luogo dipendono da quelle dei luoghi vicini, e un valore ordinario preso da solo può essere insolito rispetto a ciò che accade nei luoghi vicini. I campi non hanno però una topologia fisica, come il grafo di sensori stradali o di regioni confinanti su cui è costruito STGAN [5]: sono disposti su un reticolo regolare, e il modo di rappresentare l'intorno va scelto.

Il termine anomalia meteorologica indica in questa tesi una condizione dell'atmosfera che si allontana da quella abituale per il luogo e il periodo dell'anno. Il rilevatore non la osserva direttamente: uno score misura quanto un valore, cioè una coppia cella–istante, si allontana da ciò che il modello ha appreso dagli anni di addestramento, e sono segnalati i valori con lo score più alto. Una segnalazione indica quindi una possibile anomalia meteorologica, non un'anomalia accertata. Un evento meteorologico estremo è un caso particolare di anomalia meteorologica, ma non ogni anomalia è un evento estremo.

## 1.3 Approccio proposto

Il rilevatore parte da STGAN [5], una rete avversaria proposta per il rilevamento di anomalie nel traffico: un generatore stima i valori dell'istante successivo a partire dal contesto spaziale e temporale, un discriminatore giudica se una sequenza è osservata o generata, e lo score combina i due. In questa tesi lo schema è portato sui campi ERA5, con quindici variabili in superficie e a 850 hPa, ogni tre ore, su un dominio che comprende l'Europa, il Mediterraneo e parte dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente; rispetto a STGAN il rilevatore cambia in quattro punti:

1. un generatore che opera sul campo intero con un'unità ricorrente convoluzionale, la ConvGRU [6, 7], mentre il discriminatore resta locale e giudica ogni cella sulla sua patch $3 \times 3$;

2. un ingresso riferito al clima di ogni cella, con una normalizzazione stagionale, e un errore di ricostruzione del generatore in cui ogni variabile pesa in proporzione inversa a quanto essa cambia abitualmente;

3. uno score riferito alla climatologia di ogni cella e il dropout Monte Carlo [8] nelle due reti, che associa a ogni score una misura di dispersione;

4. una validazione senza etichette, in cui i valori più insoliti, individuati con un criterio che non usa il modello, sono in gran parte tenuti fuori dalla misura con cui si scelgono gli iperparametri dell'addestramento avversario e tolti dalla climatologia dello score; gli anni di test non entrano in alcuna scelta.

## 1.4 Obiettivi e contributi della tesi

Obiettivo della tesi è rilevare anomalie meteorologiche nei campi ERA5 senza etichette, adattando STGAN. Più precisamente, il lavoro si chiede se l'errore di ricostruzione del generatore e la componente del discriminatore segnalino gli stessi valori, e quale dei due usare. La tesi mostra anzitutto che non concordano: dove il primo segnala un valore insolito, il secondo in genere non lo segnala. Sommati, come nello score combinato dell'articolo, mescolano due segnali in disaccordo e danno uno score che ordina i valori quasi come il solo discriminatore. Poiché l'errore di ricostruzione del generatore ha un significato chiaro, mentre la componente del discriminatore si spiega solo in parte, il rilevatore usa l'errore di ricostruzione del generatore riferito alla climatologia di ogni cella, $G_{\mathrm{n}}$, che rende quasi uniforme la percentuale di segnalazioni fra luoghi e stagioni.

$G_{\mathrm{n}}$ è poi confrontato con otto metodi più semplici, le baseline, ciascuno con la soglia allo stesso percentile. Si sovrappone sia ai metodi che leggono una cella in un istante sia alla variazione in tre ore, che misura il cambiamento rapido, senza coincidere con nessuno: la baseline più vicina, la variazione in tre ore, segnala il 54% dei valori segnalati da $G_{\mathrm{n}}$.

Le segnalazioni a contatto nello spazio e nel tempo formano cluster di segnalazioni. Circa tre quarti dei valori segnalati stanno in pochi cluster molto estesi, per lo più catene di segnalazioni a contatto più che singole anomalie meteorologiche; in tutti i metodi i cluster con almeno 1000 valori contengono fra il 60% e l'86% dei valori segnalati. Infine, tre valori segnalati su quattro restano sopra la soglia anche togliendo a $G_{\mathrm{n}}$ la sua dispersione, cioè quanto lo score cambia ripetendo il calcolo con maschere di dropout diverse.

## 1.5 Organizzazione del documento

Il resto della tesi è organizzato come segue.

- **Capitolo 2 (Fondamenti teorici e stato dell'arte):** presenta i lavori su cui la tesi è costruita, per temi, dai lavori che hanno definito

ciascun problema ai più recenti, e si chiude con il modo in cui la tesi adatta STGAN e con la sua posizione rispetto ai lavori esaminati.

- **Capitolo 3 (Dati e preprocessing):** descrive i campi ERA5, il dominio, la loro preparazione, la divisione in anni di addestramento, di validazione e di test, le caratteristiche e i limiti dei campi, e i dati PVGIS da cui il lavoro è partito.
- **Capitolo 4 (Metodologia):** descrive il rilevatore: l'architettura e l'addestramento avversario, l'ingresso con la normalizzazione stagionale, i pesi delle variabili, i valori esclusi dalle misure sugli anni di validazione, lo score con il dropout Monte Carlo e la normalizzazione climatologica.
- **Capitolo 5 (Esperimenti):** descrive la misura usata per scegliere la configurazione senza etichette, la configurazione, la ricerca degli iperparametri e il protocollo di valutazione.
- **Capitolo 6 (Risultati e discussione):** riporta l'esito della ricerca degli iperparametri, studia le componenti dello score e sceglie quella da usare, confronta le segnalazioni con le otto baseline, descrive i cluster di segnalazioni per tipo e dimensione con un esempio per ciascuno dei tre tipi principali, ed esamina la dispersione del dropout e la dipendenza dalla soglia.
- **Capitolo 7 (Conclusioni e sviluppi futuri):** riassume il lavoro e ne indica gli sviluppi futuri.

# Capitolo 2

# Fondamenti teorici e stato dell'arte

Il capitolo presenta i fondamenti teorici e i lavori su cui la tesi è costruita. Ogni tema è trattato come un percorso: dai lavori che ne hanno definito il problema a quelli più recenti, fino al metodo che la tesi riprende. Il percorso del capitolo segue quello del lavoro: partito da dati fotovoltaici PVGIS (Sezione 3.6) con il rilevatore MTGFlow, è passato a STGAN sui campi ERA5 per rappresentare il contesto spaziale fra luoghi diversi. Per ciascun lavoro sono indicati ciò che propone, ciò che ottiene e il limite che lascia aperto, che spesso è il punto da cui parte il lavoro successivo. Che cosa ne prende la tesi è detto alla fine di ogni tema e, per STGAN, nella Sezione 2.5. I lavori su cui il rilevatore si basa direttamente sono descritti più a fondo, con le relative formule. I temi sono quattro: il rilevamento di anomalie in serie temporali, l'apprendimento automatico applicato ai dati meteorologici, il contesto spaziale su griglie e grafi, la quantificazione dell'incertezza. Una sezione descrive poi il modo in cui la tesi adatta STGAN, e l'ultima riassume la posizione della tesi rispetto ai lavori esaminati.

## 2.1 Rilevamento di anomalie in serie multivariate e spazio-temporali

Questa sezione va dalle definizioni di anomalia ai metodi basati su reti profonde, e arriva a STGAN, la base del rilevatore. Lungo il percorso due criteri guidano la scelta del rilevatore: la tolleranza alla presenza di anomalie nei dati di addestramento, che senza etichette non si possono escludere, e la rappresentazione del contesto spaziale fra luoghi diversi. La sezione si

chiude con il problema della valutazione e con i metodi semplici usati come confronto.

### 2.1.1 Dalla deviazione dal valore atteso ai modelli profondi

Nella rassegna di Gupta et al. [9] sui dati temporali, un'anomalia è definita in generale come una deviazione dal valore atteso o previsto. Per i dati spazio-temporali la rassegna riprende una definizione più specifica: un'osservazione è anomala quando le sue grandezze differiscono in modo significativo da quelle degli oggetti vicini nello spazio e nel tempo. I metodi che la rassegna raccoglie per questi dati procedono per lo più in due passi, prima cercando le anomalie spaziali e poi verificandole rispetto ai vicini temporali, con intorni fissati a mano; fra le applicazioni figurano anche dati ambientali e meteorologici, come serie di precipitazione e campi di rianalisi. I metodi esaminati precedono l'uso diffuso delle reti profonde e trattano grandezze scalari o singoli oggetti, non campi multivariati considerati insieme.

La rassegna di Zamanzadeh Darban et al. [10] raccoglie i metodi profondi per serie temporali e li divide secondo il segnale da cui ricavano lo *score*: la *previsione* del valore successivo, la *ricostruzione* dell'osservazione, una rappresentazione appresa, oppure una combinazione delle prime due. Distinzioni analoghe compaiono nei lavori più recenti esaminati più avanti [11, 12]. Le reti generative avversarie vi figurano fra i metodi a ricostruzione; gli autori ne indicano come limite l'addestramento, che richiede di bilanciare generatore e discriminatore ed è instabile e difficile da far convergere. Nella rassegna il termine spaziale indica le dipendenze fra le variabili di una serie, non fra luoghi geografici; fra i dataset raccolti non compaiono campi meteorologici su griglia, e i lavori su dati geografici, come STGAN, sono citati soltanto fra le applicazioni urbane e al traffico.

Due lavori mostrano i due segnali principali e il loro limite comune, cioè l'assenza di relazioni fra le serie. Malhotra et al. [13] propongono un *encoder–decoder* basato su LSTM (*long short-term memory*), addestrato a ricostruire finestre di serie normali: una finestra anomala, che il modello non ha imparato a ricostruire, produce un errore più alto, e lo score è la distanza di Mahalanobis del vettore degli errori dalla loro distribuzione sui dati normali. La soglia di decisione è però scelta massimizzando un indice di accuratezza su sequenze anomale etichettate, e negli esperimenti con più sensori le serie sono ridotte alla prima componente principale: il metodo, quindi, non è interamente unsupervised e non modella più variabili insieme. Hundman et al. [14] seguono la via della previsione per la telemetria di veicoli spaziali:

una LSTM per canale prevede il valore successivo, e gli errori, smussati, sono confrontati con una soglia scelta senza etichette, che separa i valori più alti dal resto della distribuzione degli errori. Sui due insiemi di dati dell'articolo il metodo raggiunge una precisione dell'87.5% e un richiamo dell'80.0% [14]. Gli autori indicano fra i limiti le interazioni fra i canali, che un modello per canale non rappresenta, e osservano che la qualità del rilevamento dipende da quella della previsione.

Anche i modelli più complessi non risolvono questo limite. Xu et al. [15] introducono Anomaly Transformer, in cui l'attenzione di un Transformer è affiancata da una distribuzione a priori concentrata sui punti vicini. Il criterio è che un'osservazione anomala, essendo rara, non riesce a stabilire legami con il resto della serie e concentra l'attenzione sui punti adiacenti; lo score moltiplica l'errore di ricostruzione per una funzione della differenza fra le due distribuzioni. La soglia è fissata senza etichette, come la percentuale di score più alti su un periodo di validazione. Le variabili sono riunite in un unico vettore per istante e lo score è uno per istante: il metodo non rappresenta relazioni spaziali e non localizza l'anomalia fra le variabili. I risultati dell'articolo sono misurati con un criterio che considera rilevato un intero segmento anomalo quando ne è segnalato anche un solo punto [15].

### 2.1.2 Relazioni fra le serie e dati di addestramento contaminati

Una linea di lavori rappresenta le relazioni fra le serie con un grafo appreso dai dati, quando queste relazioni non sono note. Deng e Hooi [16] propongono GDN per i sensori di impianti industriali: a ogni sensore è associato un vettore appreso, i vicini di ciascun sensore sono i più simili secondo questi vettori, e un'attenzione su grafo prevede il valore successivo di ogni sensore. L'errore di ogni sensore è normalizzato con la sua mediana e il suo intervallo interquartile, e lo score di un istante è il massimo sui sensori, perché un'anomalia può interessarne anche uno soltanto; la soglia è il massimo dello score su un periodo di validazione. Il grafo collega sensori di uno stesso impianto, non luoghi, e si assume che i dati di addestramento siano normali.

Zhou et al. [4] rimuovono questa ipotesi: osservano che gran parte dei metodi presuppone dati di addestramento composti da sole osservazioni normali, e che quando contengono anomalie le prestazioni possono degradare sensibilmente. Il loro metodo, MTGFlow, stima la densità dell'intero insieme di addestramento e identifica come anomale le osservazioni di test a bassa densità, sotto l'ipotesi che le anomalie occupino regioni più sparse. Le dipendenze fra entità sono apprese come grafo dinamico e un *normalizing flow* specifico

per entità associa a ciascuna una distribuzione normale parametrizzata. La soglia è ricavata dall'intervallo interquartile degli score di addestramento e lo score per entità consente di localizzare l'anomalia.

Le entità di MTGFlow sono i sensori o le variabili di un unico sistema e la valutazione usa dataset pubblici di riferimento: il grafo è appreso dai dati e descrive relazioni fra variabili, non fra siti geografici distinti. Un'estensione assegna una distribuzione comune alle entità di uno stesso gruppo, quando è noto che hanno caratteristiche simili. Il raggruppamento esprime soltanto che certe entità possono comportarsi allo stesso modo: non modella vicinanza, distanze o propagazione nello spazio, e non rende il metodo un rilevatore spazio-temporale.

MTGFlow è stato il primo rilevatore esaminato nel lavoro, per la sua robustezza alla presenza di anomalie nei dati di addestramento: per le condizioni meteorologiche non sono disponibili etichette, quindi non è possibile garantire dati di addestramento composti da sole osservazioni normali. È stato applicato ai dati PVGIS del lavoro preliminare. Non rappresenta però il contesto geografico.

I due lavori più recenti esaminati tornano all'ipotesi di dati di addestramento normali. Wu et al. [11] propongono CATCH, un metodo basato su ricostruzione nel dominio della frequenza. Lo spettro è suddiviso in bande, trattate come *patch*, per cogliere caratteristiche a grana fine; un modulo di fusione dei canali, con un generatore di maschere e un'attenzione mascherata, seleziona per ciascuna banda le correlazioni fra canali ritenute utili e isola quelle irrilevanti. Il metodo mira a rilevare insieme anomalie puntuali e di sottosequenza ed è valutato su dataset reali e sintetici. Lo score di anomalia è l'errore di ricostruzione: il modello impara a ricostruire i pattern normali, e nei dataset sintetici dell'articolo le anomalie sono inserite soltanto nella serie di test. Il caso di anomalie presenti nei dati di addestramento non è trattato. I canali sono le variabili di una serie multivariata: non è prevista una struttura geografica fra serie di siti diversi. Gli autori segnalano inoltre che anomalie più lunghe della finestra osservata non vengono colte efficacemente.

Alnegheimish et al. [12] propongono M2AD, per serie multivariate provenienti da più sistemi. Un modello LSTM apprende il comportamento atteso dei sensori. I residui fra valori attesi e osservati sono aggregati in uno score globale mediante un modello a miscela gaussiana e una calibrazione Gamma. La soglia è stimata dagli score osservati in addestramento, e i sensori sono ordinati per contributo allo score. Il metodo assume che i dati di addestramento siano privi di anomalie e che addestramento e test abbiano andamenti simili; gli autori indicano come limite il caso in cui la distribuzione cambia, che richiede un nuovo addestramento.

CATCH e M2AD sono stati presi in esame come alternative a MTGFlow

e non sono stati adottati, per due ragioni. Richiedono dati di addestramento privi di anomalie, una condizione che senza etichette non è verificabile sui dati meteorologici; e, come MTGFlow, non rappresentano relazioni fra luoghi geografici. Nessuno dei due è stato eseguito sui dati della tesi. Dei due criteri della sezione, quindi, il primo ha portato a MTGFlow, il secondo, che nessuno di questi metodi soddisfa, a STGAN, che offre il contesto spaziale al prezzo di presupporre dati di addestramento normali.

### 2.1.3 Reti generative avversarie per il rilevamento di anomalie

Una rete generativa avversaria [17] è formata da due reti, addestrate insieme con obiettivi opposti. Il generatore $G$ trasforma un rumore $z$, estratto da una distribuzione nota $p_z$, in un campione $G(z)$; i dati reali seguono la distribuzione $p_{\text{data}}$ e il discriminatore $D$ restituisce la probabilità $D(x)$ che un campione $x$ provenga dai dati reali anziché dal generatore. Le due reti sono addestrate sulla stessa funzione, che il discriminatore massimizza e il generatore minimizza:

$$\min_G \max_D V(D,G) = \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}}\Big[\log D(x)\Big] + \mathbb{E}_{z\sim p_z}\Big[\log\Big(1 - D(G(z))\Big)\Big]. \quad (2.1)$$

Il primo termine cresce quando il discriminatore riconosce i dati reali, il secondo quando riconosce i campioni generati; il generatore è addestrato a rendere i propri campioni indistinguibili da quelli reali. Entrambe le reti sono ottimizzate con la retropropagazione. Lo stesso articolo osserva che, all'inizio dell'addestramento, il secondo termine fornisce al generatore un gradiente debole, e propone in alternativa di addestrarlo a massimizzare $\log D(G(z))$.

Schlegl et al. [18] usano per primi questo schema per il rilevamento di anomalie, con AnoGAN, su immagini di tomografia della retina. La rete è addestrata soltanto su immagini sane; poiché una GAN non fornisce la trasformazione inversa da un'immagine al rumore che la genera, per ogni immagine da valutare il rumore è cercato con un'ottimizzazione iterativa, a reti fissate. Lo score somma due termini: la differenza fra l'immagine e quella generata, e la distanza fra le rispettive caratteristiche in uno strato intermedio del discriminatore. Sui dati dell'articolo lo score completo raggiunge un'area sotto la curva ROC di 0.89; preso da solo, il termine di ricostruzione arriva a 0.88, quello del discriminatore a 0.74 [18]. Li et al. [19] estendono l'idea alle serie temporali multivariate di impianti industriali con MAD-GAN, in cui generatore e discriminatore sono LSTM e tutte le variabili sono modellate insieme, dopo una riduzione con le componenti principali. Lo score combina, con un peso, l'errore di ricostruzione, ottenuto ancora con un'inversione

iterativa nello spazio latente, e l'uscita del discriminatore. L'articolo non indica come scegliere quel peso né la soglia, e i risultati migliori sono selezionati fra più configurazioni; gli autori segnalano inoltre una forte oscillazione del richiamo da un'epoca all'altra, che attribuiscono all'instabilità del rilevamento basato su GAN [19]. Nessuno dei due metodi rappresenta relazioni spaziali fra le serie.

Nel rilevatore della tesi lo schema è usato in forma condizionata: il generatore riceve il contesto di un'osservazione e ne produce una stima. L'uso per il rilevamento di anomalie poggia su un'ipotesi di lavoro: che la stima sia accurata nelle condizioni frequenti nei dati di addestramento e meno accurata in quelle poco rappresentate. È un'ipotesi e non una proprietà garantita dall'addestramento. Se vale, se ne ricavano due segnali: l'errore fra l'osservazione e la stima del generatore, e il giudizio del discriminatore sull'osservazione. Già in AnoGAN, preso da solo, il termine del discriminatore rileva meno di quello di ricostruzione. STGAN, descritto di seguito, li combina in un unico score.

### 2.1.4 STGAN

Deng et al. [5] propongono una rete avversaria per il rilevamento di anomalie del traffico. Il generatore prevede la dinamica normale combinando tre rami: un ramo recente, basato su unità ricorrenti con convoluzione su grafo, per le dipendenze spazio-temporali di breve periodo, un ramo per il trend di lungo periodo e uno per le variabili esterne. Il discriminatore stabilisce se una sequenza è reale o generata in funzione dei vicini nello spazio e nel tempo, fornendo un criterio che varia con località e istante. Dopo l'addestramento avversario entrambe le reti agiscono da rilevatore e uno score ne combina i contributi. Il grafo deriva da una topologia fisica, cioè sensori adiacenti sulla stessa strada o regioni con confini comuni, e la valutazione misura il richiamo rispetto a incidenti ed eventi documentati, che gli autori stessi indicano come verità di riferimento incompleta. L'articolo non discute la presenza di anomalie nei dati di addestramento: il discriminatore è addestrato considerando normali le sequenze reali e anomale quelle generate, quindi l'ipotesi di dati di addestramento normali è implicita. La Figura 2.1 riassume la struttura del metodo.

Sia $x_{v,t}$ l'osservazione del nodo $v$ all'istante $t$ e $X_{v,t}$ l'insieme delle osservazioni nel sottografo formato da $v$ e dai suoi vicini. Sia poi $S_{v,t}$ la sequenza reale dei valori del sottografo che termina con $X_{v,t}$, e $\hat{S}_{v,t}$ la stessa sequenza in cui l'ultimo elemento è sostituito dalla stima $\hat{X}_{v,t} = G_\theta(v,t)$ del generatore.





Figura 2.1: Schema di STGAN. Il generatore combina tre rami e produce la stima $\hat{X}_{v,t} = G_\theta(v,t)$, che sostituisce l'ultimo elemento della sequenza reale; il discriminatore valuta entrambe le sequenze. Lo score somma l'errore di previsione e la differenza fra le due uscite del discriminatore. Ridisegnato a partire da Deng et al. [5].

Gli obiettivi di addestramento dell'articolo sono

$$\mathcal{L}_G(\theta) = \sum_s -\log\Big(1 - D_\phi(\hat{S}_{v,t})\Big) + \lambda_G \, \|G_\theta(v,t) - X_{v,t}\|_2, \tag{2.2}$$

$$\mathcal{L}_D(\phi) = \sum_s -\log\Big(D_\phi(\hat{S}_{v,t})\Big) - \log\Big(1 - D_\phi(S_{v,t})\Big), \tag{2.3}$$

dove la somma è sui punti $s = \langle v, t, x_{v,t}\rangle$ e $\lambda_G$ bilancia l'errore di previsione e il termine avversario. Lo score combina le due reti:

$$\begin{aligned} s_D(v,t) &= D_\phi(S_{v,t}) - D_\phi(\hat{S}_{v,t}), \\ s_G(v,t) &= \|G_\theta(v,t) - X_{v,t}\|_2, \\ \text{score}(v,t) &= s_G(v,t) + \lambda\, s_D(v,t). \end{aligned} \tag{2.4}$$

La componente del discriminatore non è la sua uscita sulla sequenza reale ma la differenza rispetto alla sequenza generata: gli autori la introducono per ridurre l'effetto dell'imprevedibilità dei dati reali. Negli esperimenti dell'articolo $\lambda_G = 500$, le due componenti sono normalizzate e $\lambda = 1$.

Rispetto all'equazione (2.1), in STGAN il significato dell'uscita del discriminatore è invertito: le sequenze reali sono trattate come normali e quelle generate come anomale, e il discriminatore è spinto verso 1 sulle sequenze

generate e verso 0 su quelle reali. Per il discriminatore l'obiettivo è lo stesso a meno di questo scambio, ma la sua uscita cresce con il sospetto di anomalia e può essere usata per costruire lo score. Il termine avversario dell'equazione (2.2) è la forma alternativa dell'obiettivo del generatore proposta da Goodfellow et al., scritta in questa convenzione, a cui si aggiunge l'errore di previsione.

Il generatore di STGAN stima i valori dell'istante corrente a partire dagli istanti precedenti, e l'articolo chiama *errore di previsione* la differenza fra stima e osservazione. Nella tesi il generatore stima allo stesso modo il campo di un istante dal contesto che lo precede, e la stessa differenza è chiamata *errore di ricostruzione del generatore*: i due termini indicano la stessa grandezza. Nella classificazione della rassegna di Zamanzadeh Darban et al. lo score rientrerebbe quindi fra quelli basati sulla previsione, anche se le reti avversarie vi figurano fra i metodi a ricostruzione.

La tesi riprende l'architettura a tre rami e gli obiettivi avversari, e mantiene lo score combinato come riferimento; il modo in cui li adatta ai campi meteorologici è descritto nella Sezione 2.5. Rispetto alle equazioni (2.2)–(2.4), la forma implementata segue il codice pubblicato dagli autori, con l'errore quadratico medio al posto della norma e la loss del discriminatore dimezzata (Sezione 4.2.3); lo score è descritto nella Sezione 4.6. L'addestramento richiede un equilibrio fra le due reti: il peso di ricostruzione $\lambda_G$, 500 negli esperimenti dell'articolo, i tassi di apprendimento delle due reti e il numero di aggiornamenti per *batch* sono scelti nella tesi con la ricerca degli iperparametri (Sezione 5.2).

### 2.1.5 Il problema della valutazione

I risultati dei lavori precedenti sono misurati su dataset etichettati, e la loro affidabilità dipende da quella delle etichette. Wu e Keogh [20] esaminano i dataset più usati per le serie temporali univariate e vi riscontrano quattro difetti ricorrenti. Il primo è che molti problemi si risolvono con una sola riga di codice basata su operazioni elementari, come media, deviazione standard e differenze successive: una riga di questo tipo risolve 316 delle 367 serie di uno dei dataset. Gli altri sono una densità di anomalie poco realistica, etichette errate o mancanti, e anomalie concentrate verso la fine delle serie. Gli autori ne concludono che parte dei progressi riportati può essere apparente, e raccomandano di confrontare ogni metodo con soluzioni banali e di esaminare sempre visivamente dati e score. L'analisi riguarda serie univariate e non tratta campi multivariati su griglia; le sue indicazioni valgono però anche in assenza di etichette, dove il confronto con metodi semplici e l'esame diretto di mappe e serie degli score restano gli strumenti disponibili.

Liu e Paparrizos [21] riprendono il problema con TSB-AD, un insieme di 1070 serie, univariate e multivariate, ricontrollate a mano, su cui confrontano quaranta rilevatori con gli stessi dati e la stessa procedura di scelta dei parametri. Mostrano che il criterio che considera rilevato un intero segmento quando ne è segnalato un solo punto premia anche uno score casuale, e adottano misure che non dipendono da una soglia. Con queste misure i metodi non neurali sono spesso fra i migliori, con un'analisi per componenti principali in testa fra le serie univariate; fra le multivariate prevalgono reti semplici, convoluzionali o ricorrenti, e lo stesso metodo per componenti principali, mentre Anomaly Transformer risulta ultimo in entrambi i gruppi. Anche TSB-AD richiede etichette, non contiene campi su griglia e non studia dati di addestramento contaminati da anomalie; ne resta l'indicazione che un rilevatore appreso va sempre confrontato con metodi semplici, perché la sua superiorità non è scontata.

Per questi motivi le segnalazioni del rilevatore sono confrontate con sei modelli shallow, scelti fra i metodi non neurali valutati in TSB-AD, cioè l'analisi per componenti principali (PCA), CBLOF (*cluster-based local outlier factor*), MCD (*minimum covariance determinant*), HBOS (*histogram-based outlier score*), COPOD (*copula-based outlier detection*) e Isolation Forest, e con due metodi statistici semplici, la distanza dal normale e la variazione in tre ore: in tutto otto baseline (Sezione 6.6).

## 2.2 Apprendimento automatico e dati meteorologici

Questa sezione descrive come l'apprendimento automatico è stato applicato ai campi meteorologici, prima per prevederli e poi per riconoscerne gli eventi estremi, e mostra che il rilevamento unsupervised di anomalie su tutti gli stati di una rianalisi non è stato affrontato nei lavori esaminati.

### 2.2.1 Dalla previsione numerica ai modelli basati sui dati

La previsione meteorologica numerica tratta l'evoluzione dell'atmosfera come un problema ai valori iniziali: le equazioni che la governano sono integrate a partire dallo stato osservato, e i processi di scala inferiore alla griglia, come convezione, radiazione e nubi, sono rappresentati da parametrizzazioni. Bauer et al. [22] ne ricostruiscono i progressi, che attribuiscono soprattutto a parametrizzazioni migliori, alla previsione d'insieme e all'assimilazione dei

dati, e stimano che l'accuratezza fra tre e dieci giorni sia cresciuta di circa un giorno per decennio. Fra le sfide aperte indicano la verifica delle code della distribuzione, per cui servono misure adatte a statistiche scarse. Le rianalisi come ERA5 [3] nascono dallo stesso apparato: combinano un modello di previsione con le osservazioni disponibili per stimare lo stato dell'atmosfera in ogni istante.

Rasp et al. [1] rendono ERA5 il riferimento comune per i modelli di previsione basati sui dati, con WeatherBench: un insieme di campi ERA5 a risoluzione ridotta, periodi di addestramento, validazione e test contigui nel tempo e confronti con persistenza, climatologia e previsione numerica. Nella discussione gli autori osservano che gli eventi estremi, essendo rari, contano poco nelle metriche medie come l'errore quadratico, che le reti estrapolano male a stati diversi da quelli visti in addestramento e che una rete addestrata con l'errore quadratico produce campi troppo regolari; propongono le GAN come possibile rimedio a quest'ultimo problema. Lam et al. [23] portano l'approccio alla risoluzione nativa di ERA5 con GraphCast, una rete su grafo addestrata sui campi ERA5 dal 1979 al 2017, che supera la previsione deterministica operativa sul 90.3% delle combinazioni di variabile, livello e orizzonte esaminate. Gli autori riconoscono che l'addestramento con l'errore quadratico porta il modello a esprimere l'incertezza sfumando i campi, e che il modello migliora quando è riaddestrato su anni più recenti, per ragioni non del tutto chiarite. Per valutare gli eventi estremi definiscono come tali i valori oltre un percentile di una climatologia per luogo, ora del giorno e mese.

Questi lavori usano ERA5 per prevedere; la tesi lo usa per riconoscere anomalie meteorologiche. Alcune loro osservazioni valgono anche per questo impiego: un modello addestrato su anni passati con un errore medio rappresenta meglio le condizioni frequenti, tende a smussare quelle rare, e il suo comportamento può cambiare quando i dati si allontanano dal periodo di addestramento.

### 2.2.2 Eventi estremi e anomalie nei campi meteorologici

I primi lavori che applicano reti profonde agli eventi meteorologici estremi lo fanno in modo supervised. Liu et al. [24] classificano con reti convoluzionali poco profonde ritagli di campi centrati su cicloni tropicali, fiumi atmosferici e fronti, con etichette ottenute da criteri a soglia e da esperti, e riportano accuratezze di test fra l'89% e il 99%; il metodo classifica ritagli già centrati e non localizza gli eventi. Gli autori indicano nella scarsità di dati etichettati un limite, e la necessità di approcci unsupervised. Racah et al. [25] passano alla localizzazione con ExtremeWeather, un insieme di simulazioni climatiche in cui i riquadri degli eventi sono ottenuti da criteri a soglia: un encoder–decoder

convoluzionale nello spazio e nel tempo unisce una loss supervised sui riquadri a una di ricostruzione su tutti i campi, così che contribuiscano anche quelli senza etichette. Gli autori osservano che etichette prodotte da criteri a soglia sono incomplete, e che un metodo supervised addestrato su di esse può al più imitarli; lasciano esplicitamente aperto il rilevamento di anomalie.

Prabhat et al. [26] affrontano il problema delle etichette con ClimateNet, un insieme di campi annotati a mano da esperti. La campagna ha coinvolto circa ottanta esperti e ha prodotto 459 immagini etichettate; l'accordo fra due esperti sulla stessa immagine, misurato come sovrapposizione delle aree annotate, è in media di 0.51, e il modello di segmentazione addestrato su queste etichette ottiene un valore analogo rispetto agli esperti. Le etichette sono quindi costose e, sui contorni degli eventi, incerte anche per gli esperti. Il modello è addestrato e valutato su simulazioni climatiche, e l'applicazione alle rianalisi è lasciata a lavori futuri.

La scarsità di etichette motiva i lavori più recenti, che applicano modelli generativi unsupervised a ERA5. Zaninelli et al. [27] addestrano un autoencoder variazionale sui campi giornalieri di temperatura a due metri di un clima di riferimento, preindustriale in un modello climatico oppure i primi decenni di ERA5, e trattano come anomalo ciò che il modello non ricostruisce nei campi recenti; l'obiettivo è l'attribuzione delle ondate di calore al cambiamento climatico, e l'anomalia è quindi la distanza da un clima di riferimento, su una sola variabile. Paçal et al. [28] addestrano un autoencoder variazionale spazio-temporale su nove variabili ERA5, con addestramento sugli anni 1941–1990 e test sugli anni 2001–2022, e raggruppano nello spazio latente le configurazioni atmosferiche delle ondate di calore in Europa occidentale; i campioni sono però selezionati in anticipo con una soglia sulla temperatura, e gli autori notano che le ricostruzioni del modello smussano gli estremi.

Nelle ricerche condotte per questa tesi non è emerso un lavoro che assegni uno score di anomalia a tutti gli stati dell'atmosfera di una rianalisi, su più variabili insieme e con un modello spazio-temporale avversario: i lavori supervised richiedono etichette che sono scarse e incerte, quelli unsupervised su ERA5 riguardano una sola variabile oppure eventi già selezionati. La ricerca non è esaustiva, e l'assenza va intesa in questo senso.

## 2.3 Contesto spaziale su griglie e grafi

STGAN rappresenta il contesto spaziale con convoluzioni su grafo, che presuppongono una rete di adiacenze. Le convoluzioni su grafo si sono diffuse nella previsione del traffico: Yu et al. [29] propongono STGCN, in cui blocchi formati da una convoluzione temporale, una convoluzione su grafo e una se-

conda convoluzione temporale prevedono la velocità del traffico sulle stazioni di una rete stradale. Il grafo è dato dalla rete stradale oppure costruito con un nucleo sulla distanza fra le stazioni, con parametri fissati a mano. Gli autori motivano il grafo osservando che una convoluzione ordinaria limita il modello a dati disposti su una griglia, come immagini e video. È proprio il caso dei campi della tesi, disposti su un reticolo regolare: questa sezione richiama l'operatore che sul reticolo svolge il ruolo della convoluzione su grafo, l'unità ricorrente convoluzionale.

Le unità ricorrenti a gate, come quella introdotta da Cho et al. [30] e nota come GRU, aggiornano uno stato nascosto mediante gate che regolano quanta parte dello stato precedente conservare e quanta sostituire. Nella forma originaria ingresso e stato sono vettori e i gate sono trasformazioni dense. Quando l'ingresso è un campo disposto su una griglia, le trasformazioni dense possono essere sostituite da convoluzioni, così che lo stato mantenga la struttura spaziale e i parametri siano condivisi fra le posizioni. L'idea è stata proposta per la LSTM nella previsione a breve termine delle precipitazioni [6] e per la GRU nell'apprendimento di rappresentazioni di sequenze video [7]. STGAN applica la stessa idea a un grafo: nel suo ramo recente i prodotti matriciali della GRU sono sostituiti da convoluzioni su grafo [5].

Sia $X_s$ l'ingresso al passo $s$ e $H_{s-1}$ lo stato precedente, entrambi disposti sulla griglia. Uno strato ricorrente convoluzionale a gate calcola

$$R_s = \sigma(W_r * [X_s, H_{s-1}] + b_r)\,, \tag{2.5}$$

$$U_s = \sigma(W_u * [X_s, H_{s-1}] + b_u)\,, \tag{2.6}$$

$$\widetilde{H}_s = \tanh(W_c * [X_s, R_s \odot H_{s-1}] + b_c)\,, \tag{2.7}$$

$$H_s = U_s \odot H_{s-1} + (1 - U_s) \odot \widetilde{H}_s, \tag{2.8}$$

dove $W_r$, $W_u$, $W_c$ sono i nuclei delle convoluzioni e $b_r$, $b_u$, $b_c$ i termini costanti, appresi durante l'addestramento, $\sigma$ è la funzione sigmoidale, $*$ una convoluzione spaziale, $\odot$ il prodotto elemento per elemento e $[\cdot, \cdot]$ la concatenazione sui canali. Il gate di reset $R_s$ regola quanto dello stato precedente entra nello stato candidato $\widetilde{H}_s$; il gate di aggiornamento $U_s$ regola quanto dello stato precedente viene conservato. La forma è quella dell'unità su grafo di STGAN, con la convoluzione su grafo sostituita da una convoluzione spaziale.

Con un *kernel* di lato $k$ e *padding* $\lfloor k/2 \rfloor$, ogni convoluzione vede le celle entro $\lfloor k/2 \rfloor$ posizioni. Il gate di reset e lo stato candidato applicano due convoluzioni in sequenza, quindi a ogni passo lo stato precedente si propaga fino a $2\lfloor k/2 \rfloor$ posizioni: l'area che influenza una cella cresce con il numero di passi temporali e di strati. La tesi impiega questo operatore nel generatore e nel discriminatore di STGAN (Sezioni 4.2.1 e 4.2.2).

## 2.4 Quantificazione dell'incertezza

Lo score di STGAN è un valore unico per osservazione, senza una misura della sua variabilità. Nella rassegna di Abdar et al. [31] l'incertezza di una previsione è distinta in due componenti: quella aleatoria, propria dei dati e non riducibile, e quella epistemica, dovuta alla conoscenza limitata del modello e ai dati insufficienti. Gli autori indicano le approssimazioni bayesiane e gli insiemi di modelli come i due metodi più usati, e il riconoscimento di dati lontani da quelli di addestramento come un problema ancora aperto; è la componente epistemica quella che ci si attende cresca per stati poco rappresentati nei dati, come le condizioni meteorologiche rare per un modello addestrato su anni passati. Questa sezione presenta il *dropout* Monte Carlo, applicato al rilevatore, e le principali alternative.

Gal e Ghahramani [8] interpretano l'addestramento con dropout come un'inferenza bayesiana approssimata. Mantenendo il dropout attivo in previsione e ripetendo più volte il passaggio in avanti si ottiene un insieme di uscite, la cui dispersione fornisce una stima dell'incertezza del modello con un costo aggiuntivo contenuto. L'equivalenza è ricavata per una rete con il dropout prima di ogni strato con pesi; nell'esperimento con una rete convoluzionale gli autori lo applicano, come d'uso in queste reti, soltanto prima dell'ultimo strato completamente connesso. Dati $J$ passaggi in avanti $\hat{y}_j(x)$ ottenuti con maschere di dropout diverse, la media predittiva è stimata da

$$\mathbb{E}[y \mid x] \approx \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \hat{y}_j(x), \tag{2.9}$$

e la varianza predittiva dalla varianza campionaria dei $J$ passaggi, a cui l'articolo somma l'inverso della precisione del modello.

Nella tesi il dropout Monte Carlo è applicato alle due reti del rilevatore, il generatore e il discriminatore di STGAN, non per stimare l'incertezza di una previsione ma per campionare lo score di anomalia. Durante il calcolo degli score i dropout restano attivi e il calcolo è ripetuto con maschere di dropout diverse, le *estrazioni*: per ogni valore sono riportate la media dello score sulle estrazioni, come nell'equazione (2.9), e la sua deviazione standard, la *dispersione*, come descritto nella Sezione 4.6. In questo impiego la dispersione misura la variabilità dello score rispetto alle maschere di dropout e non costituisce una stima calibrata dell'incertezza; il termine di precisione previsto da Gal e Ghahramani non viene aggiunto.

Le alternative principali richiedono di cambiare l'addestramento. Lakshminarayanan et al. [32] propongono il Deep Ensemble, un'alternativa non bayesiana: più reti vengono addestrate in modo indipendente a partire da

inizializzazioni diverse, e le loro previsioni sono combinate come una miscela a pesi uguali. Il metodo è semplice da realizzare, produce un'incertezza maggiore sugli ingressi lontani dai dati di addestramento, ma richiede di addestrare una rete per ogni membro dell'insieme: per il rilevatore, ciascun addestramento dura circa quattordici ore, mentre il dropout Monte Carlo ottiene la dispersione da un solo addestramento. Una terza famiglia di metodi ottiene la dispersione rendendo stocastica la dinamica interna della rete, modellando l'evoluzione dello stato nascosto come un'equazione differenziale stocastica, in cui una rete di drift ne descrive l'andamento e una rete di diffusione scala un termine casuale: SDE-Net [33] e il suo adattamento SDE U-Net [34]. Il rilevatore non li adotta: aggiungere a STGAN una rete di diffusione e una dinamica stocastica si sarebbe discostato molto dall'architettura dell'articolo, mentre il dropout Monte Carlo richiede soltanto di aggiungere strati di dropout alle reti esistenti. L'applicazione di questi metodi al rilevatore è indicata fra gli sviluppi futuri.

## 2.5 Da STGAN al rilevatore della tesi

STGAN è nato per il traffico: il grafo deriva da una rete fisica, lo score combina due componenti e la valutazione misura il richiamo su incidenti documentati (Sezione 2.1.4). La tesi ne riprende l'architettura a tre rami e gli obiettivi avversari e la porta su campi meteorologici privi di etichette, con le modifiche descritte nei paragrafi seguenti.

**Griglia e campo intero.** Nell'articolo il contesto spaziale è un grafo, e in assenza di una rete fisica le sue adiacenze andrebbero scelte con un criterio di vicinanza. Sul reticolo regolare dei campi della tesi, invece, le posizioni relative dei vicini sono definite. La convoluzione su grafo del ramo recente è quindi sostituita da una ConvGRU (Sezione 2.3), e il ramo LSTM del trend è conservato. Il ramo delle variabili esterne riceve la codifica del tempo: nell'articolo il giorno della settimana e l'ora, qui una codifica ciclica diversa per cella (Sezione 4.3); nel Capitolo 4 è chiamato ramo del calendario. Il generatore elabora in una sola passata il reticolo completo di un istante, mentre il discriminatore continua a giudicare l'intorno di ogni cella, una patch al posto del sottografo dell'articolo (Sezioni 4.2.1 e 4.2.2).

**Ingresso e pesi.** L'ingresso è riferito al normale stagionale di ogni cella, con una codifica del tempo per cella, ora solare locale e posizione nell'anno, al posto di quella pensata per il traffico, e l'errore di ogni variabile è pesato in proporzione inversa a quanto essa cambia abitualmente (Sezioni 4.3 e 4.4).

**Obiettivo: condizioni nuove rispetto all'addestramento.** L'articolo tratta come normali le sequenze reali dei dati di addestramento, mentre per i campi meteorologici dati di addestramento privi di anomalie non sono garantiti. A differenza di MTGFlow, STGAN non tollera per costruzione dati contaminati: la tesi accetta questo limite in cambio del contesto spaziale e lo traduce in una scelta di obiettivo, cioè rilevare condizioni nuove rispetto agli anni di addestramento. Le anomalie meteorologiche presenti negli anni di addestramento sono trattate come già osservate: nella misura in cui il modello le apprende, condizioni simili non vengono segnalate, mentre lo sono quelle poco o per nulla rappresentate in quegli anni. Lo score misura quindi la distanza da quanto il modello ha appreso dagli anni di addestramento (per tre variabili al netto di una tendenza lineare, Sezione 4.3), non la rarità di una condizione in assoluto.

Lo score è continuo e non coincide con la decisione: sono segnalati soltanto i valori, cioè le coppie cella–istante, con score più alto, in una percentuale che è un parametro del protocollo (Sezione 5.3). Una segnalazione indica una possibile anomalia meteorologica, non un'anomalia accertata (Capitolo 1).

**Score e dispersione.** Accanto allo score combinato dell'articolo, la tesi considera un secondo score: l'errore di ricostruzione del generatore riferito ai valori abituali di questo stesso errore nella cella, nel periodo dell'anno e nell'ora, perché la grandezza tipica dell'errore cambia da luogo a luogo e da stagione a stagione (Sezione 4.7); è indicato con $G_{\mathrm{n}}$. Quale dei due score usare è studiato nel Capitolo 6, che sceglie $G_{\mathrm{n}}$. Il dropout Monte Carlo nel generatore e nel discriminatore (Sezione 2.4) associa a ogni score una misura di dispersione, che l'articolo non prevede.

**Validazione senza etichette.** L'articolo valuta il rilevatore su eventi documentati, che per i campi meteorologici non sono disponibili in modo sistematico. La tesi introduce quindi anni di validazione, su cui, prima di valutare gli anni di test, si sceglie la configurazione con una distanza fra campi osservati e ricostruiti nello spazio delle componenti principali (Sezione 5.1) e si stimano climatologia e soglia degli score. I valori più insoliti degli anni di validazione, individuati con un criterio che non dipende dal modello, pesano il meno possibile nella misura di scelta e sono tolti dalla climatologia, mentre la soglia li include (Tabella 4.1). Monaco et al. [34] seguono un'idea simile, ma sull'addestramento: nella correzione delle previsioni di precipitazione escludono gli eventi intensi dall'addestramento e li mantengono nel test. La tesi invece addestra su tutti i dati degli anni di addestramento.

## 2.6 Posizionamento del lavoro

La tesi adatta un rilevatore avversario spazio-temporale, nato per il traffico, a campi meteorologici privi di etichette e di topologia fisica, lungo gli assi della Sezione 2.5, e lo valuta senza etichette, confrontandolo con i metodi più semplici della Sezione 2.1.5. Il contributo consiste nell'adattamento, nella combinazione di questi elementi e nel protocollo di valutazione, e nello studio delle due componenti dello score di STGAN su questi dati: non concordano, sommate danno uno score che ordina i valori quasi come il solo discriminatore, e la tesi usa quindi l'errore di ricostruzione del generatore riferito alla propria climatologia, $G_{\mathrm{n}}$ (Capitolo 6). Gli elementi di base sono preesistenti: la tesi non propone un nuovo algoritmo di rilevamento.

La Tabella 2.1 riassume i quattro candidati considerati per il rilevatore e il percorso della tesi, secondo i criteri usati nel capitolo. Le voci relative agli articoli riportano ciò che gli articoli dichiarano; dove un aspetto non è discusso, è indicato come non trattato. STGAN è la base del rilevatore; MTGFlow è stato eseguito nel lavoro preliminare sui dati PVGIS; CATCH e M2AD sono stati valutati sugli articoli e non eseguiti.

I capitoli seguenti descrivono i dati e il rilevatore costruito su queste scelte.

Tabella 2.1: Candidati considerati per il rilevatore e percorso della tesi a confronto. La colonna sulle anomalie nell'addestramento indica come ciascun lavoro tratta la presenza di osservazioni anomale nei dati di addestramento; la colonna sulla valutazione indica i dati e il riferimento con cui il lavoro misura il rilevamento.

| Lavoro | Segnale dello score | Anomalie nei dati di addestramento | Contesto spaziale | Valutazione | Dispersione |
|---|---|---|---|---|---|
| STGAN [5] | Errore di previsione e discriminatore | Non trattate: dati reali considerati normali | Sì: grafo da topologia fisica | Traffico; richiamo su eventi documentati | Non prevista |
| MTGFlow [4] | Densità stimata | Ammesse per costruzione | No: relazioni fra variabili | Sensori; dataset etichettati | Non prevista |
| CATCH [11] | Errore di ricostruzione in frequenza | Non trattate | No: canali di una serie | Serie multivariate; dataset etichettati, reali e sintetici | Non prevista |
| M2AD [12] | Residui di previsione aggregati | Escluse per ipotesi | No: sensori di più sistemi | Sensori di più sistemi; dataset etichettati e un caso industriale | Non prevista |
| Tesi | Score del rilevatore $G_{\mathrm{n}}$, scelto dopo lo studio delle due componenti; score combinato di STGAN come confronto | Trattate come già osservate | Sì: vicini sulla griglia | Campi ERA5; nessuna etichetta: componenti dello score e baseline | Dropout Monte Carlo |

# Capitolo 3

# Dati e preprocessing

Il capitolo descrive i campi meteorologici su cui il rilevatore è addestrato e valutato: le variabili della rianalisi ERA5, il dominio e la cadenza temporale, la preparazione dei dati, la loro suddivisione in anni di addestramento, di validazione e di test, le loro caratteristiche e i loro limiti. L'ultima sezione descrive i dati PVGIS da cui il lavoro è partito: serie orarie di una sola regione, con irradianza, temperatura e vento come sole grandezze meteorologiche, che non permettono di risalire alla condizione meteorologica che le ha prodotte, e per questo il lavoro è passato ai campi ERA5. Le trasformazioni che dipendono dal modello, come la normalizzazione stagionale, sono descritte nel Capitolo 4.

## 3.1 Campi ERA5 e dominio

I dati sono quelli della rianalisi ERA5 [3], cioè stime dello stato dell'atmosfera prodotte da un modello vincolato dalle osservazioni, e provengono da due prodotti distinti: variabili a livello singolo e variabili su livelli di pressione, di cui è usato soltanto il livello di 850 hPa. Le variabili sono quindici, scelte per descrivere le perturbazioni da più lati. Si possono raggruppare per ruolo: la temperatura, a due metri e a 850 hPa (un livello in quota, sopra lo strato vicino al suolo), e l'umidità specifica a 850 hPa descrivono lo stato termodinamico; la pressione al livello del mare, il vento a dieci metri e a 850 hPa e la velocità verticale descrivono la circolazione; la copertura nuvolosa, la radiazione solare alla superficie e la precipitazione descrivono nubi e fenomeni associati; l'umidità del primo strato del suolo, la velocità d'attrito, che misura lo sforzo del vento sulla superficie, e l'altezza dello strato limite, lo strato vicino al suolo rimescolato dalla turbolenza, descrivono la superficie e lo strato più basso dell'atmosfera. La Tabella 3.1 le elenca con le unità di ERA5, che non vengono convertite.

Tabella 3.1: Le quindici variabili ERA5, con la sigla e l'unità del dataset. Precipitazione e radiazione sono accumuli di un'ora; le altre variabili sono istantanee. Nel seguito si usano nomi brevi: vento zonale e meridionale, umidità specifica, umidità del suolo, strato limite, radiazione solare, precipitazione e copertura nuvolosa.

| Variabile | Sigla | Livello | Unità |
|---|---|---|---|
| Temperatura a due metri | t2m | Livello singolo | K |
| Componente zonale del vento a dieci metri | u10 | Livello singolo | $\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| Componente meridionale del vento a dieci metri | v10 | Livello singolo | $\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| Pressione al livello medio del mare | msl | Livello singolo | Pa |
| Precipitazione totale | tp | Livello singolo | m |
| Copertura nuvolosa totale | tcc | Livello singolo | 0–1 |
| Radiazione solare discendente alla superficie | ssrd | Livello singolo | $\mathrm{J\,m^{-2}}$ |
| Umidità volumetrica del primo strato del suolo | swvl1 | Livello singolo | $\mathrm{m^3\,m^{-3}}$ |
| Velocità d'attrito | zust | Livello singolo | $\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| Altezza dello strato limite | blh | Livello singolo | m |
| Componente zonale del vento | u | 850 hPa | $\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| Componente meridionale del vento | v | 850 hPa | $\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| Velocità verticale | w | 850 hPa | $\mathrm{Pa\,s^{-1}}$ |
| Temperatura | t | 850 hPa | K |
| Umidità specifica | q | 850 hPa | $\mathrm{kg\,kg^{-1}}$ |

I dati coprono gli anni dal 1980 al 2025: partono dall'era dei satelliti, in cui le osservazioni assimilate dalla rianalisi comprendono i dati da satellite [3]. Sono selezionati gli istanti UTC 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 e 21, su una griglia di $0.5° \times 0.5°$ nell'area compresa fra 20° e 60° di latitudine nord e fra 15° di longitudine ovest e 50° di longitudine est (Figura 3.1). Il dominio comprende l'Europa, il Mediterraneo e parte dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente: è il più ampio, centrato sull'Europa, compatibile con la memoria e i tempi di calcolo disponibili. La griglia di 0.5° e la cadenza di tre ore sono più rade di quelle originali di ERA5, di 0.25° e di un'ora: sono scelte per contenere la memoria occupata e i tempi di calcolo. Il campionamento ogni tre ore è una selezione di istanti, non un'aggregazione: precipitazione e radiazione conservano l'accumulo di un'ora associato a ciascun istante selezionato, senza somme triorarie. Le due ore fra istanti consecutivi non sono lette, e un breve rovescio che cade lì può non comparire.

**Il dominio.** Il dominio unisce climi molto diversi: a sud il Sahara e le coste del Nord Africa, al centro il Mediterraneo, a nord l'Europa atlantica e continentale fino alla Scandinavia meridionale, con rilievi come le Alpi, i Pirenei e l'Atlante. A ovest si affaccia sull'Atlantico, da cui arriva gran parte delle perturbazioni che attraversano l'Europa. Gli stessi valori hanno quindi significati diversi da un luogo all'altro e da una stagione all'altra: una temperatura ordinaria in estate nel Sahara sarebbe eccezionale in Europa settentrionale, e un cielo coperto, abituale d'inverno a nord, è raro nel deserto (Sezione 3.4). Per questo il rilevatore riferisce sia i dati in ingresso sia lo score a ciò che è abituale per ogni cella, periodo dell'anno e ora (Sezioni 4.3 e 4.7), invece di confrontare fra loro celle lontane.

Il reticolo contiene $81 \times 131 = 10611$ celle. Nel seguito i dati sono indicati come un tensore $X \in \mathbb{R}^{T \times N \times F}$, con $T$ istanti, $N = 10611$ celle e $F = 15$ variabili.

Sono conservate le celle per le quali tutte le variabili sono definite nel primo istante dei dati, e si verifica che questo insieme rimanga identico in tutto il periodo; se cambia, la preparazione si interrompe, e non viene applicata imputazione. Il criterio è la completezza delle variabili, non una classificazione terra–mare: nei dati usati tutte le variabili, anche l'umidità del suolo, sono definite su tutte le celle, mare compreso, e nessuna cella è esclusa.

## 3.2 Acquisizione e preparazione dei dati

I dati comprendono 134416 istanti, 10611 celle e 15 variabili: circa $2.1 \times 10^{10}$ valori, 85.6 GB in precisione singola. Il passaggio dai file di ERA5 ai dati





Figura 3.1: Dominio dei campi ERA5: 81 × 131 celle di 0.5°, fra 20° e 60° di latitudine nord e fra 15° di longitudine ovest e 50° di longitudine est. Il rettangolo indica l'area delle località PVGIS della Sezione 3.6, in Piemonte. Linee di costa da Natural Earth.

letti dal modello è quindi automatizzato, in modo che nessun passo richieda di tenere in memoria l'intero periodo. Si articola in quattro fasi: scarico, verifica, preparazione e lettura (Figura 3.2).





Figura 3.2: Dai file di ERA5 ai dati letti dal modello. I campi sono scaricati mese per mese dal Climate Data Store e conservati solo se superano la verifica; la preparazione li riunisce in array su disco, da cui il modello legge le sole finestre che usa.

**Scarico.** I campi sono richiesti al Climate Data Store di Copernicus attraverso la sua interfaccia di programmazione, con una richiesta per mese e per prodotto: 552 mesi e 1104 richieste. Ogni richiesta fissa le variabili, gli otto istanti del giorno, la griglia di 0.5°, il dominio e, per il secondo prodotto, il livello di 850 hPa. Il passaggio alla griglia di 0.5° è svolto dal servizio; i file ricevuti, in formato NetCDF [35], non vengono riscritti. Prima dello scarico i nomi delle variabili sono confrontati con quelli accettati dal servizio. Fino a otto richieste sono eseguite in parallelo, e una richiesta respinta per un limite temporaneo del servizio viene ripetuta dopo un'attesa crescente.

**Verifica.** Un mese è conservato solo se supera tutti i controlli. Gli istanti devono essere esattamente quelli richiesti, senza mancanti né duplicati; latitudini e longitudini devono essere quelle del dominio, con passo di 0.5°; il livello di pressione deve essere soltanto 850 hPa. Devono essere presenti tutte le variabili, senza valori infiniti e senza campi interamente mancanti in un istante. Per ogni mese è salvata una *ricevuta*, un piccolo file con la richiesta e l'impronta SHA-256 di ciascun file scaricato, che permette di riconoscere i mesi già scaricati e integri. Quando lo scarico viene ripreso, i mesi con ricevuta e impronta corrette sono saltati e gli altri sono scaricati di nuovo.

**Preparazione.** La preparazione, svolta da un programma distinto da quello di scarico, controlla prima che tutti i mesi del periodo siano presenti, poi legge i file mese per mese, a blocchi di 32 istanti. Ripete i controlli su istanti, griglia e livello di pressione, allinea i due prodotti sugli stessi istanti e sulle stesse coordinate, e ordina le latitudini da nord a sud e le longitudini da ovest

a est. Ogni blocco diventa la parte corrispondente del tensore $X$, in precisione singola, senza conversioni di unità né imputazione, ed è scritto direttamente nella sua posizione in file in formato `.npy` di NumPy [36]. Un file di metadati registra la griglia, le variabili, gli anni e il numero di celle escluse.

**Lettura.** I file sono aperti in mappatura di memoria: durante l'addestramento e il calcolo degli score si leggono dal disco soltanto gli istanti e le celle di ciascuna finestra. La suddivisione negli anni della Sezione 3.3 è applicata alla lettura.

## 3.3 Anni di addestramento, di validazione e di test

Il tensore $X$ è diviso in tre periodi consecutivi. Gli anni 1980–1999 sono usati per l'addestramento, gli anni 2000–2004 per la validazione e gli anni 2005–2025 per il test: rispettivamente 58440, 14616 e 61360 istanti, cioè il 43%, l'11% e il 46% del totale. La divisione è cronologica: il modello non vede mai anni successivi a quelli su cui è valutato. Il test comincia nel 2005, il primo anno dei dati PVGIS della Sezione 3.6, così che i due insiemi di dati si sovrappongono negli anni di test. Tutte le quantità che il Capitolo 4 stima dai dati per l'ingresso e la loss del modello sono calcolate sui soli anni di addestramento.

La validazione serve a confrontare le configurazioni e a fissare, prima di valutare gli anni di test, tutte le quantità che descrivono il comportamento abituale degli score. Queste quantità, fra cui le soglie, sono elencate nella Tabella 4.1. Gli anni di test non entrano in alcuna scelta: ricevono senza modificarle le quantità stimate sugli anni di addestramento e su quelli di validazione. L'articolo di STGAN [5] separa i dati in addestramento e test senza un insieme di validazione: la validazione è un'aggiunta di questo lavoro, necessaria perché in assenza di etichette la scelta della configurazione deve basarsi su una misura calcolata fuori dal test.

Il modello legge, per ogni istante, fino a 56 istanti precedenti, cioè sette giorni. I primi istanti di ciascun periodo usano quindi come contesto la coda del periodo precedente: le finestre di ingresso dei primi istanti di validazione contengono gli ultimi istanti di addestramento, e lo stesso vale fra validazione e test. Il contesto non rientra fra gli istanti valutati.

## 3.4 Caratteristiche dei campi

Tre proprietà dei campi motivano altrettante scelte del Capitolo 4. Sono misurate sugli anni di addestramento, senza il rilevatore; solo il confronto della Figura 3.4 anticipa i pesi del Capitolo 4.

**Cicli diversi da luogo a luogo.** La temperatura a due metri e la copertura nuvolosa hanno un ciclo stagionale e uno giornaliero, con livello e ampiezza diversi da una cella all'altra (Figura 3.3). La media mensile della temperatura va da 1 a 17 °C in una cella dell'Europa settentrionale, da 2 a 24 °C nella Pianura Padana e da 11 a 32 °C nel Sahara; la copertura nuvolosa media sta fra 0.60 e 0.78 nella prima cella e fra 0.04 e 0.29 nell'ultima. Lo stesso valore è quindi abituale in un luogo e in una stagione e insolito in altri. Per questo i valori in ingresso sono riferiti al normale stagionale della propria cella, del giorno e dell'ora (Sezione 4.3), e gli score alla climatologia della propria cella (Sezione 4.7).

**Variazioni di grandezza diversa.** Per una variabile $f$, la variazione quadratica media su 24 ore è

$$m_f = \frac{1}{TN} \sum_{t,n} \left( \tilde{x}_{t,n,f} - \tilde{x}_{t-8,n,f} \right)^2, \tag{3.1}$$

dove $\tilde{x}$ è il valore dopo la trasformazione considerata e $t - 8$ l'istante di 24 ore prima; il rilevatore la stima su 720 coppie di istanti equispaziati degli anni di addestramento; la percentuale di $f$ è $100\, m_f / \sum_{f'} m_{f'}$. Le 24 ore confrontano istanti alla stessa ora e non contengono quindi il ciclo giornaliero. La percentuale dice quanto ciascuna variabile pesa in un errore di ricostruzione del generatore che somma le variabili con lo stesso peso. Con il min–max di STGAN, che riporta ogni variabile fra il minimo e il massimo degli anni di addestramento, la copertura nuvolosa produce l'84.1% della variazione quadratica media su 24 ore delle quindici variabili, e la seconda, l'umidità specifica, ha appena il 3.2% (Figura 3.4). La copertura nuvolosa passa spesso da sereno a coperto nel corso di un giorno e attraversa quasi tutto il proprio intervallo; la temperatura cambia di pochi gradi, in un intervallo che comprende tutte le celle e tutte le stagioni. Un errore di ricostruzione del generatore che somma le variabili con lo stesso peso sarebbe quindi in gran parte un errore sulla copertura nuvolosa. Dopo la normalizzazione stagionale e il min–max del rilevatore le percentuali vanno dallo 0.9% dell'umidità del suolo al 16.6% dell'umidità specifica, e la copertura nuvolosa ha il 6.7%, quasi esattamente un quindicesimo, la percentuale che spetterebbe a ogni variabile





Figura 3.3a: Lo stesso mese ha livelli e variabilità diversi da una cella all'altra. Ciclo stagionale della temperatura a due metri e della copertura nuvolosa in tre celle: Europa settentrionale (55°N, 10°E), Pianura Padana (45°N, 9°E) e Sahara (25°N, 10°E); media per mese, con una fascia a una deviazione standard dei valori triorari del mese. La temperatura è in gradi Celsius (in kelvin nei dati). Anni 1980–1999.





Figura 3.3b: Il ciclo giornaliero cambia con il luogo e con la stagione. Media per ora UTC in gennaio (tratteggio) e in luglio (linea continua), per le stesse variabili e celle della Figura 3.3a. Anni 1980–1999.

se contassero tutte allo stesso modo: la normalizzazione stagionale rende confrontabili anche le variabili fra loro. Le differenze che restano sono corrette dai pesi della Sezione 4.4.





Figura 3.4: Con il min–max di STGAN la copertura nuvolosa domina; dopo la normalizzazione stagionale tutte le percentuali sono fra il 3.3% e il 16.6%, tranne quella dell'umidità del suolo (0.9%). Percentuale di ciascuna variabile nella variazione quadratica media su 24 ore (equazione (3.1)), dopo il min–max di STGAN e dopo la normalizzazione stagionale e il min–max del rilevatore, in scala logaritmica. Anni 1980–1999; le percentuali dopo la normalizzazione stagionale sono ricavate dai pesi della Sezione 4.4, che sono proporzionali all'inverso di $m_f$. La linea tratteggiata indica la percentuale uguale per tutte le variabili, un quindicesimo.

**Legame spaziale a corto raggio.** Le differenze dal normale per mese e ora di due celle, cioè le differenze fra il valore e la media della propria cella, del mese e dell'ora, non divise per la deviazione standard e quindi diverse dallo scarto standardizzato della Sezione 4.3, sono tanto meno correlate quanto più le celle sono lontane (Figura 3.5). Qui la media è per mese, una stima più semplice di quella per giorno usata nel Capitolo 4. Sono confrontate due variabili di grande scala, pressione e temperatura, e due legate alle perturbazioni, copertura nuvolosa e precipitazione; la distanza è misurata lungo la superficie terrestre. La correlazione mediana scende sotto 0.5 oltre

circa 1300 km per la pressione al livello del mare e 900 km per la temperatura a due metri, ma già oltre 200 km per la copertura nuvolosa e 100 km per la precipitazione. Le variabili legate alle perturbazioni dipendono quindi dalle celle vicine, con una correlazione che cala già nelle prime centinaia di chilometri: è il contesto che il rilevatore rappresenta con la ConvGRU del generatore e con la patch del discriminatore (Sezione 4.2). Una cella misura circa 55 km in latitudine: la patch $3 \times 3$ del discriminatore copre le celle entro circa 55 km, e la ConvGRU allarga il raggio di alcune celle a ogni passo della finestra recente.





Figura 3.5: Precipitazione e copertura nuvolosa perdono la correlazione entro poche celle. Correlazione delle differenze dal normale per mese e ora di due celle in funzione della loro distanza: mediana e quartili per fasce di 100 km, su 300 celle scelte a caso e un istante ogni nove degli anni 1980–1999 (un passo dispari, che legge tutte le ore del giorno). Il primo punto, entro 100 km, si basa su 36 coppie di celle.

## 3.5 Qualità e limiti dei dati

ERA5 è una rianalisi: i campi sono stime di un modello vincolato dalle osservazioni disponibili, non misure dirette (Sezione 2.2). Due proprietà dei dati vanno tenute presenti nella lettura dei risultati.

**Variabili lontane da una distribuzione gaussiana.** La precipitazione è nulla nella maggior parte degli istanti e assume di rado valori molto alti; la copertura nuvolosa è limitata fra 0 e 1. Il Capitolo 4 tratta la precipitazione con una radice quarta prima della standardizzazione (Sezione 4.3).

**Cambiamenti dopo gli anni di addestramento.** Riferite al normale per mese e ora degli anni 1980–1999, le medie annuali delle variabili sull'intero dominio non restano costanti negli anni successivi. Negli ultimi cinque anni la media è +0.60 deviazioni standard per la temperatura a due metri e +0.37 per quella a 850 hPa, +0.81 e +0.50 in estate, e −0.20 per l'umidità del suolo; per la pressione, la radiazione solare e la copertura nuvolosa resta entro ±0.03. La tendenza lineare che la Sezione 4.3 sottrae a tre variabili, stimata sugli anni 1980–1999, riduce lo spostamento a +0.07 e +0.09 per le due temperature; per l'umidità del suolo, che negli anni di addestramento ha una tendenza debole e si sposta soprattutto dal 2000, solo a −0.13. Per l'umidità specifica a 850 hPa la media resta fra −0.13 e +0.06 deviazioni standard negli anni di addestramento e sale a +0.17 negli ultimi cinque anni: è una deriva reale, che la normalizzazione del Capitolo 4 non toglie. Per la precipitazione, standardizzata senza la radice quarta, la media passa da circa 0 a valori fra +0.09 e +0.26 dal 2000 in poi, senza alcun salto nei dati grezzi: è un effetto della standardizzazione di una variabile molto asimmetrica fuori dagli anni su cui è stimata, non un cambiamento del clima. Il rilevatore usa una radice quarta, che riduce l'asimmetria; quanto dello spostamento resti nei suoi ingressi non è stato misurato. In tutti questi casi gli anni di test si allontanano da quelli di addestramento, e un rilevatore unsupervised può segnalare in parte questa distanza invece di anomalie meteorologiche di un singolo istante.

## 3.6 I dati PVGIS del lavoro preliminare

Il lavoro è partito, nell'ambito della previsione della produzione fotovoltaica, da serie orarie ottenute dal Photovoltaic Geographical Information System [37] con la banca dati di radiazione SARAH3, provenienti dal progetto SentinelPV del Politecnico di Torino. Coprono 1149 località del Piemonte, comprese fra 44.08° e 46.47° di latitudine nord e fra 6.66° e 9.20° di longitudine est. Nella proiezione UTM del fuso 32 le località occupano 1149 delle $41 \times 54$ posizioni di un reticolo regolare con passo di 5 km: quelle che ricadono nel territorio regionale (Figura 3.6), racchiuso nel rettangolo della Figura 3.1. Sono disponibili gli anni dal 2005 al 2023, con 8760 ore per anno (8784 negli anni bisestili) e senza valori mancanti; i valori sono riferiti al minuto 10 di ciascuna ora, in tempo universale.

Per ogni località e ogni istante sono disponibili l'irradianza globale con le sue componenti diretta, diffusa e riflessa, l'altezza del sole, la temperatura dell'aria a due metri, la velocità del vento a dieci metri e la potenza prodotta (Tabella 3.2). L'irradianza è riferita al piano orizzontale: l'inclinazione





Figura 3.6: Le 1149 località dei dati PVGIS. Ogni punto è una posizione del reticolo con passo di 5 km per la quale sono disponibili le serie orarie.

indicata nei dati è nulla, la componente riflessa risulta nulla e l'irradianza globale coincide con la somma delle componenti diretta e diffusa. Circa la metà dei valori di irradianza è nulla, perché notturna. La potenza è una produzione teorica calcolata da PVGIS, non la misura di un impianto reale.

Tabella 3.2: Grandezze dei dati PVGIS e loro unità.

| Grandezza | Unità |
|---|---|
| Irradianza globale (diretta più diffusa) | $\mathrm{W\,m^{-2}}$ |
| Irradianza diretta | $\mathrm{W\,m^{-2}}$ |
| Irradianza diffusa | $\mathrm{W\,m^{-2}}$ |
| Irradianza riflessa (nulla) | $\mathrm{W\,m^{-2}}$ |
| Altezza del sole | gradi |
| Temperatura dell'aria a due metri | °C |
| Velocità del vento a dieci metri | $\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| Potenza prodotta (teorica) | W |

Queste sono le sole grandezze disponibili, e sono quelle che determinano la produzione fotovoltaica. Una segnalazione su questi dati non può essere ricondotta a una condizione meteorologica più generale: per rilevare anomalie meteorologiche di tipo diverso e descriverne l'origine il lavoro è passato ai campi ERA5 descritti nelle sezioni precedenti. Su questi dati il lavoro preliminare ha sviluppato un previsore della produzione e i primi rilevatori, che la tesi non riporta.

# Capitolo 4

# Metodologia

Il capitolo descrive il rilevatore nella forma usata sui campi ERA5. La Sezione 4.1 formula il problema: che cosa entra nel rilevatore, che cosa ne esce e quando un valore è segnalato. Seguono l'architettura del generatore e del discriminatore con gli obiettivi dell'addestramento avversario (Sezione 4.2), l'ingresso del modello (Sezione 4.3), i pesi delle variabili nell'errore di ricostruzione del generatore, i valori esclusi dalle misure sugli anni di validazione, le componenti dello score con il dropout Monte Carlo e la normalizzazione climatologica dello score. Il capitolo si ferma allo score: la misura con cui si confrontano le configurazioni è descritta nel Capitolo 5, e ciò che si ricava dallo score, come il raggruppamento delle segnalazioni in cluster di segnalazioni, nel Capitolo 6.

La Figura 4.1 riporta l'ordine in cui questi passaggi agiscono su un istante, e per ogni quantità stimata gli anni su cui è stimata: normalizzazione stagionale e pesi sugli anni di addestramento, prima di addestrare il modello; climatologia e soglia sugli anni di validazione, dopo l'addestramento. Il discriminatore non compare nella catena: serve all'addestramento del generatore e allo score combinato, calcolato solo per confronto.

## 4.1 Formulazione del problema

I dati sono una sequenza di campi $X_t$, uno per istante $t$, su un reticolo di $N_y = 81$ righe e $N_x = 131$ colonne, cioè $N = 10611$ celle, con $F = 15$ variabili (Capitolo 3); $x_{tnf}$ indica il valore della variabile $f$ nella cella $n$. Per ogni istante il generatore riceve il contesto che lo precede, cioè gli $R$ campi più recenti, una serie più lunga di ciascuna cella per il trend e la codifica temporale, e restituisce una stima $\hat{X}_t$ del campo, la *ricostruzione*, con valori $\hat{x}_{tnf}$. L'errore quadratico fra ricostruzione e osservazione, pesato per variabile





Figura 4.1: Ordine dei passaggi del rilevatore su un istante, dai campi ERA5 alla segnalazione. In corsivo, gli anni su cui è stimata ciascuna quantità: le scale della normalizzazione stagionale e i pesi sugli anni di addestramento, la climatologia dello score e la soglia sugli anni di validazione.

e mediato sulla patch $3 \times 3$ di ogni cella e su più estrazioni Monte Carlo, è l'*errore di ricostruzione del generatore* $\bar{s}_{G,tn}$, una delle due componenti dello score combinato di STGAN (Sezione 4.6). Espressa rispetto ai valori abituali di questo stesso errore nella cella, nel periodo dell'anno e nell'ora, diventa lo *score del rilevatore* $G_n(t,n)$ (Sezione 4.7), nel testo semplicemente $G_n$. Una coppia cella–istante è *segnalata* quando $G_n(t,n) > \tau$, con la soglia $\tau$ pari al 95-esimo percentile di $G_n$ sugli anni di validazione (Sezione 5.3). Lo score misura quindi la distanza da ciò che il modello ha appreso negli anni di addestramento (Sezione 2.5), e una segnalazione indica una possibile anomalia meteorologica, non un'anomalia accertata.

## 4.2 Architettura e addestramento avversario

Il rilevatore segue lo schema di STGAN [5] descritto nella Sezione 2.1.4: un generatore stima il campo dell'istante successivo a partire dagli istanti precedenti, e un discriminatore giudica se il campo di un istante, insieme alla sua storia recente, è osservato o generato. Il generatore stima le quindici variabili della Tabella 3.1, su una griglia con passo di 0.5° e con una cadenza di tre ore. La Figura 4.2 riporta la struttura delle due reti, descritta nelle sottosezioni seguenti.

### 4.2.1 Generatore ConvGRU sul campo intero

Un campione di addestramento è il campo completo di un istante, disposto sul reticolo $N_y \times N_x$ della Sezione 3.1. Il generatore ha tre rami. Il ramo recente





Figura 4.2: Struttura del generatore (a) e del discriminatore (b). Il generatore unisce cella per cella i tre rami, recente, trend e calendario, e produce la ricostruzione dell'istante. Il discriminatore giudica ogni cella sulla propria patch, a partire dalla storia recente e dal campo corrente, osservato o ricostruito. I riquadri tratteggiati indicano i dropout, con probabilità 0.2 (Sezione 4.6).

elabora gli $R$ campi che precedono l'istante da stimare con una ConvGRU [6, 7], l'unità ricorrente convoluzionale delle equazioni (2.5)–(2.8), che sostituisce la convoluzione su grafo dell'articolo. Il ramo del trend elabora con una LSTM [38] la serie di ciascuna cella su un periodo più lungo. Il ramo del calendario proietta la codifica temporale con uno strato lineare seguito da una ReLU (*rectified linear unit*). Con $b$ istanti per batch, $R$ passi recenti, $L$ passi di trend e $F$ variabili, gli ingressi hanno forma $[b, R, F, N_y, N_x]$ per il ramo recente e $[b, L, N, F]$ per il trend; l'uscita ha forma $[b, F, N_y, N_x]$.

Le convoluzioni scorrono sull'intero reticolo: il campo ricettivo non è limitato a una parte del dominio e ogni cella viene ricostruita una sola volta. La LSTM del trend e la codifica temporale sono calcolate per cella e disposte sul reticolo. Le rappresentazioni dei tre rami sono concatenate cella per cella; una proiezione $1 \times 1$ seguita da tanh produce la ricostruzione.

Lo stato ricorrente è inizializzato a zero per ogni finestra. Il modello ha due strati ConvGRU da 32 canali con kernel $3 \times 3$, e una LSTM del trend a due strati con stato nascosto di dimensione 64.

### 4.2.2 Discriminatore locale

Il discriminatore giudica ogni cella sulla propria patch $P \times P$, con $P = 3$, così come nell'articolo giudica ogni nodo sul proprio sottografo: la patch comprende la cella e le sue otto vicine dirette, così che il giudizio tenga conto dell'intorno immediato. La patch di ogni cella è estratta dal campo. Sul margine del dominio la patch è incompleta: le celle della patch esterne al reticolo sono azzerate dopo la normalizzazione, e una maschera binaria $M$ è fornita come canale aggiuntivo a ogni strato ConvGRU. Rispetto alle equazioni (2.5)–(2.8) cambiano l'ingresso e l'ultimo passaggio. I gate e lo stato candidato sono calcolati su $X'_s$, la concatenazione dei valori mascherati e di $M$, al posto di $X_s$; lo stato precedente $H_{s-1}$ è già mascherato e lo stato aggiornato viene moltiplicato per la maschera, replicata sui canali:

$$H_s = M \odot \left[ U_s \odot H_{s-1} + (1 - U_s) \odot \widetilde{H}_s \right]. \tag{4.1}$$

Il mascheramento dello stato impedisce alle celle assenti di conservare attivazioni da propagare negli strati o nei passi successivi. La ConvGRU del generatore ha la stessa forma; su ERA5 nessuna cella del reticolo è priva di dati, e la sua maschera vale uno ovunque.

Una ConvGRU codifica la storia recente della patch; la storia codificata è appiattita e proiettata con uno strato lineare seguito da una ReLU. Il campo corrente della patch, osservato o generato, passa attraverso una proiezione $1 \times 1$ seguita da una sigmoide e da un massimo sulle celle valide. Le due

rappresentazioni sono concatenate e alimentano uno strato nascosto e un'uscita sigmoidale. Il discriminatore restituisce quindi un valore per cella e per istante.

Le patch di tutte le celle sono valutate in un'unica passata, con le stesse maschere e gli stessi azzeramenti. L'uscita relativa a una cella è quella che il discriminatore produrrebbe sulla sua patch isolata.

### 4.2.3 Obiettivi di addestramento

Il discriminatore viene addestrato con etichetta zero per il campo reale e uno per il campo generato, come nell'articolo. Indicando con $D_{\text{reale}}$ e $D_{\text{generato}}$ le uscite sulle patch con il campo osservato e con la ricostruzione, il campo generato dell'articolo, cioè le $D_\phi(S_{v,t})$ e $D_\phi(\hat{S}_{v,t})$ dell'articolo (Sezione 2.1.4), gli obiettivi sono

$$\mathcal{L}_D = \tfrac{1}{2}\Big[\mathrm{BCE}(D_{\text{reale}}, 0) + \mathrm{BCE}(D_{\text{generato}}, 1)\Big], \tag{4.2}$$

$$\mathcal{L}_G = \lambda_G \ \mathrm{MSE}_w(\hat{x}, x) + \mathrm{BCE}(D_{\text{generato}}, 0), \tag{4.3}$$

dove $\mathrm{MSE}_w$ è l'errore quadratico medio sulle celle valide e sulle variabili, con i pesi delle variabili della Sezione 4.4, e la BCE, l'entropia incrociata binaria, è mediata sulle uscite locali, una per cella. Rispetto alle equazioni (2.2)–(2.3) dell'articolo, l'errore di ricostruzione del generatore è un errore quadratico medio anziché una norma e la loss del discriminatore è dimezzata: la scelta segue il codice pubblicato dagli autori.

Generatore e discriminatore hanno ciascuno un proprio ottimizzatore Adam [39]. Nel passo del generatore, i parametri del discriminatore sono congelati ma viene mantenuto il gradiente rispetto alla ricostruzione; la storia della patch è codificata di nuovo, con i pesi del discriminatore appena aggiornati. Il peso di ricostruzione $\lambda_G$, che nell'articolo vale 500, è un iperparametro. I tassi di apprendimento dei due ottimizzatori sono distinti e fissati separatamente. Il coefficiente $\beta_1$ degli ottimizzatori vale 0.9, il valore del codice degli autori. Con $n_D$:$n_G$ aggiornamenti, sullo stesso batch vengono eseguiti prima $n_D$ aggiornamenti del discriminatore e poi $n_G$ del generatore, ciascuno con un proprio passaggio in avanti; è un conteggio di aggiornamenti, non un rapporto fra i tassi di apprendimento. Tassi, aggiornamenti e peso di ricostruzione sono gli strumenti con cui si regola l'equilibrio fra le due reti; i valori usati sono scelti nel Capitolo 5.

Ogni batch contiene un istante, e ogni gradiente è mediato su tutte le celle dell'istante.

**In sintesi.** Il generatore stima il campo di un istante su tutto il reticolo, a partire dai campi recenti, dal trend di ogni cella e dal calendario; il discrimi-

natore giudica ogni cella sulla propria patch $3 \times 3$. Le due reti sono addestrate con gli obiettivi dell'articolo, nella forma del codice degli autori.

## 4.3 Ingresso: finestra recente, codifica temporale e normalizzazione stagionale

### 4.3.1 Finestra recente e trend

La finestra recente contiene gli $R$ istanti che precedono quello da stimare. La ConvGRU la percorre in ordine: parte da uno stato nullo ed esegue un aggiornamento per ogni istante, sicché lo stato finale riassume gli $R$ campi osservati. Con $R > 1$ il modello riceve anche l'evoluzione del campo negli istanti precedenti, e l'area che può influenzare una cella cresce con $R$, perché a ogni aggiornamento lo stato si propaga alle celle vicine. Il rilevatore usa $R = 16$ passi, cioè 48 ore; il trend comprende 56 passi, cioè 168 ore, la stessa durata dell'articolo.

### 4.3.2 Codifica temporale ciclica

La codifica temporale dell'articolo, a 31 elementi, è composta dal giorno della settimana e dall'ora UTC. È pensata per il traffico e su ERA5 è poco adatta, per due motivi. Il primo è che il vettore è lo stesso per tutte le celle, mentre il dominio si estende per 65 gradi di longitudine: alla stessa ora UTC, l'ora solare delle celle più a ovest e quella delle celle più a est differiscono di oltre quattro ore. Il secondo è che non contiene la posizione nell'anno, e non distingue quindi le stagioni. È perciò sostituita da una codifica ciclica a quattro elementi, diversa per cella. Indicando con $h_t$ l'ora UTC, con $\ell_n$ la longitudine in gradi, con $g_t$ il giorno frazionario dell'anno e con $A_t$ il numero di giorni dell'anno corrispondente, la codifica è

$$\begin{aligned} c_{tn} &= [\sin\phi_{tn},\ \cos\phi_{tn},\ \sin\psi_t,\ \cos\psi_t]\,, \\ \phi_{tn} &= \frac{2\pi}{24}\left(h_t + \frac{\ell_n}{15}\right), \qquad \psi_t = \frac{2\pi g_t}{A_t}. \end{aligned} \tag{4.4}$$

Il primo angolo rappresenta l'ora solare locale, ottenuta dalla sola longitudine senza fusi orari; il secondo la posizione nell'anno. Seno e coseno rendono vicini gli istanti vicini nel ciclo, come le ore 23 e le ore 1 oppure la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. La codifica ciclica non contiene il giorno della settimana.

### 4.3.3 Normalizzazione stagionale

La normalizzazione dell'articolo è un min–max per variabile stimato sui dati di addestramento. Usa un solo intervallo per variabile, valido per tutte le celle e per tutto l'anno. Su un dominio che va dal Sahara all'Europa settentrionale questo ha un limite: lo stesso valore riceve la stessa scala ovunque e in ogni stagione. Una temperatura di 20 °C, per esempio, è insolitamente alta a gennaio in Europa settentrionale e insolitamente bassa a luglio nel Sahara (Sezione 3.4), ma con un solo min–max per variabile riceve in entrambi i casi lo stesso valore normalizzato. La normalizzazione stagionale riferisce invece ogni valore a ciò che è abituale nella stessa cella, nello stesso periodo dell'anno e alla stessa ora (Figura 3.3). Per ogni cella $n$, variabile $f$, ora del giorno $o$ e giorno dell'anno $g$ il valore è standardizzato,

$$u_{tnf} = \frac{x_{tnf} - \mu_{nfog}}{\sigma_{nfog}}, \tag{4.5}$$

con otto ore del giorno e 366 giorni dell'anno. Il valore $u_{tnf}$ è lo *scarto standardizzato*: dice di quante deviazioni standard il valore si allontana dal suo normale stagionale, ed è positivo sopra il normale e negativo sotto; 0 è il valore normale, +2 un valore due deviazioni standard sopra. Media e deviazione standard sono due tensori di forma $[8, 366, N, F]$, una voce per ogni ora, giorno, cella e variabile. Media e deviazione standard sono stimate sui soli anni di addestramento, raccogliendo i quindici giorni che precedono $g$ e i quindici che lo seguono. La deviazione standard misura la variabilità attorno al ciclo stagionale: ogni valore della finestra è confrontato con la media su $\pm 15$ giorni del proprio giorno, non con quella di $g$, e così la variazione del ciclo stagionale dentro la finestra non è contata come variabilità. Espresse in deviazioni standard del proprio normale, le variabili diventano confrontabili anche fra loro: la copertura nuvolosa, che con il solo min–max produce l'84.1% della variazione su 24 ore, ne produce il 6.7% (Sezione 3.4).

La precipitazione richiede un passaggio in più. È nulla nella maggior parte degli istanti e assume di rado valori molto alti: media e deviazione standard dei valori originali sono determinate in larga parte da questi pochi valori. Prima della standardizzazione la precipitazione è quindi sostituita dalla sua radice quarta, che comprime i valori alti e lascia nullo ciò che è nullo; media e deviazione standard descrivono la radice e non il valore originale. A differenza del logaritmo, la radice è definita anche per i valori nulli e non richiede una costante aggiuntiva.

La deviazione standard $\sigma_{nfog}$ non può scendere sotto una frazione della deviazione standard complessiva della variabile sugli anni di addestramento: 0.1 per la precipitazione e per l'umidità del suolo, 0.01 per le altre tredici

variabili. Il limite evita la divisione per valori quasi nulli, come accade per la radiazione solare di notte.

L'ultimo passaggio riguarda il tempo. Gli anni di test seguono quelli di addestramento, fino a oltre vent'anni dopo. Per una variabile che nel periodo ha una tendenza, la differenza fra il clima degli anni di test e quello degli anni di addestramento entrerebbe in ogni scarto standardizzato, e crescerebbe con la distanza dagli anni di addestramento. Per tre variabili (temperatura a due metri, temperatura a 850 hPa e umidità del suolo) agli scarti standardizzati è quindi sottratta una retta nel tempo. Sono le variabili in cui la media sull'intero dominio si sposta di più negli anni successivi a quelli di addestramento (Sezione 3.5); fra le altre variabili controllate lo spostamento resta piccolo, con le eccezioni dell'umidità specifica, discussa più avanti, e della precipitazione (Sezione 3.5).

La retta è una per variabile, uguale per tutte le celle: passa per le medie annuali degli scarti standardizzati sull'intero dominio, è stimata sui soli anni di addestramento e viene prolungata agli anni successivi. Per queste tre variabili, quindi, la tendenza lineare stimata sugli anni di addestramento non conta come condizione nuova. Per le altre dodici variabili la retta non è sottratta e il riferimento resta il clima degli anni di addestramento. Fra queste c'è l'umidità specifica: la sua deriva inizia dopo gli anni di addestramento, e una retta stimata su quegli anni non la descrive. Per questa variabile la correzione non può quindi essere applicata senza usare gli anni di test.

Dopo questi passaggi è applicato un min–max per variabile, stimato sugli anni di addestramento, che riporta i valori nell'intervallo $[-1, 1]$ dell'uscita del generatore. Negli anni successivi, i valori esterni all'intervallo degli anni di addestramento possono superare questi estremi, perché la trasformazione non applica un clipping. Nel seguito $x_{tnf}$ indica il valore dopo tutti questi passaggi e $\hat{x}_{tnf}$ la sua stima da parte del generatore.

## 4.4 Pesi delle variabili nell'errore di ricostruzione del generatore

Nell'articolo tutte le variabili contano allo stesso modo nell'errore di ricostruzione del generatore. Il rilevatore pesa invece l'errore per variabile, in modo che ciascuna sia misurata in rapporto a quanto cambia abitualmente. Dopo la normalizzazione stagionale le variabili hanno variazioni più vicine fra loro, ma non uguali: le loro percentuali della variazione su 24 ore vanno dallo 0.9% al 16.6% (Figura 3.4). I pesi correggono queste differenze. Indicando con $m_f$ la variazione quadratica media su 24 ore della variabile $f$ (equazione (3.1)),

calcolata sui dati di addestramento normalizzati, il peso è

$$w_f = \frac{\bar{m}}{m_f}, \qquad \bar{m} = \frac{1}{F}\sum_{f=1}^{F} m_f, \tag{4.6}$$

con $F = 15$. La differenza a 24 ore confronta istanti alla stessa ora del giorno e non contiene quindi il ciclo giornaliero. Con il fattore $\bar{m}$, un errore quadratico pari a $m_f$ in ogni variabile dà la stessa loss con e senza pesi. Il peso non misura la difficoltà del modello su una variabile: è una misura di quanto la variabile cambia, fissata prima dell'addestramento e senza usare il modello. I pesi vanno da 0.40 per l'umidità specifica a 7.14 per l'umidità del suolo, che cambia lentamente. I pesi moltiplicano l'errore quadratico di ciascuna variabile nel termine di ricostruzione della loss del generatore e nell'errore di ricostruzione del generatore da cui sono calcolati gli score.

**In sintesi.** Ogni valore entra nel modello riferito al normale stagionale della propria cella, giorno e ora, con la codifica dell'ora solare locale e del periodo dell'anno, e l'errore di ciascuna variabile pesa in proporzione inversa a quanto la variabile cambia abitualmente.

## 4.5 Valori esclusi negli anni di validazione

Gli anni di validazione servono a confrontare configurazioni e a stimare le quantità dello score prima di valutare gli anni di test. Perché queste misure dipendano soprattutto dal tempo ordinario, i valori più insoliti degli anni di validazione sono individuati prima, con un criterio che non usa il modello.

Un valore, cioè una coppia cella–istante, è detto *escluso* in base a due distanze calcolate sugli scarti standardizzati della Sezione 4.3. La prima è la *distanza dal normale*: la media sulle variabili del quadrato degli scarti standardizzati, con i pesi delle variabili della Sezione 4.4, che dice quanto il valore è lontano dal normale della propria cella, giorno e ora. La seconda è la variazione in tre ore: la stessa media pesata sul quadrato della differenza rispetto a tre ore prima, che coglie i cambiamenti rapidi anche quando il valore resta vicino al normale.

**Il criterio.**

**Il criterio.** Ciascuna distanza è standardizzata con la media e la deviazione standard della stessa cella, dello stesso mese e della stessa ora negli anni di addestramento, così che un luogo o una stagione più variabili non concentrino

i valori esclusi. Un valore è escluso quando almeno una delle due distanze standardizzate supera il livello oltrepassato dal 5% dei valori di addestramento. Medie, deviazioni standard e livelli sono stimati sui soli anni di addestramento; la validazione riceve soltanto l'indicazione di quali valori sono esclusi.

**Quanti valori esclude.**

**Quanti valori esclude.** La stessa indicazione è calcolata sugli anni di addestramento, dove esclude l'8.62% dei valori e serve a scegliere i campi della misura di scelta della configurazione (Sezione 5.1). Il criterio è approssimato: non pretende di individuare tutte le anomalie meteorologiche, ma di togliere le più evidenti, così che le misure dipendano soprattutto dal tempo ordinario. La soglia del 5% è una scelta, ed esclude il 9.75% dei valori di validazione: più del 5%, perché basta che una delle due distanze superi il proprio livello.

I valori esclusi entrano in modo diverso nelle quantità stimate sugli anni di validazione (Tabella 4.1). Nella storia recente che il modello legge, in due casi i valori esclusi sono sostituiti dal normale stagionale, cioè dallo scarto standardizzato nullo: è la *storia ripulita*. I due casi sono la misura con cui si confrontano le configurazioni e il calcolo degli score sugli anni di validazione eseguito al termine dell'addestramento, da cui vengono gli estremi dello score combinato. Climatologia e soglia usano invece la storia reale, come sugli anni di test (Sezione 4.7).

Tabella 4.1: Come entrano i valori esclusi nelle quantità stimate sugli anni di validazione: come valore da valutare e nella storia recente da cui il modello parte.

| Quantità | Valori esclusi fra quelli valutati | Storia recente |
|---|---|---|
| Misura di scelta della configurazione (Sezione 5.1) | solo campi in cui la percentuale di valori esclusi non supera la mediana dei campi dello stesso mese | ripulita |
| Estremi dello score combinato (Sezione 4.6) | tolti | ripulita |
| Climatologia degli score (Sezione 4.7) | tolti | reale |
| Soglia (Sezione 5.3) | inclusi | reale |

## 4.6 Componenti dello score e dropout Monte Carlo

### 4.6.1 Dropout nel generatore e nel discriminatore

Lo score è calcolato più volte con il dropout Monte Carlo [8]. Gli strati di dropout sono posti dopo gli encoder e prima degli strati di uscita, una forma più semplice di quella con il dropout prima di ogni strato con pesi. Il generatore riceve tre strati di dropout: sulla rappresentazione spaziale del ramo recente, sulla rappresentazione del trend e sulla loro concatenazione con la codifica temporale, prima della proiezione di uscita. Il discriminatore ne riceve altrettanti, nelle posizioni corrispondenti: sulla storia codificata, sul campo corrente codificato e sullo strato nascosto che precede l'uscita. La probabilità è 0.2 in entrambe le reti, un valore fissato e non ottimizzato. I dropout sono attivi nell'addestramento e nel calcolo degli score. L'articolo e il codice degli autori non usano il dropout: la sua aggiunta, come la sua posizione, è una scelta di questo lavoro.

Il discriminatore riceve la ricostruzione senza il dropout del generatore: nell'addestramento, sia nel proprio aggiornamento sia nel termine avversario del generatore, e nel calcolo degli score. Se ricevesse la ricostruzione con il dropout, potrebbe distinguere le ricostruzioni dai campi osservati per il rumore che il dropout vi introduce, e non per il loro contenuto. Il dropout del generatore agisce quindi sull'errore di ricostruzione del generatore, quello del discriminatore sul suo giudizio.

### 4.6.2 Estrazioni Monte Carlo e componenti dello score

Durante il calcolo degli score il modello è in modalità di valutazione, con l'eccezione dei dropout, che restano attivi. Per ogni istante sono fatte $J = 20$ estrazioni, come le 20 previsioni campionate con cui Monaco et al. [34] valutano la loro U-Net con dropout Monte Carlo; il valore è fissato e non ottimizzato. Nell'estrazione $j$ il generatore ricostruisce il campo con una propria maschera di dropout, e da questa ricostruzione si calcola l'errore di ricostruzione del generatore. Al discriminatore va invece la ricostruzione a dropout spento, come in addestramento, uguale in tutte le estrazioni. In ogni estrazione il discriminatore usa una propria maschera di dropout, la stessa per i due giudizi, e giudica sia l'osservazione sia questa ricostruzione.

Per la coppia cella–istante $(t, n)$ e l'estrazione $j$, la ricostruzione $\hat{x}^{(j)}$ dà

l'errore di ricostruzione del generatore

$$s^{(j)}_{G,tn} = \frac{1}{|\mathcal{P}_n|\, F} \sum_{c \in \mathcal{P}_n} \sum_{f=1}^{F} w_f \left( \hat{x}^{(j)}_{tcf} - x_{tcf} \right)^2, \tag{4.7}$$

dove $\mathcal{P}_n$ sono le celle valide della patch $3 \times 3$ di $n$. L'errore di una cella è quindi la media su sé stessa e sulle celle vicine, come nell'articolo, dove l'errore di un nodo è misurato sul suo sottografo. La componente del discriminatore è, come nell'articolo, la differenza fra il giudizio sull'osservazione e quello sulla ricostruzione,

$$s^{(j)}_{D,tn} = D^{(j)}_{\text{reale},tn} - D^{(j)}_{\text{generato},tn}. \tag{4.8}$$

L'errore di ricostruzione del generatore, medio sulle estrazioni,

$$\bar{s}_{G,tn} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} s^{(j)}_{G,tn}, \tag{4.9}$$

è la media degli errori delle singole estrazioni, e non l'errore della ricostruzione media. Per ogni cella e variabile le due quantità differiscono per la varianza delle ricostruzioni:

$$\frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \left( \hat{x}^{(j)} - x \right)^2 = \left( \bar{\hat{x}} - x \right)^2 + \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \left( \hat{x}^{(j)} - \bar{\hat{x}} \right)^2, \qquad \bar{\hat{x}} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \hat{x}^{(j)}. \tag{4.10}$$

La componente cresce quindi sia quando la ricostruzione si allontana dall'osservazione, sia quando le estrazioni non sono concordi fra loro. Dalle stesse estrazioni si ricava anche la deviazione standard di ciascuna componente e dello score, chiamata nel seguito *dispersione*: misura quanto essi dipendono dalle maschere di dropout; non è una probabilità di anomalia né una stima calibrata dell'incertezza.

### 4.6.3 Score combinato e score del rilevatore

Dalla stessa esecuzione sono ricavati due score. Lo *score combinato* è quello dell'articolo; non è usato come score del rilevatore, ed è confrontato con le due componenti (Sezione 6.5). Le due componenti sono riportate su una scala comune con un min–max e sommate con peso unitario, estrazione per estrazione:

$$a^{(j)}_{tn} = \frac{s^{(j)}_{G,tn} - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}} + \frac{s^{(j)}_{D,tn} - d_{\min}}{d_{\max} - d_{\min}}, \qquad \bar{a}_{tn} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} a^{(j)}_{tn}. \tag{4.11}$$

L'articolo indica che le due componenti sono normalizzate prima della somma, senza specificare come, e il codice degli autori salva le componenti senza

combinarle: il min–max è quindi una scelta di questo lavoro. Gli estremi $r_{\min}$, $r_{\max}$, $d_{\min}$ e $d_{\max}$ sono quelli delle due componenti medie sulle estrazioni negli anni di validazione, senza i valori esclusi (Sezione 4.5), e restano fissi per gli anni di test: quindi nessuna quantità dello score è stimata sugli anni di test. A differenza della climatologia della Sezione 4.7, vengono dalla storia ripulita (Tabella 4.1): la differenza riguarda soltanto il peso delle due componenti nello score combinato, che non è lo score del rilevatore. I valori degli anni di test possono uscire dall'intervallo $[0, 1]$ di ciascuna componente, perché non è applicato un clipping.

Lo *score del rilevatore* $G_{\mathrm{n}}(t, n)$ è la sola componente $\bar{s}_{G,tn}$, espressa rispetto alla propria climatologia (Sezione 4.7). Quale dei due score usare è discusso nel Capitolo 6, dove l'errore di ricostruzione del generatore $\bar{s}_{G,tn}$ è indicato con G e la componente del discriminatore con D.

## 4.7 Normalizzazione climatologica degli score

Una trasformazione successiva al calcolo degli score esprime ogni score rispetto alla climatologia della stessa cella. Per la cella $n$, il giorno dell'anno $g$ e l'ora UTC $o$ dell'istante $t$,

$$z_{tn} = \frac{s_{tn} - \mu^{s}_{nog}}{\sigma^{s}_{nog}}, \tag{4.12}$$

dove $s_{tn}$ è lo score da trasformare: l'errore di ricostruzione del generatore $\bar{s}_{G,tn}$, la componente del discriminatore, media sulle estrazioni, o lo score combinato $\bar{a}_{tn}$; la stessa trasformazione è applicata agli score delle baseline (Sezione 6.6). Media e deviazione standard sono calcolate con la stessa ricetta della normalizzazione stagionale della Sezione 4.3: sugli score della stessa cella e della stessa ora nei quindici giorni che precedono $g$ e nei quindici che lo seguono, con una finestra che scavalca la fine dell'anno, e con la deviazione standard calcolata attorno alla media lisciata di ciascun giorno. Lo score è uno per cella e non ha la dimensione delle variabili: media e deviazione standard sono due tensori di forma $[8, 366, N]$. Sono stimate negli anni di validazione, senza i valori esclusi (Sezione 4.5), e restano fisse per gli anni di test. Non possono essere stimate sugli anni di addestramento, perché su quegli anni il modello ha già visto i dati e il suo errore è più basso di quello su anni nuovi. Quando lo score trasformato serve sugli anni di validazione stessi, per le scelte e per fissare le soglie, media e deviazione standard di un anno $y$ sono calcolate sugli altri quattro anni di validazione, $\mu^{s,(-y)}_{nog}$ e $\sigma^{s,(-y)}_{nog}$: nessun valore entra nella propria climatologia. Le combinazioni di cella, giorno dell'anno e ora con meno di trenta valori di riferimento o con varianza nulla non ricevono uno score.

Gli score di validazione da cui sono stimate queste quantità sono calcolati con la storia reale, come quelli degli anni di test, e non con la storia ripulita (Tabella 4.1): una climatologia stimata su errori calcolati da una storia ripulita descriverebbe un errore più basso di quello che il modello commette sugli anni di test, dove la storia contiene anche i valori che sugli anni di validazione sono esclusi.

Lo scopo è rendere confrontabili celle e stagioni in cui l'errore di ricostruzione del generatore ha una grandezza tipica diversa: senza questo passaggio, le segnalazioni si concentrerebbero dove l'errore è grande per natura. La trasformazione applica la stessa idea della normalizzazione stagionale, cioè esprimere un valore rispetto a ciò che è abituale per quella cella, quel periodo dell'anno e quell'ora, ma a un oggetto diverso. La normalizzazione stagionale agisce sui campi in ingresso, prima del modello, ed è stimata sugli anni di addestramento: toglie il ciclo stagionale e giornaliero dei dati, ma non la differenza di prevedibilità fra celle e stagioni. Dove il tempo cambia più rapidamente il generatore sbaglia di più anche sugli scarti standardizzati. La normalizzazione climatologica agisce sull'errore di ricostruzione del generatore, dopo l'addestramento, è stimata sugli anni di validazione e toglie questa seconda differenza senza modificare il rilevatore.

**Score finale.** Riassumendo, lo score del rilevatore, usato nei risultati, è

$$G_{\mathrm{n}}(t, n) = \frac{\bar{s}_{G,tn} - \mu^{s}_{nog}}{\sigma^{s}_{nog}}, \tag{4.13}$$

con $\bar{s}_{G,tn}$ dell'equazione (4.9): l'errore di ricostruzione del generatore, pesato per variabile e medio sulla patch $3 \times 3$ della cella e sulle 20 estrazioni Monte Carlo, riferito ai valori abituali dello stesso errore nella cella, nel periodo dell'anno e nell'ora. La soglia con cui un valore è segnalato è definita nella Sezione 5.3.

Il Capitolo 5 riporta i valori scelti e il protocollo con cui lo score è valutato.

# Capitolo 5

# Esperimenti

Il capitolo descrive come il rilevatore del Capitolo 4 è addestrato e valutato sui campi ERA5. La Sezione 5.1 descrive la misura con cui si confrontano le configurazioni, la Sezione 5.2 la configurazione fissata e la ricerca dei quattro iperparametri che regolano l'equilibrio fra generatore e discriminatore; la Sezione 5.3 descrive il protocollo di valutazione: che cosa si stima sugli anni di validazione e che cosa si valuta sugli anni di test. I risultati, compresi quelli della ricerca, sono nel Capitolo 6.

## 5.1 Misura di scelta della configurazione

Le configurazioni del rilevatore sono confrontate sugli anni di validazione, senza usare gli anni di test e senza etichette, con una misura di quanto bene il modello ricostruisce il tempo ordinario. La misura confronta osservazioni e ricostruzioni in uno spazio indipendente dal modello, ottenuto da un'analisi delle componenti principali dei campi di addestramento: ogni campione è il campo completo di un istante, normalizzato e appiattito su celle e variabili. Sono usati campi estratti a caso, con un seme fisso e nello stesso numero per ogni mese, fra quelli in cui la percentuale di valori esclusi (Sezione 4.5) non supera la mediana di questa percentuale fra i campi dello stesso mese, e sono conservate 300 componenti principali: oltre questo numero la varianza spiegata cresce poco, e 300 componenti ne spiegano il 78.8%, contro il 67.4% di 100 componenti. Lo spazio è costruito una sola volta, prima delle esecuzioni, e successivamente soltanto caricato.

I campi di tempo ordinario sono scelti, non corretti. Sostituire i valori esclusi con il normale stagionale darebbe campi più lisci di qualunque campo osservato, e una distanza calcolata su di essi premierebbe un generatore che ricostruisce campi lisci. Un campo scelto può quindi contenere ancora qualche

valore escluso, entro la mediana del suo mese: dei valori esclusi si sostituisce soltanto la storia da cui il modello parte (Tabella 4.1).

Su questo spazio viene definito un riferimento per la validazione, fissato anch'esso prima delle esecuzioni: $S = 5$ sottoinsiemi fissi e disgiunti di $m = 512$ campi di tempo ordinario degli anni di validazione, scelti con lo stesso criterio, con le coordinate delle loro osservazioni nello spazio. La Maximum Mean Discrepancy (MMD) misura quanto differiscono due insiemi di campioni: è vicina a zero quando seguono la stessa distribuzione. La banda $\gamma$ del kernel è la distanza euclidea mediana fra tali coordinate. A ogni epoca il generatore, a dropout spento, ricostruisce i campi di ciascun sottoinsieme, e si calcola la stima non distorta della MMD [40]

$$\widehat{\mathrm{MMD}}^2 = \frac{1}{m(m-1)} \sum_{i \neq i'} k(x_i, x_{i'}) + \frac{1}{m(m-1)} \sum_{i \neq i'} k(y_i, y_{i'}) - \frac{2}{m^2} \sum_{i,i'} k(x_i, y_{i'}), \tag{5.1}$$

dove $x_i$ sono le coordinate delle osservazioni, $y_i$ quelle delle ricostruzioni e il kernel è la media di tre kernel gaussiani (RBF, *radial basis function*),

$$k(a, b) = \frac{1}{3} \sum_{\kappa \in \{0.5,\, 1,\, 2\}} \exp\left( -\frac{\|a - b\|^2}{2(\kappa\gamma)^2} \right). \tag{5.2}$$

La stima è mediata sui sottoinsiemi, e la media delle ultime cinque epoche è la quantità usata per scegliere fra configurazioni (Sezione 5.2). La stima non distorta può assumere valori leggermente negativi. Poiché tutte le esecuzioni confrontate caricano gli stessi riferimenti, le differenze nella misura non dipendono da una nuova stima dello spazio o della banda. La misura non entra in una loss, in un aggiornamento dei pesi o negli score: è calcolata senza gradiente e ripristinando gli stati dei generatori di numeri casuali, così da non alterare la traiettoria dell'addestramento. Una MMD più bassa indica ricostruzioni più vicine alle osservazioni nello spazio considerato; non misura direttamente la qualità del rilevamento delle anomalie meteorologiche.

## 5.2 Configurazione e ricerca degli iperparametri

La configurazione del rilevatore è fissata, a eccezione di quattro iperparametri che regolano l'equilibrio fra generatore e discriminatore, scelti con una ricerca bayesiana. La Tabella 5.1 riporta i valori fissati e gli iperparametri cercati, con la sezione del Capitolo 4 che li descrive.

Tabella 5.1: Configurazione del rilevatore su ERA5. Nella parte superiore i valori fissati, nella parte inferiore gli iperparametri della ricerca, con l'intervallo esplorato e il valore della configurazione scelta.

| Elemento | Valore | Sezione |
|---|---|---|
| Anni di addestramento, validazione, test | 1980–1999, 2000–2004, 2005–2025 | 3.3 |
| Unità del campione e batch | Campo intero, un istante per batch | 4.2.1 |
| Generatore | ConvGRU a due strati da 32 canali, kernel $3 \times 3$; LSTM del trend a due strati da 64 | 4.2.1 |
| Discriminatore | Patch $3 \times 3$; ConvGRU a due strati da 32 canali; strato nascosto da 64 | 4.2.2 |
| Finestra recente e trend | 16 e 56 passi, cioè 48 e 168 ore | 4.3 |
| Codifica temporale | Ora solare locale e posizione nell'anno, per cella | 4.3 |
| Normalizzazione dell'ingresso | Rispetto al normale di cella, giorno e ora; retta nel tempo tolta a tre variabili; poi min–max | 4.3 |
| Pesi delle variabili | Inversi della variazione quadratica media su 24 ore | 4.4 |
| Dropout | 0.2, nel generatore e nel discriminatore | 4.6 |
| Estrazioni Monte Carlo negli score | 20 | 4.6 |
| Ottimizzatore | Adam, $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, tasso costante | 4.2 |
| Epoche | 6, come nel codice degli autori di STGAN | – |
| Precisione | bfloat16 (BF16) nei calcoli, pesi a 32 bit (FP32) | – |
| Tasso di apprendimento del generatore | da $10^{-4}$ a $3 \cdot 10^{-3}$, in scala logaritmica; scelto $7.65 \cdot 10^{-4}$ | 4.2 |
| Tasso di apprendimento del discriminatore | da $2.5 \cdot 10^{-5}$ a $5 \cdot 10^{-3}$, in scala logaritmica; scelto $3.06 \cdot 10^{-3}$ | 4.2 |
| Peso di ricostruzione $\lambda_G$ | da 25 a 2000, in scala logaritmica; scelto 63.7 | 4.2 |
| Aggiornamenti per batch, $n_D$:$n_G$ | 1:1, 2:1 oppure 1:2; scelto 1:1 | 4.2 |

**Obiettivo.** L'obiettivo della ricerca è la distanza MMD fra campi osservati e ricostruiti nello spazio delle componenti principali (Sezione 5.1), mediata sulle ultime cinque epoche, da minimizzare: la prima epoca è esclusa perché, all'inizio dell'addestramento, è poco indicativa della configurazione. Ogni esecuzione è addestrata sugli anni 1980–1999 e misurata sugli anni di validazione, senza calcolare score sugli anni di test. Ogni configurazione è addestrata una sola volta, con lo stesso seme per tutte le esecuzioni. Le esecuzioni interrotte perché una loss ha assunto valori infiniti o indefiniti (NaN) non hanno un obiettivo e sono escluse dalla scelta.

**La ricerca.** Le prove sono gestite con la libreria Optuna [41] e proposte con un metodo bayesiano: un processo gaussiano stima l'obiettivo in funzione degli iperparametri, a partire dalle prove già completate, e la prova successiva è scelta dove il miglioramento atteso è più alto. La ricerca è fermata quando più prove consecutive non migliorano il miglior obiettivo di almeno 0.0004, un valore vicino al rumore dell'obiettivo stimato dal processo gaussiano. È scelta la configurazione con l'obiettivo più basso fra le esecuzioni completate. Le prove della ricerca e la configurazione scelta sono riportate nella Sezione 6.1.

**Pesi e calcolo.** Del modello scelto si usano i pesi dell'ultima epoca, come nel codice degli autori[1], che salva i pesi a ogni epoca e valuta quelli dell'ultima: nessuna epoca è scelta in base al risultato. Un'epoca comprende 58384 batch di un istante, cioè gli istanti di addestramento meno i 56 di contesto del trend. Nella configurazione scelta un'epoca dura circa 2.4 ore, quindi un'esecuzione di sei epoche poco più di 14 ore. I modelli sono implementati in PyTorch [42]. Nella preparazione dei dati (Sezione 3.2) i file mensili in formato NetCDF [35] sono letti con xarray [43]; durante l'addestramento e il calcolo degli score i file `.npy` sono letti con NumPy [36] in mappatura di memoria; le tabelle di score sono elaborate con pandas [44]; il Capitolo 6 usa anche SciPy [45]. Tutte le esecuzioni sono addestrate su una scheda NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell.

## 5.3 Protocollo di valutazione

**Che cosa si calcola.** Gli score della configurazione scelta sono calcolati sugli anni di validazione 2000–2004 e di test 2005–2025, su tutti gli istanti e tutte le celle: $14616 \times 10611$ coppie cella–istante sugli anni di validazione e $61360 \times 10611$ sugli anni di test, ciascuna con le 20 estrazioni Monte Carlo della Sezione 4.6. In entrambi i periodi le finestre di ingresso contengono la

[1] `https://github.com/dleyan/STGAN`

storia reale, compresi i valori esclusi, e i primi istanti prendono il contesto dal periodo precedente (Sezione 3.3).

**Che cosa si stima sugli anni di validazione.** Le quantità che descrivono il comportamento abituale degli score sono stimate sugli anni di validazione e restano fisse per gli anni di test: la climatologia degli score (Sezione 4.7) e la soglia. La soglia di uno score è il 95-esimo percentile dello stesso score sugli anni di validazione,

$$\tau = Q_{0.95}\Big\{ z_{tn} \,:\, t \in \text{validazione},\ n = 1, \ldots, N \Big\}, \tag{5.3}$$

calcolato su un istante ogni dieci degli anni di validazione e su tutte le celle, una soglia per ciascuno score confrontato. Sugli anni di validazione lo score normalizzato $z$ di ogni anno è calcolato con la climatologia degli altri quattro (Sezione 4.7), e i valori senza score non entrano nella soglia. Nella soglia entrano anche i valori esclusi dalle altre misure (Sezione 4.5), perché valori come questi sono presenti anche negli anni di test. Sugli anni di test la soglia segnala una percentuale di valori che può differire dal 5%, ed è riportata nei risultati.

**Altre soglie.** Per G e D senza normalizzazione, usati nel Capitolo 6 per studiare le due componenti, la soglia è allo stesso modo il 95-esimo percentile della componente stessa sugli anni di validazione. Le analisi principali sono ripetute con il 99-esimo percentile, per verificare quanto le conclusioni dipendano dalla soglia (Sezione 6.10).

**Score usato e baseline.** Lo score del rilevatore è $G_{\mathrm{n}}$, dell'equazione (4.13), cioè G con la normalizzazione climatologica. Lo score combinato dell'articolo, che somma l'errore di ricostruzione del generatore e la componente del discriminatore, non è usato come score del rilevatore; è calcolato per confronto nel Capitolo 6. La scelta di $G_{\mathrm{n}}$ è fatta sugli anni di validazione (Sezioni 6.2–6.5), dove le due componenti non concordano e l'errore di ricostruzione del generatore ha un significato chiaro; gli anni di test la confermano (Sezione 6.5). Gli anni di test non intervengono né nell'addestramento né nella scelta della configurazione; il comportamento degli score e il loro confronto con otto baseline, metodi più semplici (Sezione 6.6), sono descritti nel Capitolo 6.

# Capitolo 6

# Risultati e discussione

Il capitolo riporta e discute i risultati del rilevatore sui campi ERA5, nella configurazione scelta dalla ricerca degli iperparametri. Senza etichette, una segnalazione indica dove lo score è alto, non che lì ci sia davvero un'anomalia meteorologica: questo vale per tutto il capitolo. Nel capitolo un valore è una coppia cella–istante; salvo dove indicato, è segnalato quando supera il 95-esimo percentile del proprio score sugli anni di validazione.

La Sezione 6.1 fissa la configurazione; il resto del capitolo ha tre parti. Le Sezioni 6.2–6.5 scelgono quale parte dello score combinato usare: il legame fra G, l'errore di ricostruzione del generatore, e D, la componente del discriminatore, la normalizzazione climatologica, che cosa giudica il discriminatore e la conferma sugli anni di test. Lo score scelto è $G_{\mathrm{n}}$, l'errore di ricostruzione del generatore con la normalizzazione climatologica (Sezione 4.7). Le Sezioni 6.6–6.8 descrivono che cosa segnala $G_{\mathrm{n}}$: il confronto con otto metodi più semplici, le baseline, i cluster di segnalazioni per tipo e dimensione e la dispersione del dropout. Le Sezioni 6.9 e 6.10 verificano i risultati, con anomalie meteorologiche note e al variare della soglia.

## 6.1 Ricerca degli iperparametri

La ricerca della Sezione 5.2 conta 29 prove, quattro delle quali interrotte per una loss non finita. Ogni prova è giudicata dalla distanza MMD fra i campi osservati e quelli ricostruiti sugli anni di validazione (Sezione 5.1): più è bassa, più le ricostruzioni somigliano alle osservazioni. La Figura 6.1 le mostra nel piano delle prime due componenti principali dei quattro iperparametri, presi in scala logaritmica e standardizzati. Il piano spiega il 71% della varianza: due prove vicine nel piano possono essere lontane nei quattro iperparametri, e per questo la regione migliore è indicata sulle sue prove e non come un'area.





Figura 6.1: La configurazione scelta è la prova con la distanza MMD più bassa. Le prove della ricerca degli iperparametri nel piano delle prime due componenti principali dei quattro iperparametri (71% della varianza). Il colore è la distanza MMD sugli anni di validazione, più scuro dove è più bassa; i cerchi arancioni indicano le tre prove della regione migliore. Nel riquadro, la direzione in cui cresce ciascun iperparametro: "tasso di appr." G e D sono i tassi di apprendimento del generatore e del discriminatore, peso $\lambda_G$ il peso di ricostruzione, "aggiornamenti D:G" gli aggiornamenti del discriminatore e del generatore per batch. La figura non mostra l'ordine delle prove, discusso nel testo.

Tabella 6.1: Le tre prove della regione migliore della ricerca degli iperparametri, con la distanza MMD sugli anni di validazione. La prima è la configurazione scelta.

| Prova | Tasso di appr. G | Tasso di appr. D | Peso $\lambda_G$ | Aggiornamenti D:G | MMD |
|---|---|---|---|---|---|
| Scelta | $7.6 \times 10^{-4}$ | $3.1 \times 10^{-3}$ | 64 | 1:1 | 0.00259 |
| Seconda | $5.7 \times 10^{-4}$ | $1.5 \times 10^{-3}$ | 115 | 1:1 | 0.00327 |
| Terza | $8.2 \times 10^{-4}$ | $3.3 \times 10^{-3}$ | 173 | 1:1 | 0.00384 |

**La regione migliore.** Tre prove formano la regione migliore (Tabella 6.1). Le loro distanze MMD sono 0.00259, 0.00327 e 0.00384: le prime due sono le più basse dell'intera ricerca. Le tre prove sono vicine fra loro nei quattro iperparametri, standardizzati come nella Figura 6.1, e sono le sole di quella zona sotto 0.004: per questo la regione comprende anche la terza, con 0.00384. Fuori dalla regione la prova migliore vale 0.00367, ma è isolata e le prove più vicine hanno dato fra 0.0038 e 0.0044: è un risultato singolo, non una regione.

**Le prove vicine alla configurazione scelta.** La prova più vicina alla configurazione scelta ha un tasso del generatore poco più basso ($5.2 \times 10^{-4}$) e quasi lo stesso peso di ricostruzione (60), ma il tasso del discriminatore al massimo della ricerca, $5 \times 10^{-3}$: la distanza sale a 0.0041. Le due prove con il tasso del discriminatore pari a 50 volte quello del generatore danno 0.0044 e 0.0054. Per la configurazione scelta il processo gaussiano della ricerca stima un valore atteso di $0.0032 \pm 0.0004$, con un rumore dell'obiettivo di circa 0.0005: parte del suo vantaggio sulle prove vicine dipende quindi dal seme, ed è un limite di una ricerca con un solo seme per configurazione.

**Le ultime prove esplorano.** Le prove non si avvicinano via via alla regione migliore: vicino a essa la ricerca non si aspetta miglioramenti oltre il rumore, e sceglie le zone che conosce meno. Le ultime prove, con peso di ricostruzione fino a 2000 e tasso del generatore sceso fino a $10^{-4}$, hanno dato distanze fra 0.0037 e 0.0054.

## 6.2 G e D: un legame debole

Lo score combinato di STGAN somma due componenti, e prima di sceglierne una conviene capire se segnalano gli stessi valori. Questa sezione e le due seguenti riguardano gli anni di validazione 2000–2004 della configurazione scelta: 14616 istanti su 10611 celle. Sono gli anni su cui si sceglie lo score del rilevatore (Sezione 5.3); la Sezione 6.5 ripete le stesse misure sugli anni di test. Le grandezze usate sono riassunte nella Tabella 6.2. G e D sono le due componenti dello score, medie sulle 20 estrazioni (Sezione 4.6); $D_{\text{reale}}$ e $D_{\text{generato}}$ sono le due uscite del discriminatore da cui D è calcolata, e servono nella Sezione 6.4. Il discriminatore è addestrato a dare 1 alla ricostruzione e 0 al campo osservato: un'uscita alta significa quindi "giudicato generato". Va fatta attenzione al nome: $D_{\text{reale}}$ è il giudizio sull'osservazione, e se è alto l'osservazione è giudicata generata. Nell'idea di STGAN un'osservazione di questo tipo non somiglia a quelle viste in addestramento, e per questo una D alta, come un G alto, significa "più insolito".

Tabella 6.2: Le grandezze del capitolo e il significato di un loro valore alto. Tutte sono calcolate per ogni cella e ogni istante.

| Grandezza | Che cosa misura | Se è alto |
|---|---|---|
| G ($\bar{s}_G$) | errore di ricostruzione del generatore, medio sulla patch $3 \times 3$ della cella | osservazione più insolita |
| $G_{\text{n}}$ | lo score del rilevatore (Sezione 4.7): G rispetto a ciò che è abituale per quella cella, periodo dell'anno e ora | osservazione più insolita per quel luogo e periodo |
| $D_{\text{reale}}$ | giudizio del discriminatore sull'osservazione, fra 0 e 1 | osservazione giudicata generata |
| $D_{\text{generato}}$ | giudizio del discriminatore sulla ricostruzione, fra 0 e 1 | ricostruzione giudicata generata |
| D | $D_{\text{reale}} - D_{\text{generato}}$, la componente del discriminatore | osservazione più insolita |

Le due componenti sono confrontate con due correlazioni. Quella di Spearman è calcolata sui ranghi: dice se le due componenti mettono i valori nello stesso ordine, e pochi valori estremi pesano poco. Quella di Pearson è calcolata sui valori, e dà più peso ai valori estremi. Entrambe valgono 1 se le due componenti vanno insieme, $-1$ se vanno in senso opposto, 0 se non hanno legame.

**Nello spazio, G e D ordinano i luoghi quasi senza legame.** La correlazione spaziale è calcolata in ogni istante sulle celle, e dice se le due componenti segnalano gli stessi luoghi nello stesso istante. Fra G e D la correlazione di Spearman vale in media 0.015 ed è negativa nel 44% degli istanti (Figura 6.2). Il segno segue la stagione: la media è 0.10 da dicembre a febbraio e $-0.06$ da giugno ad agosto. Sull'insieme delle celle, quindi, le due componenti ordinano i luoghi quasi in modo indipendente, e il poco legame che c'è cambia segno con la stagione.

**Nel tempo, il legame è debole e non ha lo stesso segno in ogni cella.** La correlazione temporale è calcolata in ogni cella sugli istanti, e dice se in quel luogo le due componenti salgono e scendono insieme. Fra G e D la correlazione di Spearman ha mediana $-0.05$ ed è negativa nel 67% delle celle (Figura 6.3). Il legame è un po' più forte nel sud del dominio, con una mediana di $-0.11$ fra 20° e 30°N, e più debole fra 40° e 50°N, con $-0.02$. Escludendo le tre file vicino al margine del dominio, la correlazione è negativa





Figura 6.2: Nello spazio G e D sono poco legati, e il legame cambia con la stagione: la correlazione di Spearman oscilla attorno a zero, quella di Pearson è negativa in circa due giorni su tre, soprattutto in estate. Correlazione spaziale fra G e D in ogni istante degli anni di validazione, calcolata sulle 10611 celle: media giornaliera (linea sottile) e media mobile su 30 giorni (linea spessa).

nel 74% delle celle; le positive stanno per lo più fra 35° e 50°N.[1] Anche nel tempo, quindi, le due componenti sono quasi indipendenti, e il segno del loro legame dipende dal luogo.

**L'unico legame di segno prevalente: dove G è più alto, D tende a essere più bassa.** La correlazione di Pearson, che dà più peso ai valori estremi, è più negativa di quella di Spearman. Nello spazio vale in media $-0.12$ ed è negativa nel 65% degli istanti, soprattutto in estate ($-0.28$ da giugno ad agosto); nel tempo ha mediana $-0.25$ ed è negativa nell'83% delle celle. Questo suggerisce che il legame riguardi i valori più alti di G, come verifica la Sezione 6.4: quando e dove il generatore sbaglia di più, D tende a essere più bassa, cioè il discriminatore giudica l'osservazione meno insolita. La stessa sezione cerca di capire perché.

[1] Nelle tre file di celle più vicine al margine del dominio la correlazione è invece in genere positiva, con una mediana fra 0.08 e 0.17, e nella Figura 6.3 forma una cornice rossa. È probabilmente un effetto del modello, che vicino al margine completa il campo con zeri; il meccanismo non è verificato in dettaglio.





Figura 6.3: La correlazione nel tempo fra G e D è vicina a zero quasi ovunque: è negativa in due celle su tre, soprattutto a sud, e positiva in molte celle fra 35° e 50°N. Correlazione temporale di Spearman fra G e D in ogni cella, sugli anni di validazione. Il blu indica che D scende quando G sale, il rosso che i due salgono insieme; la scala va da $-0.3$ a 0.3, e la freccia indica che alcune celle superano 0.3. La cornice rossa lungo il margine del dominio è probabilmente un effetto del modello. Linee di costa da Natural Earth.

## 6.3 La normalizzazione climatologica

Il valore di G dipende anche da dove e quando è calcolato: dove G è grande per natura, G segnala di più. La normalizzazione climatologica (Sezione 4.7) toglie questa differenza, esprimendo ogni score rispetto a ciò che è abituale per la stessa cella, lo stesso periodo dell'anno e la stessa ora; G così normalizzato è indicato con $G_{\mathrm{n}}$ (Tabella 6.2). Questa sezione verifica se la normalizzazione cambia il legame fra G e D della Sezione 6.2, e dove cadono le segnalazioni.

**Il legame fra G e D resta debole.** Dopo la normalizzazione la correlazione di Spearman fra $G_{\mathrm{n}}$ e D, anch'essa normalizzata, vale in media 0.01 nello spazio e ha mediana $-0.01$ nel tempo: resta vicina a zero. Ciascuna componente conserva quasi lo stesso ordine: la correlazione di Spearman fra la componente prima e dopo la normalizzazione, applicata allo stesso modo anche a D, è 0.91 per G e 0.89 per D, calcolata sulle celle in ogni istante e poi mediata sugli istanti.

**Con la normalizzazione le segnalazioni diventano quasi uniformi.** La normalizzazione cambia invece dove cadono le segnalazioni (Figura 6.4). Con la soglia al 95-esimo percentile, sugli anni di validazione ciascuno score segnala il 5% dei valori. Senza normalizzazione G segnala soprattutto a sud e in estate, dove il suo errore è alto per natura: la percentuale va dall'1.6% fra 50° e 60°N in dicembre all'11.1% fra 20° e 30°N in agosto. Con la normalizzazione resta fra il 3.7% e il 6.3% in ogni fascia e in ogni mese. È l'effetto atteso dalla Sezione 4.7: la normalizzazione toglie la differenza di prevedibilità fra luoghi e stagioni. Lo si misura con la *differenza relativa*: la differenza assoluta media delle percentuali di ogni fascia di latitudine e mese dalla loro media, divisa per la media. Con la normalizzazione la differenza relativa scende da 0.39 a 0.11, cioè di circa tre quarti; con la soglia al 99-esimo percentile, che segnala l'1% dei valori, da 0.70 a 0.28, circa tre quinti (Sezione 6.10).

## 6.4 Che cosa giudica il discriminatore

Le sezioni precedenti mostrano che G e D sono quasi indipendenti, con un solo legame di segno prevalente: dove G è più alto, D tende a essere più bassa. Questa sezione cerca di capire perché, scomponendo D nei suoi due termini, $D_{\mathrm{reale}}$ e $D_{\mathrm{generato}}$ (Tabella 6.2): D è alta quando il discriminatore giudica generata l'osservazione più della sua ricostruzione. Come nella Sezione 6.2, G è qui senza normalizzazione climatologica, come nello score combinato;





Figura 6.4a: Senza normalizzazione le segnalazioni di G si concentrano a sud e in estate. Percentuale dei valori segnalati da G, per fascia di latitudine e mese, sugli anni di validazione, con la soglia al 95-esimo percentile dello score sugli stessi anni. La scala dei colori non è lineare: il bianco corrisponde al 5%, il blu a percentuali minori, il rosso a percentuali maggiori.





Figura 6.4b: Con la normalizzazione climatologica le segnalazioni sono distribuite in modo quasi uniforme. Come la Figura 6.4a, per $G_n$: G con la normalizzazione climatologica per cella, ora e giorno dell'anno (finestra di $\pm 15$ giorni).

i cluster, definiti più avanti, sono invece quelli di $G_{\text{n}}$, cioè di G con la normalizzazione della Sezione 6.3.

**Quando G sale, entrambi i termini scendono.** La correlazione temporale di Spearman fra G e $D_{\text{reale}}$ ha mediana $-0.73$, quella fra G e $D_{\text{generato}}$ ha mediana $-0.69$, ed entrambe sono negative in tutte le celle (Figura 6.5). Quando il generatore sbaglia di più, il discriminatore giudica più reali del consueto sia l'osservazione sia la sua ricostruzione.





Figura 6.5a: In ogni luogo il giudizio del discriminatore sull'osservazione scende quando G sale: tutte le celle sono blu, con correlazioni intorno a $-0.7$. Correlazione temporale di Spearman, in ogni cella, fra G e $D_{\text{reale}}$, sugli anni di validazione, su una scala da $-1$ a 1. Linee di costa da Natural Earth.





Figura 6.5b: Lo stesso vale per il giudizio sulla ricostruzione. Correlazione temporale di Spearman, in ogni cella, fra G e $D_{\text{generato}}$, come nella Figura 6.5a. Linee di costa da Natural Earth.

**I due termini si compensano.** Poiché scendono insieme, i due termini sono legati fra loro, con una correlazione di Spearman mediana di 0.73. D è la loro differenza, e di questo movimento comune conserva solo una piccola parte: per questo il suo legame con G è debole. Nei valori più alti di G, però, $D_{\text{reale}}$ scende un po' più di $D_{\text{generato}}$, e D scende: è il legame negativo che la correlazione di Pearson mette in luce nella Sezione 6.2.

**Cluster di segnalazioni.** Le correlazioni riguardano tutti i valori. Per vedere che cosa fa il discriminatore proprio dove $G_{\mathrm{n}}$ segnala, gli score sono letti attorno ai *cluster di segnalazioni* di $G_{\mathrm{n}}$, o semplicemente cluster. Un cluster è un insieme di valori di $G_{\mathrm{n}}$ sopra la sua soglia, collegati nello spazio e nel tempo: due valori fanno parte dello stesso cluster se in un istante le loro celle si toccano, anche in diagonale, o se sono la stessa cella in due istanti consecutivi. Un cluster indica dove il rilevatore segnala, non un'anomalia meteorologica: più anomalie vicine possono finire nello stesso cluster, e un cluster può non corrispondere ad alcuna anomalia. Sugli anni di validazione risultano 184877 cluster, con 7.7 milioni di valori in tutto, in media circa 42 valori per cluster.

**Le zone e la misura.** In ogni istante le celle sono divise in tre zone (Figura 6.6): il *nucleo*, le celle di un cluster in quell'istante; il *contorno*, le otto celle attorno a una cella del nucleo, le stesse della patch $3 \times 3$ letta dal discriminatore, escluse quelle del nucleo; e la zona *lontana*, le celle a più di tre celle da ogni nucleo. Le celle intermedie non sono considerate. Nucleo e contorno sono definiti dalle sole segnalazioni di $G_{\mathrm{n}}$. In ciascuna zona ogni score è riassunto dal suo *percentile mediano*: per ogni valore si calcola a quale percentile sta fra tutti i valori dello stesso score sugli anni di validazione, da 0 (il più basso) a 100 (il più alto), e se ne prende la mediana. In una zona senza legame con i cluster il percentile mediano sarebbe vicino a 50.





Figura 6.6: Le tre zone attorno a un cluster, in un istante, su una porzione della griglia: il nucleo, il contorno e la zona lontana; le celle intermedie non rientrano in nessuna. Ogni quadrato è una cella.

**Dove $G_n$ segnala, il discriminatore giudica reali l'osservazione e la ricostruzione.** La Figura 6.7 riporta il risultato. Come riferimento sono mostrati $G_n$, lo score che definisce il nucleo, e G senza normalizzazione, molto legato a $G_n$ (correlazione di Spearman 0.91, Sezione 6.3) e quindi anch'esso alto nel nucleo quasi per costruzione; nel contorno entrambi sono alti in parte perché G di una cella è la media dell'errore sulla sua patch $3 \times 3$, che contiene celle del nucleo.

$D_{\text{reale}}$ e $D_{\text{generato}}$ fanno il contrario, e questo non dipende dalla definizione delle zone, che usano solo $G_n$: nel nucleo $D_{\text{reale}}$ ha un percentile mediano di 5 e $D_{\text{generato}}$ di 6, cioè nei valori segnalati da $G_n$ sia l'osservazione sia la ricostruzione sono giudicate più reali del consueto, anche se di poco in valore assoluto. Nel contorno restano bassi, con 12 e 15, anche perché il discriminatore legge la stessa patch; lontano dai cluster salgono a 58 e 57. In D i due effetti in parte si compensano, e nel nucleo il percentile mediano è 27.





Figura 6.7: Nel nucleo dei cluster di $G_n$ il discriminatore giudica reali sia l'osservazione sia la ricostruzione, e D, la differenza dei due giudizi, è al percentile 27. Percentile mediano di $G_n$, di G, di $D_{\text{reale}}$, di $D_{\text{generato}}$ e di D nel nucleo dei cluster di $G_n$, nel loro contorno e nella zona lontana, sugli anni di validazione. La linea tratteggiata indica 50, il valore atteso senza legame con i cluster. $G_n$, che definisce i cluster, e G, l'errore di ricostruzione del generatore senza normalizzazione come nello score combinato, sono alti nel nucleo quasi per costruzione e servono da riferimento.

**Nel nucleo D segnala un valore su quattro.** Nel nucleo il percentile mediano di D è 27, ma il 25.0% supera la soglia di D, il suo 95-esimo percentile sugli anni di validazione, contro il 2.9% della zona lontana: D segnala nel nucleo circa otto volte più che lontano dai cluster, ma solo in un valore su

quattro; negli altri tre resta sotto la soglia. Il giudizio sull'osservazione va invece nel senso opposto: solo lo 0.5% dei valori del nucleo supera la soglia di $D_{\text{reale}}$, contro il 6.1% lontano dai cluster. Anche fra i valori segnalati da $G_{\text{n}}$ il legame è lo stesso: divisi in tre gruppi con lo stesso numero di valori secondo $D_{\text{reale}}$, quello con $D_{\text{reale}}$ più basso, cioè con l'osservazione giudicata più reale, è quello con $G_{\text{n}}$ più alto. In quel gruppo $G_{\text{n}}$, che è in deviazioni standard di G per quella cella, periodo e ora, ha mediana 7.0, circa il doppio della soglia (3.4); negli altri due 4.8 e 4.4. Con una soglia più alta il comportamento è lo stesso e più marcato (Sezione 6.10).

**Un esempio: l'istante con G più alto.** La Figura 6.8 mostra G e D il 9 agosto 2003 alle 12 UTC, l'istante con la media di G più alta degli anni di validazione. Nell'area principale del Nord Africa in cui G è alto, $D_{\text{reale}}$ è vicino a zero, con una mediana di 0.07, e anche $D_{\text{generato}}$ è fra i valori più bassi dell'istante, con una mediana di 0.19: il discriminatore giudica reali sia l'osservazione sia la ricostruzione, l'osservazione di più, e D è fra i valori più bassi del dominio. Su un'area più piccola più a sud-ovest, anch'essa con G alto, il giudizio sull'osservazione è meno netto ($D_{\text{reale}}$ ha una mediana di 0.15), ma anche lì D è bassa. $D_{\text{reale}}$ è basso anche nella penisola arabica, dove G è intorno al 94-esimo percentile dell'istante.

**Le ricostruzioni non sono più lisce delle osservazioni.** Una spiegazione possibile del comportamento di D è che il discriminatore riconosca le ricostruzioni dal loro aspetto più liscio, come accade in letteratura ai modelli addestrati con un errore quadratico [1, 23] e agli autoencoder variazionali [28]. La rugosità di un campo è la differenza quadratica media fra celle adiacenti. La rugosità è misurata su 240 istanti degli anni di validazione (Tabella 6.3) con il modello senza dropout, per non mescolarla con il rumore delle maschere. In mediana sugli istanti, la rugosità delle ricostruzioni è però 1.10 volte quella osservata: l'ipotesi non regge.

**Una lettura: le celle rugose sono giudicate reali.** La rugosità locale di una cella è la media sulle variabili del quadrato della differenza fra il suo valore e la media della sua patch $3 \times 3$. Le celle più rugose sono giudicate più reali (correlazione di Spearman mediana $-0.61$ fra rugosità locale e giudizio sull'osservazione) e tendono ad avere G alto (correlazione mediana 0.49). Lisciare l'osservazione la fa giudicare appena più generata: su tutte le celle il giudizio medio passa, in mediana sugli istanti, da 0.502 a 0.512 (Tabella 6.3), e sale nel 99.6% dei valori con G nel 5% più alto. La rugosità potrebbe quindi spiegare in parte perché, dove G è più alto, il discriminatore giudica reali





Figura 6.8a: G, l'errore di ricostruzione del generatore, il 9 agosto 2003 alle 12 UTC, l'istante con la media di G più alta degli anni di validazione, come percentile fra le celle di quell'istante. La linea arancione racchiude l'1% delle celle con G più alto. Linee di costa da Natural Earth.





Figura 6.8b: Dove G è più alto, D è fra i valori più bassi. D, la componente del discriminatore, nello stesso istante e con la stessa linea della Figura 6.8a; dentro la linea il percentile mediano è 6. Linee di costa da Natural Earth.

Tabella 6.3: Rugosità e giudizio medio del discriminatore sull'osservazione, sulla ricostruzione e sulle loro versioni lisciate con la media della patch $3 \times 3$: mediane su 240 istanti degli anni di validazione, con il modello senza dropout. Un giudizio più alto significa "più generato". Ricostruzione e osservazione hanno una rugosità simile; lisciare un campo ne riduce molto la rugosità e alza un poco il giudizio.

| Campo | Rugosità | Giudizio medio |
|---|---|---|
| Osservazione | 0.00082 | 0.502 |
| Ricostruzione | 0.00089 | 0.502 |
| Osservazione lisciata | 0.00021 | 0.512 |
| Ricostruzione lisciata | 0.00019 | 0.513 |

le osservazioni. È una lettura di correlazioni, non una prova: il lisciamento riduce anche i valori più estremi, un effetto che la verifica non separa.

## 6.5 Conferma sugli anni di test e scelta dello score

Le Sezioni 6.2–6.4 riguardano gli anni di validazione, su cui si sceglie lo score. Questa sezione verifica che i loro risultati valgano anche sugli anni di test e fissa la scelta.

**Sugli anni di test i risultati sono gli stessi.** Le stesse analisi, ripetute sugli anni di test 2005–2025 con la climatologia e le soglie stimate sugli anni di validazione, danno gli stessi risultati (Tabella 6.4): le correlazioni cambiano di al più tre centesimi, i percentili mediani di al più 4 su 100. Sugli anni di test $G_{\mathrm{n}}$ segnala il 5.5% dei valori, un po' più del 5%, probabilmente perché negli anni di test l'errore di ricostruzione del generatore è in media un po' più alto; per lo stesso motivo le percentuali per luogo arrivano al 7.8%.

Tabella 6.4: Le principali misure delle Sezioni 6.2–6.4 sugli anni di validazione, dove si sceglie lo score, e sugli anni di test. Sugli anni di test climatologia e soglie sono quelle stimate sugli anni di validazione. Fra parentesi, la correlazione di Pearson.

| Misura | Validazione | Test |
|---|---:|---:|
| Correlazione spaziale di Spearman fra G e D, media | 0.015 | −0.001 |
| Correlazione temporale di Spearman fra G e D, mediana | −0.05 | −0.07 |
| Correlazione temporale di Spearman fra G e $D_{\mathrm{generato}}$, mediana | −0.69 | −0.69 |
| Correlazione temporale di Spearman fra G e $D_{\mathrm{reale}}$, mediana (di Pearson) | −0.73 (−0.77) | −0.73 (−0.75) |
| Cluster di $G_{\mathrm{n}}$ | 184877 | 794206 |
| Percentile mediano nel nucleo: $D_{\mathrm{reale}}$, $D_{\mathrm{generato}}$, D | 5, 6, 27 | 5, 6, 23 |
| $D_{\mathrm{reale}}$ sopra la propria soglia: nucleo, zona lontana | 0.5%, 6.1% | 0.5%, 6.2% |
| Percentuale per fascia di latitudine e mese di $G_{\mathrm{n}}$ | 3.7–6.3% | 3.6–7.8% |
| Rugosità della ricostruzione rispetto all'osservazione, mediana dei rapporti | 1.10 | 1.08 |
| Celle del 5% più alto di G in cui $D_{\mathrm{reale}}$ sale lisciando l'osservazione | 99.6% | 99.6% |

**D concorda con G solo in parte.** Su validazione e test il quadro è lo stesso: dove $G_{\mathrm{n}}$ segnala, il discriminatore giudica reali sia l'osservazione sia la ricostruzione, e D supera la propria soglia solo in un quarto del nucleo. Senza etichette questo disaccordo, da solo, non dice quale delle due componenti abbia ragione.

**Lo score combinato dell'articolo è, di fatto, D.** Lo score combinato somma le due componenti dopo averle riportate su una scala comune (Sezione 4.6). Sugli anni di validazione ordina i valori quasi come D e poco come G: la correlazione di Spearman con D è 0.99 sia nello spazio sia nel tempo, quella con G è 0.13 nello spazio e 0.07 nel tempo, e con la normalizzazione climatologica i valori restano quasi gli stessi (0.99 con D normalizzato, 0.12 e 0.10 con $G_{\mathrm{n}}$). Anche le segnalazioni sono quelle di D: con i tre score normalizzati, il 94% dei valori segnalati dallo score combinato è segnalato anche da D, solo il 32% anche da $G_{\mathrm{n}}$, e con la soglia al 99-esimo percentile le percentuali sono 93% e 19%. Usare lo score combinato vorrebbe dire, quindi, usare il discriminatore.

**Lo score del rilevatore è $G_{\mathrm{n}}$.** La scelta poggia sul significato delle due componenti. G ha un significato chiaro: misura quanto un campo si allontana da ciò che il modello si aspetta. D dipende anche dal giudizio sulla ricostruzione, e il suo comportamento si spiega solo in parte. Sommarle, come nello score combinato, darebbe di fatto D, come mostra il paragrafo precedente. Il rilevatore usa quindi $G_{\mathrm{n}}$ (Sezione 4.7), che distribuisce le segnalazioni in modo quasi uniforme fra luoghi e stagioni (Sezione 6.3).

## 6.6 Confronto con le baseline

Le sezioni precedenti scelgono lo score del rilevatore, $G_{\mathrm{n}}$; questa ne confronta le segnalazioni con quelle di metodi più semplici, le baseline. È un controllo di coerenza, come raccomandato da Wu e Keogh (Sezione 2.1.5), e non una misura di accuratezza: senza etichette l'accordo non dice quale metodo abbia ragione, e due metodi possono concordare ed entrambi sbagliare. Serve a vedere quali segnalazioni del rilevatore si ottengono anche senza un modello profondo, e quali no.

**I metodi.** Le baseline sono otto (Tabella 6.5). Sei sono modelli shallow, scelti fra i metodi valutati in TSB-AD [21], con i valori predefiniti della libreria Python PyOD: leggono una cella in un istante, cioè il vettore delle sue quindici variabili, senza le celle attorno né gli istanti prima. Ciascuno è stimato su

200000 vettori estratti da 2000 istanti a caso degli anni di addestramento; quanto il risultato dipenda da questo campione è verificato più avanti. Le altre due sono *metodi statistici*, più semplici, che non richiedono un modello. La *distanza dal normale* è l'errore che si commetterebbe rispondendo, in ogni cella, con il valore normale per quel giorno e quell'ora: misura quanto i dati si allontanano dal clima. La *variazione in tre ore* è l'errore che si commetterebbe rispondendo con il valore dell'istante precedente: misura il cambiamento rapido. Nei due errori le variabili hanno gli stessi pesi dell'errore di ricostruzione del generatore (Sezione 4.4). Sono le stesse due distanze con cui la Sezione 4.5 individua i valori esclusi degli anni di validazione; qui sono usate come score, ciascuna con la propria soglia. Nessuna delle otto baseline legge le celle vicine: $G_{\mathrm{n}}$ è l'unico metodo che usa lo spazio.

Tabella 6.5: I metodi confrontati e ciò che leggono di ogni valore. Le descrizioni dei modelli shallow seguono TSB-AD. Per COPOD le distribuzioni di riferimento sono stimate solo sul campione di addestramento, così che lo score di un valore non dipenda dagli altri valori valutati con esso.

| Metodo | Legge | Score |
|---|---|---|
| Distanza dal normale | una cella in un istante | errore della risposta "normale stagionale per quel giorno e quell'ora" |
| PCA | una cella in un istante | distanza dal centro lungo le componenti principali, ciascuna divisa per la percentuale di varianza che spiega |
| CBLOF | una cella in un istante | distanza dal centro del proprio gruppo (8 gruppi), o del gruppo grande più vicino se il proprio è piccolo |
| MCD | una cella in un istante | distanza dal centro dei dati che tiene conto di come le variabili variano insieme (distanza di Mahalanobis con stime robuste) |
| HBOS | una cella in un istante | quanto sono rari i valori della cella, variabile per variabile, letti da un istogramma (10 intervalli) |
| COPOD | una cella in un istante | probabilità di coda di ogni variabile, dalle distribuzioni empiriche |
| Isolation Forest | una cella in un istante | brevità del percorso che isola il valore in 100 alberi casuali, di 256 valori ciascuno |
| Variazione in tre ore | una cella, ora e tre ore prima | errore della risposta "valore di tre ore prima" |
| $G_{\mathrm{n}}$ | celle attorno e istanti prima | errore di ricostruzione del generatore (Sezioni 4.6 e 4.7) |

**Il confronto.** Ogni metodo è trattato come il rilevatore: il suo score è espresso rispetto alla propria climatologia per cella, giorno dell'anno e ora (Sezione 4.7), e la sua soglia è il 95-esimo percentile dello stesso score sugli anni di validazione. Il confronto non serve a scegliere lo score, e riguarda gli anni di test 2005–2025: 651 milioni di valori, con ogni metodo che ne segnala fra il 5.1% e il 5.6% (Tabella 6.6). Se due metodi segnalano gli insiemi di valori $A$ e $B$, la percentuale delle segnalazioni di $A$ condivise con $B$ è $100\,|A \cap B|/|A|$; l'indice di Jaccard,

$$\mathrm{Jac}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}, \tag{6.1}$$

vale 1 quando i due insiemi coincidono e 0 quando sono disgiunti; nel seguito è espresso in percentuale. Due metodi indipendenti condividerebbero circa il 5% delle segnalazioni, con un indice di Jaccard di circa il 3%.

Tabella 6.6: Segnalazioni dei metodi sugli anni di test, con la soglia di ciascuno al 95-esimo percentile del proprio score sugli anni di validazione. "Segnalati": percentuale dei valori che il metodo segnala. "Da solo": percentuale delle sue segnalazioni che nessun altro segnala. "Di $G_\mathrm{n}$": percentuale delle segnalazioni di $G_\mathrm{n}$ segnalate anche dal metodo, che dà l'ordine della tabella. "Jaccard": indice di Jaccard con $G_\mathrm{n}$.

| Metodo | Segnalati | Da solo | Di $G_\mathrm{n}$ | Jaccard |
|---|---|---|---|---|
| Variazione in tre ore | 5.48% | 31.8% | 53.9% | 37.2% |
| MCD | 5.43% | 7.9% | 52.1% | 35.7% |
| PCA | 5.31% | 0.6% | 48.7% | 33.1% |
| Isolation Forest | 5.17% | 4.1% | 44.0% | 29.4% |
| CBLOF | 5.41% | 7.7% | 43.4% | 28.2% |
| COPOD | 5.16% | 6.9% | 43.4% | 29.0% |
| Distanza dal normale | 5.62% | 14.0% | 40.8% | 25.4% |
| HBOS | 5.14% | 9.5% | 39.2% | 25.5% |
| $G_\mathrm{n}$ | 5.54% | 18.1% | – | – |

**I metodi che leggono una cella in un istante concordano fra loro.** La Figura 6.9 riporta l'indice di Jaccard di ogni coppia. I sei modelli shallow e la distanza dal normale formano un gruppo, con indici fra il 35% e il 63%: leggono lo stesso vettore, e tutti misurano quanto il valore è lontano da ciò che è abituale. La variazione in tre ore resta da parte, con indici fra il 17% e il 26%: segnala soprattutto altri valori.





Figura 6.9: I metodi che leggono una cella in un istante formano un gruppo (nel riquadro), la variazione in tre ore resta da parte, e $G_n$ si sovrappone a entrambi. Indice di Jaccard delle segnalazioni di ogni coppia di metodi sugli anni di test, in percentuale, con la soglia di ciascuno al 95-esimo percentile del proprio score sugli anni di validazione; ogni coppia compare una volta.

**$G_\mathrm{n}$ si sovrappone a entrambi.** Il 54% delle segnalazioni di $G_\mathrm{n}$ è segnalato anche dalla variazione in tre ore, e fra il 39% e il 52% da ciascuno dei metodi che leggono una cella in un istante, contro il 5% atteso fra metodi indipendenti. Il metodo più vicino alla variazione in tre ore è $G_\mathrm{n}$, con un indice di Jaccard del 37%; fra gli altri metodi il più vicino alla variazione in tre ore è MCD, con il 26%. Il risultato è coerente con la definizione di G: il generatore risponde a partire dagli istanti precedenti, quindi il suo errore può crescere sia quando un valore si allontana dal consueto sia quando cambia in fretta. L'accordo da solo non dimostra però questo meccanismo. Nessun singolo metodo semplice riproduce le segnalazioni di $G_\mathrm{n}$: il più vicino ne condivide poco più della metà.

**Il voto a maggioranza.** Il 4.22% dei valori è segnalato da almeno cinque metodi su nove, $G_\mathrm{n}$ compreso, e il 48.3% delle segnalazioni di $G_\mathrm{n}$ è condiviso da questa maggioranza. Sette metodi su nove leggono una cella in un istante, quindi il voto misura soprattutto quanto si è vicini a quel gruppo, non quale metodo sia migliore.

**Le segnalazioni del solo $G_\mathrm{n}$.** Il 18.1% delle segnalazioni di $G_\mathrm{n}$ non è segnalato da nessun altro metodo, circa l'1% di tutti i valori; l'81.9% è quindi segnalato anche da almeno un altro. Gli altri otto insieme segnalano circa il 14% dei valori: se $G_\mathrm{n}$ fosse indipendente da loro, ne condividerebbe circa il 14% delle segnalazioni, contro l'81.9% osservato. La percentuale di segnalazioni esclusive di $G_\mathrm{n}$ è intermedia: è il 31.8% per la variazione in tre ore, il 14.0% per la distanza dal normale, meno del 10% per i modelli shallow. Segnalare molto da solo non è di per sé un pregio: può indicare ciò che solo il generatore coglie, per esempio perché legge le celle vicine, oppure un suo errore. Il confronto non permette di distinguere i due casi.

**La stabilità dei modelli shallow.** I modelli shallow dipendono dal campione su cui sono stimati. Stimati di nuovo con campioni più grandi e con un altro seme e confrontati sugli anni di validazione, PCA, MCD e COPOD segnalano quasi gli stessi valori, con un indice di Jaccard fra il 98% e il 99%; CBLOF, Isolation Forest e HBOS cambiano di più, e HBOS con sé stesso arriva solo al 54–58%. Il 25.5% fra $G_\mathrm{n}$ e HBOS va quindi confrontato con questo valore, non con il 100%. L'accordo di $G_\mathrm{n}$ con MCD e PCA non ne risente.

**Sintesi.** I metodi che leggono una cella in un istante segnalano in larga parte gli stessi valori, la variazione in tre ore ne segnala altri, e $G_\mathrm{n}$ si sovrappone a

entrambi senza coincidere con nessuno: la maggior parte delle sue segnalazioni è condivisa da almeno una baseline. Questo sostiene la coerenza del rilevatore, ma non ne misura l'accuratezza.

## 6.7 Cluster di segnalazioni per tipo e dimensione

Scelto lo score, resta da descrivere che cosa segnala: quanto sono grandi i cluster, quali variabili vi si allontanano di più dal normale e come cala $G_{\mathrm{n}}$ attorno a ciò che segnala. Le segnalazioni sono raggruppate nei cluster della Sezione 6.4, cioè in insiemi di valori segnalati collegati nello spazio, anche in diagonale, o nella stessa cella in istanti consecutivi: sugli anni di test se ne contano 794206, con 36.1 milioni di valori, dove un valore è, come nel resto del capitolo, una cella in un istante. Come livello di riferimento, le stesse misure sono ripetute sui cluster che ciascuna delle otto baseline della Sezione 6.6 forma con le proprie segnalazioni, anch'esse al 5% con la soglia stimata sugli anni di validazione (Tabella 6.7). Le baseline leggono una cella alla volta, senza le celle attorno, e non dipendono dal modello addestrato.

**Pochi cluster enormi contengono circa tre quarti dei valori.** La dimensione di un cluster è il numero dei suoi valori. Il 90.6% dei cluster ha meno di 20 valori, e insieme contengono solo il 7.5% dei valori segnalati; lo 0.5% dei cluster, quelli con almeno 1000 valori, ne contiene il 75.5% (Figura 6.10). Le baseline formano più cluster minuscoli: fra il 94.7% e il 97.1% dei loro cluster ha meno di 20 valori, contro il 90.6% di $G_{\mathrm{n}}$: le sue segnalazioni sono quindi più raggruppate, in parte perché lo score di una cella è mediato sulla sua patch $3 \times 3$.

**Il tipo di cluster.** Lo scarto standardizzato di una variabile è quello della Sezione 4.3: la sua differenza dal normale stagionale divisa per la deviazione standard stagionale, per quella cella, quel giorno dell'anno e quell'ora. Dice di quante deviazioni standard la variabile si allontana dal normale, ed è negativo sotto il normale. Il tipo di un cluster è la variabile d'ingresso con la media più alta del valore assoluto dello scarto standardizzato, su tutte le celle del cluster e in tutti i suoi istanti: dice quale variabile si allontana di più, non di quale anomalia meteorologica si tratti, e le variabili con valori molto estremi, come la precipitazione, possono risultare più spesso le più lontane. La velocità verticale e la precipitazione raccolgono da sole il 61% dei valori segnalati di $G_{\mathrm{n}}$; segue, molto distante, la copertura nuvolosa, con il 7% (Figura 6.11). Il





Figura 6.10: I cluster sono quasi tutti piccoli, ma i valori segnalati stanno quasi tutti in pochi cluster enormi. I cluster di $G_{\text{n}}$ sugli anni di test, divisi per dimensione, cioè per numero di valori segnalati (coppie cella–istante) che contengono: piccoli (meno di 20), medi (da 20 a 999) ed enormi (1000 o più). In alto la percentuale dei cluster di ciascuna classe, in basso la percentuale dei valori segnalati che vi stanno. Un cluster di un solo valore, il più frequente, è una cella segnalata in un solo istante, senza segnalazioni accanto né subito prima o dopo.

Tabella 6.7: I cluster di $G_{\text{n}}$ e quelli di ciascuna baseline della Sezione 6.6, ognuno formato dalle proprie segnalazioni, sugli anni di test, con la soglia di ciascun metodo al 95-esimo percentile del proprio score sugli anni di validazione. “Cluster”: numero di cluster. “Cluster piccoli”: percentuale dei cluster con meno di 20 valori. “Valori in cluster enormi”: percentuale dei valori segnalati che stanno in cluster con almeno 1000 valori (le stesse classi della Figura 6.10). “Celle fuori dal bordo”: percentile mediano dello score a una, due e sei celle fuori dal bordo dei propri cluster; il profilo completo è nella Figura 6.12. I tipi sono nella Figura 6.11.

| | | | | celle fuori dal bordo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo | Cluster | Cluster piccoli | Valori in cluster enormi | 1 | 2 | 6 |
| $G_{\text{n}}$ | 794 k | 90.6% | 75.5% | 90 | 79 | 50 |
| Distanza dal normale | 768 k | 95.1% | 85.6% | 87 | 73 | 47 |
| Variazione in tre ore | 2.80 M | 96.5% | 60.2% | 84 | 64 | 41 |
| PCA | 1.16 M | 95.8% | 79.4% | 88 | 75 | 47 |
| MCD | 1.73 M | 96.4% | 73.7% | 87 | 70 | 43 |
| CBLOF | 980 k | 95.3% | 81.5% | 87 | 71 | 45 |
| COPOD | 697 k | 94.7% | 84.5% | 91 | 82 | 56 |
| HBOS | 1.58 M | 97.1% | 78.1% | 88 | 76 | 48 |
| Isolation Forest | 1.19 M | 96.0% | 79.0% | 89 | 77 | 49 |

tipo dominante dipende dal metodo. La variazione in tre ore ha quasi gli stessi tipi di $G_{\mathrm{n}}$, con velocità verticale e precipitazione al 65% dei valori e la copertura nuvolosa al terzo posto. Anche MCD raccoglie in queste due variabili il 68% dei valori, ma con la precipitazione al primo posto (43%) e l'umidità del suolo al terzo. Negli altri metodi il tipo principale cambia: nella distanza dal normale e in CBLOF è l'umidità del suolo, che cambia lentamente e forma cluster lunghi; in COPOD e HBOS è la velocità d'attrito; in PCA e Isolation Forest i valori sono divisi fra più tipi.

**I cluster più grandi sono catene.** Quando è segnalato il 5% dei valori, segnalazioni dovute ad anomalie meteorologiche diverse possono toccarsi e unirsi in un solo cluster; i più grandi durano settimane: il più grande di precipitazione dura 40 giorni, quello di velocità verticale 23, e in quasi tutti i loro istanti contano centinaia di celle, con una mediana rispettivamente di 472 e 723. Un cluster così lungo difficilmente corrisponde a un'unica anomalia: è piuttosto una catena, cioè una successione di gruppi di segnalazioni, ciascuno a contatto con il seguente, e la sua dimensione dice quanto si estende la catena. Le catene non sono una particolarità di $G_{\mathrm{n}}$: in tutti i metodi i cluster con almeno 1000 valori contengono fra il 60% e l'86% dei valori segnalati (Tabella 6.7). Le catene dipendono poco dal collegamento nello spazio e molto da quello nel tempo: senza le diagonali la percentuale dei valori nei cluster con almeno 1000 valori resta al 74%; se invece due istanti consecutivi si collegano solo quando le celle in comune sono almeno la metà di quelle dell'istante con meno celle, la percentuale scende al 57%, e senza alcun collegamento nel tempo sarebbe l'1%. Vengono quindi soprattutto dalla persistenza nel tempo delle aree segnalate, e in parte dalla percentuale segnalata: con la soglia più alta si accorciano (Sezione 6.10).

**$G_{\mathrm{n}}$ cala in modo graduale.** Resta da vedere come $G_{\mathrm{n}}$ cala dal nucleo verso l'esterno; un esempio su una mappa è nella Figura 6.14. La Figura 6.12 riassume tutti gli anni di test: per ogni cella si conta a quante celle sta dal bordo del cluster più vicino, verso l'interno o verso l'esterno, e si legge il percentile mediano dello score sugli stessi anni, dove 100 è il valore più alto e 50 un valore tipico. La prima cella dentro è l'ultima del nucleo; la prima fuori è il contorno. Che le celle segnalate stiano sopra la soglia e le altre sotto è vero per costruzione; il risultato è la forma della curva. A una cella dentro il bordo $G_{\mathrm{n}}$ vale 96, a una cella fuori 90, due celle fuori 79, tre celle fuori 68, e torna a un valore tipico dopo circa sei celle, cioè tre gradi, circa 300 km. Oltre scende ancora, perché lontano dai cluster restano soprattutto i valori bassi. $G_{\mathrm{n}}$ distingue quindi nucleo, contorno e zona lontana in modo graduale,





Figura 6.11: Il tipo dominante dipende dal metodo: in $G_n$ e nella variazione in tre ore dominano velocità verticale e precipitazione, nella distanza dal normale e in CBLOF l'umidità del suolo, in COPOD e HBOS la velocità d'attrito. Percentuale dei valori segnalati per tipo di cluster, sugli anni di test, per tutti i quindici tipi: nei cluster di $G_n$ (prima colonna) e in quelli di ciascuna baseline, ognuno formato dalle proprie segnalazioni. I tipi sono ordinati dal più frequente in $G_n$; ogni colonna somma a 100, e più il colore è scuro, più la percentuale è alta.

senza un confine proprio: la soglia taglia una curva continua. Le baseline, ciascuna sui propri cluster, hanno la stessa forma, ma quasi tutte calano più in fretta: a due celle fuori $G_n$ vale 79 e le baseline fra 64 (variazione in tre ore) e 77 (Isolation Forest); solo COPOD, con 82, cala ancora più lentamente di $G_n$. A sei celle tutti i metodi sono fra 41 e 56. Per $G_n$ parte della gradualità vicino al bordo dipende dalla patch $3 \times 3$ su cui lo score è mediato, che le baseline, lette cella per cella, non hanno. Il nucleo, inoltre, è sottile: il 67% dei valori segnalati sta sul bordo del cluster, a una sola cella dall'esterno.





Figura 6.12a: $G_n$ cala più lentamente di quasi tutte le baseline. Ogni metodo sui propri cluster: percentile mediano dello score secondo le celle di distanza dal bordo del cluster più vicino, sugli anni di test, con la soglia di ciascun metodo al 95-esimo percentile del proprio score sugli anni di validazione; i sei modelli shallow sono la fascia grigia, dal più basso al più alto.





Figura 6.12b: Sui cluster di $G_n$ tutte le baseline calano allo stesso modo di $G_n$. Come la Figura 6.12a, ma con tutti i metodi misurati sui cluster di $G_n$.

**Anche le baseline seguono il profilo di $G_n$.** Letti sui cluster di $G_n$ invece che sui propri, gli score delle baseline non giudicano $G_n$: dicono quanto erano insoliti, per ciascun metodo, i dati dove $G_n$ segnala. È la Figura 6.12b; nella Figura 6.12a ogni metodo segue invece i propri cluster. Sui cluster di $G_n$ tutte le baseline hanno lo stesso andamento di $G_n$: valgono 99–100 nelle

celle più interne, fra 89 e 93 una cella dentro il bordo, fra 79 e 84 una cella fuori ($G_\mathrm{n}$: 96 e 90) e fra 49 e 53 dopo sei celle. La distanza dal normale è fra le più basse e continua a salire anche dentro il nucleo, da 89 a 96 in una sola cella: la sua soglia non coincide con il bordo, quindi la salita non è un effetto della soglia. Che le grandezze salgano insieme mostra che le segnalazioni non cadono a caso, non che siano giuste.

**Insolito, ma non sempre estremo.** Nel nucleo solo il 41% dei valori supera la soglia della distanza dal normale, contro il 16% nel contorno e il 2% nella zona lontana. Il restante 59% resta sotto quella soglia: $G_\mathrm{n}$ segnala anche valori che, presi uno per uno, non sono fra i più lontani dal clima. In parte è atteso, perché i due score misurano cose diverse. Anche la dimensione conta: il percentile mediano della distanza dal normale nel nucleo va da 79–80 nei cluster con meno di 20 valori a 95 in quelli con almeno 10000, quindi i cluster piccoli sono i meno estremi.

**Per tipo di cluster, $G_\mathrm{n}$ cala in modo simile, come diverse baseline.** Vicino al bordo $G_\mathrm{n}$ è quasi uguale per tutti i tipi: una cella fuori vale fra 89 e 91. Più lontano si separa di poco: a sei celle va da 43 per la radiazione solare a 58 per la pressione. Non è una proprietà del solo $G_\mathrm{n}$: a due celle fuori dal bordo dei propri cluster, il percentile mediano di $G_\mathrm{n}$ va dal 74 all'82 a seconda del tipo, quello della variazione in tre ore dal 60 al 67, di HBOS dal 73 all'81 e di COPOD dal 76 all'85, mentre quelli della distanza dal normale, di MCD e di PCA vanno da poco più di 60 a oltre 80 (Figura 6.13c); per sette metodi su nove il tipo più basso è la radiazione solare.

**Lo scarto standardizzato della variabile del tipo cala invece in modo diverso.** Le differenze grandi riguardano lo scarto standardizzato della variabile del tipo (Figura 6.13). A differenza della distanza dal normale, che riassume tutte le variabili di una cella, lo scarto standardizzato riguarda una sola variabile; qui se ne usa il valore assoluto. La variabile del tipo è per definizione la più lontana dal normale nel nucleo: è in parte atteso che lì lo scarto standardizzato sia alto e fuori scenda, e il confronto utile è fra i tipi. Per precipitazione, copertura nuvolosa e radiazione solare lo scarto standardizzato torna vicino ai livelli di fondo entro due celle dal bordo: per la precipitazione scende da 1.33 nell'ultima cella del nucleo a 0.48 due celle fuori, per la copertura nuvolosa da 1.62 a 0.52. La velocità verticale scende più lentamente, da 1.38 a 0.78. Per la temperatura a due metri resta alto a lungo: a sette celle fuori lo scarto standardizzato è ancora 1.33. La pressione e la temperatura a 850 hPa si comportano allo stesso modo, con

1.38 e 1.58 a sette celle; i venti e l'umidità specifica stanno in mezzo. Lo scarto standardizzato mediano non è mai zero: a otto o più celle dal bordo vale 0.42 per la precipitazione e 0.98 per la pressione, e questi sono i livelli di fondo.

Il risultato è coerente con il modo in cui queste variabili cambiano nello spazio, anche se la verifica non lo dimostra: precipitazione e nuvole possono cambiare da una cella all'altra, mentre temperatura e pressione variano su aree più ampie. Nel primo gruppo il nucleo di $G_{\mathrm{n}}$ contiene quasi tutta l'area in cui lo scarto standardizzato è alto. Nel secondo lo scarto standardizzato continua oltre il nucleo: $G_{\mathrm{n}}$ ne segnala solo una parte, e le celle attorno, pur lontane dal normale, restano sotto la sua soglia.

**Sintesi.** In tutti i metodi la maggior parte dei valori segnalati, fra il 60% e l'86%, sta in pochi cluster enormi; in $G_{\mathrm{n}}$ circa tre quarti, per lo più di velocità verticale o precipitazione; i tipi di $G_{\mathrm{n}}$ somigliano a quelli della variazione in tre ore e, in parte, di MCD. $G_{\mathrm{n}}$ cala gradualmente attorno a ciò che segnala, senza un confine proprio e più lentamente di quasi tutte le baseline, in parte per la patch su cui è mediato. Letta sui cluster di $G_{\mathrm{n}}$, la distanza dal normale ha lo stesso andamento, ma solo il 41% dei valori segnalati ne supera la soglia.

### 6.7.1 Un cluster per tipo

Fin qui i cluster sono descritti tutti insieme e per tipo; resta da vedere un cluster per ciascuno dei tre tipi principali, per vedere su una mappa che cosa riassumono i numeri. Gli esempi sono scelti con una regola fissata prima di esaminarli, così che nessuno sia preso per il suo aspetto: i tipi sono i tre con più valori nei cluster di almeno 20 valori, cioè velocità verticale, precipitazione e copertura nuvolosa; per ciascuno l'esempio è il cluster con più valori fra quelli che durano al massimo tre giorni, letto nell'istante in cui conta più celle. Il limite di durata esclude le catene descritte sopra, che difficilmente corrispondono a un'unica anomalia meteorologica. Gli esempi non sono quindi i casi più importanti né i più tipici: mostrano come appare un cluster compatto di ciascun tipo.

**Come leggere le figure.** Ogni esempio ha quattro immagini. Le prime due sono le mappe dello scarto standardizzato della variabile del tipo e di $G_{\mathrm{n}}$, con il nucleo del cluster racchiuso dalla linea arancione; la terza segue nel tempo la cella cerchiata sulle mappe, cioè la cella del nucleo con $G_{\mathrm{n}}$ più alto; la quarta è il profilo del cluster dal nucleo verso l'esterno, come nella





Figura 6.13a: $G_n$ cala allo stesso modo per tutti i tipi di cluster. Percentile mediano di $G_n$ secondo le celle di distanza dal bordo del cluster, per ogni tipo di cluster, sugli anni di test. In colore, con i nomi nella Figura 6.13b, i tre tipi principali, quelli con più valori segnalati nei cluster medi ed enormi della Figura 6.10 (velocità verticale, precipitazione e copertura nuvolosa), e la temperatura a due metri, citata nel testo; gli altri tipi sono in grigio. Ogni punto è la mediana dei valori a quella distanza in tutti i cluster del tipo, di ogni dimensione; i punti con meno di 1000 valori non sono tracciati, perché la mediana sarebbe poco affidabile.





Figura 6.13b: Le variabili, invece, calano in modo diverso: alcune tornano ai livelli di fondo entro due celle fuori dal bordo del cluster, come la precipitazione, altre restano a lungo lontane dal normale, come la temperatura a due metri. Scarto standardizzato mediano, in valore assoluto, della variabile che dà il nome al tipo, in deviazioni standard (0 è il valore normale), con gli stessi tipi e colori della Figura 6.13a; l'asse è limitato a 3.5.





Figura 6.13c: $G_n$ non è il solo a calare allo stesso modo per tutti i tipi di cluster: è fra i metodi più uniformi, con la variazione in tre ore, HBOS e COPOD, mentre la distanza dal normale, MCD e PCA cambiano di 20 su 100 o più da un tipo all'altro. Una riga per metodo, ciascuno sui propri cluster. Ogni pallino è un tipo di cluster, con i colori della Figura 6.13a, e sta al percentile mediano dello score nei valori a due celle fuori dal bordo: il percentile dice dove cade lo score fra i valori degli anni di validazione (50 è il valore tipico, 95 la soglia), e la mediana è presa su tutti i valori a quella distanza. Il segmento va dal tipo più basso al più alto; il numero a destra è la differenza fra i due percentili, su una scala da 0 a 100. Anni di test, con la soglia di ciascun metodo al 95-esimo percentile del proprio score sugli anni di validazione; non sono considerati i tipi con meno di 1000 valori a quella distanza.

Figura 6.12a. La Tabella 6.8 riassume le tre zone. I luoghi del nucleo nominati nel testo sono letti sulla mappa.

Tabella 6.8: I tre esempi nell'istante delle mappe, con le celle del nucleo. Le colonne $G_{\mathrm{n}}$ e Distanza riportano il percentile mediano di $G_{\mathrm{n}}$ e della distanza dal normale nel nucleo e nel contorno di questo cluster e nella zona lontana, a più di tre celle da ogni cella segnalata, in quest'ordine. "Oltre soglia" è la percentuale dei valori del nucleo oltre la soglia della distanza dal normale.

| Tipo | Celle | $G_{\mathrm{n}}$ | Distanza | Oltre soglia | Durata (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità verticale | 549 | 97, 91, 42 | 97, 94, 40 | 65% | 63 |
| Precipitazione | 576 | 97, 91, 33 | 91, 87, 44 | 34% | 72 |
| Copertura nuvolosa | 404 | 98, 89, 43 | 93, 56, 33 | 46% | 66 |

**Velocità verticale.** Il 23 novembre 2017 il nucleo forma una fascia stretta che va dall'Atlantico al largo del Portogallo fino alla Scandinavia meridionale, passando sul Golfo di Biscaglia, sulla Manica e sul Mare del Nord (Figura 6.14). Lungo la fascia la velocità verticale, che in ERA5 è in $\mathrm{Pa\,s^{-1}}$ e quindi è negativa quando l'aria sale, è per lo più sotto il normale: lo scarto standardizzato è negativo, cioè l'aria sale più o scende meno del consueto, nel 73% delle celle del nucleo; nel 34% è inferiore a 1 in valore assoluto, vicino al normale. Una parte del nucleo, 25 celle, sta sulla prima fila del dominio, a 60°N, cioè sul margine del dominio, dove il modello si comporta probabilmente in modo diverso (Sezione 6.2): quella parte va letta con cautela. Nella cella seguita, a 58.5°N e 8.5°E, $G_{\mathrm{n}}$ supera la soglia nelle prime ore del 22 novembre e vi resta, salvo una breve pausa, per circa un giorno e mezzo, finché la cella fa parte del cluster; la distanza dal normale sale insieme a $G_{\mathrm{n}}$ e supera il 90-esimo percentile per circa un giorno. Poi entrambi tornano a valori tipici. Il cluster cresce e cala in modo abbastanza regolare, con il massimo nell'istante delle mappe.





Figura 6.14a: Il nucleo è una fascia stretta in cui la velocità verticale è per lo più sotto il normale. Scarto standardizzato della velocità verticale il 23 novembre 2017 alle 00 UTC; in arancione il nucleo del cluster (63 ore, dal 21 al 24 novembre 2017, con il massimo in questo istante), il cerchio è la cella della Figura 6.14c. Linee di costa da Natural Earth.





Figura 6.14b: $G_n$ nello stesso istante della Figura 6.14a, come percentile, con lo stesso nucleo e la stessa cella. Linee di costa da Natural Earth.





Figura 6.14c: Nella cella cerchiata $G_n$ resta oltre la soglia, salvo una breve pausa, per circa un giorno e mezzo, e la distanza dal normale sale e scende insieme a $G_n$. In alto il percentile di ogni score nella cella (gli score leggono tutte le variabili), con le baseline come nella Figura 6.12a; in basso lo scarto standardizzato della velocità verticale da sola. In azzurro gli istanti in cui la cella fa parte del cluster.





Figura 6.14d: Il cluster dal nucleo verso l'esterno, nell'istante delle mappe: percentile mediano di ogni score secondo le celle dal bordo del cluster, con le baseline come nella Figura 6.12a; fuori, solo le celle più vicine a questo nucleo che ad altre segnalazioni.

**Precipitazione.** Il 19 maggio 2006 il nucleo è diviso in più parti (Figura 6.15). La maggiore va dalle Alpi orientali, attraverso l'Europa centro-orientale, fino al Baltico; una seconda copre l'Inghilterra meridionale, la Manica e il Benelux; altre più piccole stanno fra le due, sulle Alpi e attorno alle Baleari. La precipitazione è sopra il normale nel 91% delle celle del nucleo, con uno scarto standardizzato mediano di 2.2, e lo scarto standardizzato supera 3 nel 28% delle celle. Dei tre esempi è il meno estremo per la distanza dal normale, che riassume tutte le variabili: nel nucleo ha un percentile mediano di 91, e il 34% dei valori ne supera la soglia, contro il 41% di tutti i valori segnalati. La cella seguita, a 56.5°N e 23°E, mostra che $G_{\mathrm{n}}$ e la distanza dal normale non vanno sempre insieme. La distanza dal normale vi è sopra il 90-esimo percentile fin dall'inizio della serie, tre giorni prima, mentre la precipitazione è vicina al normale e $G_{\mathrm{n}}$ resta sotto la soglia, pur alto: lontane dal normale sono quindi altre variabili. $G_{\mathrm{n}}$ supera la soglia solo la sera del 18 maggio, quando la precipitazione sale sopra il normale, e la cella fa parte del cluster per tre istanti, fino all'istante delle mappe. La stessa cella torna oltre la soglia il 21 maggio, quando il cluster è già finito, e fa quindi parte di un altro.





Figura 6.15a: Il nucleo è diviso in più parti, in cui la precipitazione è quasi ovunque sopra il normale. Scarto standardizzato della precipitazione il 19 maggio 2006 alle 03 UTC; in arancione il nucleo del cluster (72 ore, dal 16 al 19 maggio 2006, finito poche ore dopo il massimo), il cerchio è la cella della Figura 6.15c. Linee di costa da Natural Earth.





Figura 6.15b: $G_n$ nello stesso istante della Figura 6.15a, come percentile, con lo stesso nucleo e la stessa cella. Linee di costa da Natural Earth.





Figura 6.15c: Nella cella cerchiata la distanza dal normale è alta già nei giorni prima, e $G_n$ supera la soglia solo quando arriva la precipitazione. In alto il percentile di ogni score nella cella (gli score leggono tutte le variabili), con le baseline come nella Figura 6.12a; in basso lo scarto standardizzato della precipitazione da sola. In azzurro gli istanti in cui la cella fa parte del cluster.





Figura 6.15d: Il cluster dal nucleo verso l'esterno, nell'istante delle mappe: percentile mediano di ogni score secondo le celle dal bordo del cluster, con le baseline come nella Figura 6.12a; fuori, solo le celle più vicine a questo nucleo che ad altre segnalazioni.

**Copertura nuvolosa.** Il 15 giugno 2024 il nucleo forma una fascia stretta che va dalla costa atlantica del Sahara occidentale, attraverso il Marocco e l'Algeria, fino alla costa mediterranea dell'Algeria, con una piccola parte sul mare fra le Baleari e la Sardegna (Figura 6.16). La copertura nuvolosa è sopra il normale nel 92% delle celle del nucleo, con uno scarto standardizzato mediano di 2.1, e lo scarto standardizzato supera 3 nel 19% delle celle. Il nucleo segue lo scarto standardizzato da vicino: fra i tre esempi è quello in cui la distanza dal normale cala di più dal nucleo al contorno (Tabella 6.8). Sulla stessa mappa $G_{\mathrm{n}}$ è alto anche altrove, soprattutto sul Mediterraneo orientale, in altri cluster. Nella cella seguita, a 23.5°N e 13°W, $G_{\mathrm{n}}$ supera la soglia per cinque istanti, dalle 03 alle 15 UTC del 15 giugno, gli stessi in cui la cella fa parte del cluster; lo scarto standardizzato della copertura nuvolosa vi è fra 1.9 e 3.5, e la distanza dal normale supera il 90-esimo percentile dalle 06 alle 12 UTC. Prima e dopo, $G_{\mathrm{n}}$ e la distanza dal normale tornano a valori tipici. Il cluster conta fra circa 200 e 400 celle per quasi due giorni, con il massimo, 404 celle, nell'istante delle mappe.





Figura 6.16a: Il nucleo è una fascia stretta sull'Africa nord-occidentale in cui la copertura nuvolosa è quasi ovunque sopra il normale. Scarto standardizzato della copertura nuvolosa il 15 giugno 2024 alle 12 UTC; in arancione il nucleo del cluster (66 ore, dal 14 al 17 giugno 2024, con il massimo in questo istante), il cerchio è la cella della Figura 6.16c. Linee di costa da Natural Earth.





Figura 6.16b: $G_n$ nello stesso istante della Figura 6.16a, come percentile, con lo stesso nucleo e la stessa cella. Linee di costa da Natural Earth.





Figura 6.16c: Nella cella cerchiata $G_n$ e la distanza dal normale salgono e scendono insieme, e $G_n$ resta oltre la soglia per dodici ore. In alto il percentile di ogni score nella cella (gli score leggono tutte le variabili), con le baseline come nella Figura 6.12a; in basso lo scarto standardizzato della copertura nuvolosa da sola. In azzurro gli istanti in cui la cella fa parte del cluster.





Figura 6.16d: Il cluster dal nucleo verso l'esterno, nell'istante delle mappe: percentile mediano di ogni score secondo le celle dal bordo del cluster, con le baseline come nella Figura 6.12a; fuori, solo le celle più vicine a questo nucleo che ad altre segnalazioni.

**Che cosa mostrano gli esempi.** In due delle tre celle seguite, ciascuna quella del nucleo con $G_{\mathrm{n}}$ più alto, $G_{\mathrm{n}}$ e la distanza dal normale salgono e scendono insieme; nella cella della precipitazione la distanza dal normale è alta già nei giorni prima, e $G_{\mathrm{n}}$ supera la soglia solo quando arriva la precipitazione. Il nucleo, inoltre, non contiene tutte le celle in cui la variabile del tipo è più lontana dal normale: delle celle del dominio con uno scarto standardizzato oltre 3 in valore assoluto nell'istante delle mappe contiene il 37% per la velocità verticale, il 62% per la precipitazione e il 57% per la copertura nuvolosa. Per la velocità verticale quasi una cella su cinque di queste sta nella zona lontana, senza alcuna segnalazione; per gli altri due tipi solo l'1%. Negli esempi si vede anche quanto mostrano i numeri aggregati: il tipo non descrive ogni cella, perché in una parte del nucleo la variabile del tipo è vicina al normale, e $G_{\mathrm{n}}$ segnala anche valori che, per la distanza dal normale, non sono fra i più estremi. Nei profili $G_{\mathrm{n}}$ cala gradualmente dal nucleo verso l'esterno in tutti e tre gli esempi, come nel caso generale; nella copertura nuvolosa la distanza dal normale cala invece molto più in fretta di $G_{\mathrm{n}}$ già fuori dal bordo. Sono esempi scelti con una regola, non una prova che le segnalazioni corrispondano ad anomalie meteorologiche, che senza un riferimento esterno non si può dare.

## 6.8 La dispersione del dropout

Fin qui si è usata la media delle estrazioni di dropout; questa sezione guarda quanto differiscono fra loro. Lo score è la media di 20 estrazioni con maschere diverse, e la loro deviazione standard è la *dispersione* (Sezione 4.6). Non è una probabilità di anomalia: senza etichette non si può stabilire se una segnalazione con estrazioni concordi sia più giusta di una con estrazioni discordi. Si può però vedere quanto le segnalazioni dipendono dalle maschere, e dove le estrazioni si separano. Poiché la dispersione cresce con G, con una correlazione di Spearman di 0.86, conviene leggerla in proporzione: il *rapporto* di un valore è la dispersione di G divisa per G stesso, senza normalizzazione. La sezione riguarda gli anni di test.

**Tre segnalazioni su quattro reggono alle maschere.** Il 75% dei valori segnalati resta sopra la soglia togliendo a $G_{\mathrm{n}}$ una volta la dispersione, riportata nella stessa scala, cioè divisa per la stessa deviazione standard climatologica che dà $G_{\mathrm{n}}$; il 55% togliendone due; dei valori non segnalati, solo l'1.8% la supererebbe aggiungendone una. È una prova severa, perché la dispersione riguarda le singole estrazioni, mentre lo score ne è la media.

**In proporzione, la dispersione cala solo sui valori di G più alti.** In valore assoluto la dispersione cresce con G, ma in proporzione resta quasi costante (Figura 6.17a): in ogni fascia di G, la dispersione media divisa per G medio è fra l'11.1% e l'11.8% fino al 99-esimo percentile di G, e scende solo oltre, al 9.7% fra il 99-esimo e il 99.9-esimo percentile e al 9.1% nello 0.1% più alto. Le maschere incidono quindi su G in proporzione quasi uguale, tranne sui valori più alti, su cui incidono un po' meno.

**Attraverso i cluster il rapporto è minimo poco dentro il bordo.** La dispersione assoluta ha quasi lo stesso profilo di $G_{\mathrm{n}}$: il percentile mediano è 94 appena dentro il bordo del cluster e 49 dopo sei celle, contro 96 e 50 di $G_{\mathrm{n}}$. Il rapporto mediano è invece quasi costante (Figura 6.17b): circa il 10% in tutte le celle fuori dal cluster, con un minimo del 9.6% due celle dentro il nucleo e una risalita all'11.2% nelle pochissime celle più interne. Le differenze ci sono ma sono piccole; il motivo della risalita nelle celle più interne non è verificato. La mediana sta un po' sotto le medie della Figura 6.17a e delle mappe più avanti, che sono intorno all'11%.

**A parità di G, più dispersione va con dati più lontani dal normale, ma non nella classe più discorde.** Per confrontare valori con lo stesso G, i valori segnalati sono divisi in 20 fasce di G e, in ogni fascia, in cinque classi con lo stesso numero di valori, ordinate per rapporto, dalla classe 1, con le estrazioni più concordi (rapporto mediano 5%), alla classe 5, con le più discordi (19%; Figura 6.17c). Dalla classe 1 alla 4 la percentuale di valori oltre la soglia della distanza dal normale sale dal 24% al 50%; nella classe 5 scende al 45%. Il risultato è quasi uguale a parità di $G_{\mathrm{n}}$. Fino alla classe 4, dunque, le estrazioni si separano di più dove i dati sono più lontani dal normale, coerentemente con l'idea che il modello sia meno stabile sui dati più diversi da quelli dell'addestramento; la classe più discorde non segue l'andamento, e il motivo non è verificato.

**Per tipo di cluster il quadro è simile.** Con gli stessi tipi della Sezione 6.7, il rapporto è quasi ovunque più basso poco dentro il nucleo e sale verso l'esterno, con l'eccezione dell'umidità del suolo, in cui scende verso l'esterno. A parità di G, in ogni tipo la classe 1 ha la percentuale più bassa di valori oltre la soglia della distanza dal normale e la più alta è la classe 3 o 4; per la velocità verticale, per esempio, la percentuale va dal 20% della classe 1 al 45% della 4 e scende al 40% nella 5. La classe 5 raggiunge la 4 solo nella precipitazione e nell'umidità del suolo.





Figura 6.17a: In proporzione a G la dispersione del dropout è quasi costante, e cala solo sui valori di G più alti. Dispersione media divisa per G medio, per percentile di G su tutti i valori, sugli anni di test.





Figura 6.17b: Attraverso i cluster il rapporto è quasi costante, con un minimo poco dentro il bordo. Mediana del rapporto fra dispersione e G, secondo le celle di distanza dal bordo del cluster, con la soglia di $G_{\mathrm{n}}$ al 95-esimo percentile, sugli anni di test.





Figura 6.17c: A parità di G, più dispersione va con dati più lontani dal normale, fino alla penultima classe. I valori segnalati da $G_{\mathrm{n}}$, divisi a parità di G in cinque classi con lo stesso numero di valori, ordinate per rapporto (1 = estrazioni più concordi, 5 = più discordi); per ogni classe, la percentuale oltre la soglia della distanza dal normale. Anni di test.

**La dispersione cella per cella.** La Figura 6.18 mostra la dispersione di G in ogni cella. In media sugli anni di test è più alta a sud, dove è più alto anche G: circa il 23% in più fra 20° e 30°N che fra 50° e 60°N. Il rapporto medio invece varia poco, fra l'11.0% e l'11.4% da una fascia all'altra. Lungo il margine del dominio si vede una cornice, con una dispersione in media 1.8 volte quella delle celle interne, probabilmente un effetto del modello simile a quello della Sezione 6.2. Negli istanti dei tre esempi della Sezione 6.7.1 la dispersione nel nucleo è in mediana da 3.4 a 5 volte quella fuori dal nucleo, la più alta nella copertura nuvolosa; in proporzione a G, invece, il rapporto mediano nel nucleo resta vicino a quello di fuori, fra l'8% e il 13% contro il 10–11% fuori dal nucleo.





Figura 6.18a: La dispersione del dropout è più alta a sud e lungo il margine del dominio. Dispersione di G fra le 20 estrazioni in ogni cella, in media sugli anni di test. Linee di costa da Natural Earth.





Figura 6.18b: Il rapporto fra dispersione e G varia poco nel dominio. Rapporto medio in ogni cella, sugli anni di test. Linee di costa da Natural Earth.

**Sintesi.** Tre segnalazioni di $G_{\mathrm{n}}$ su quattro reggono alle maschere, e in proporzione a G la dispersione è quasi costante, attraverso i cluster e in quasi tutti i tipi di cluster. A parità di G le estrazioni concordano di meno dove i dati sono più lontani dal normale, fino alla classe 4. Questo descrive il comportamento del modello e non rende una segnalazione più o meno affidabile.

## 6.9 Anomalie meteorologiche note

Sezione da scrivere. Anomalie meteorologiche note, con un riferimento esterno da decidere con il relatore: le segnalazioni più evidenti del rilevatore, confrontate con una lista di anomalie meteorologiche note (per esempio le intrusioni di polvere sahariana) compilata senza guardare le segnalazioni, e giudicate da esperti del settore energetico. Il riferimento esterno serve solo a questa verifica finale, non alla scelta del modello, dello score o della soglia.

## 6.10 Sensibilità alla soglia

Tutti i risultati precedenti usano la soglia del 95-esimo percentile degli score di validazione. È una scelta convenzionale, non ottimizzata. Questa sezione ripete le analisi principali con il 99-esimo percentile, cioè segnalando l'1% dei valori degli anni di validazione, per verificare quanto le conclusioni dipendano dalla soglia (Tabella 6.9). Le correlazioni fra G e D della Sezione 6.2 usano tutti i valori e non dipendono dalla soglia, e non sono ripetute; non è ripetuta nemmeno l'analisi del dropout.

**La normalizzazione climatologica nella coda.** Con la soglia più alta la normalizzazione riduce ancora molto le differenze fra luoghi e stagioni, ma non le annulla: resta un eccesso di segnalazioni a sud, dove la percentuale media è circa il doppio di quella a nord: 1.4% fra 20° e 30°N contro 0.7% fra 50° e 60°N, con l'1% atteso. La normalizzazione allinea media e deviazione standard di G in ogni cella, non la frequenza dei suoi valori più estremi; con il 5% questa differenza si vede appena, con l'1% sì.

**Il comportamento del discriminatore.** Con la soglia più alta i cluster sono meno della metà, e il comportamento del discriminatore è lo stesso e più marcato. Nel nucleo $D_{\text{reale}}$ scende dal percentile 5 all'1 e D dal 27 al 2. Anche nel contorno $D_{\text{reale}}$ scende, da 12 a 4: con la soglia più alta i cluster sono più estremi, e anche le celle attorno sono fra i valori più alti di $G_{\text{n}}$.

**Cluster e catene.** Con la soglia più alta le catene si accorciano ma restano: i cluster più grandi dei tre tipi con più valori durano fra 8 e 24 giorni, contro 23–40 giorni con il 5%, e i cluster con almeno 20 valori contengono ancora l'85% dei valori segnalati, contro il 93% con il 5%. I tre tipi con più valori nei cluster di almeno 20 valori restano velocità verticale, precipitazione e copertura nuvolosa, ma la precipitazione passa al primo posto.

Tabella 6.9: Le analisi delle sezioni precedenti con la soglia al 95-esimo e al 99-esimo percentile degli score di validazione: percentuale per luogo e zone sugli anni di validazione, confronti e cluster sugli anni di test. La differenza relativa è la differenza assoluta media delle percentuali per fascia di latitudine e mese dalla loro media, divisa per la media.

| Analisi | Misura | 95-esimo | 99-esimo |
|---|---|---|---|
| Percentuale per fascia di latitudine e mese (Sez. 6.3) | G senza normalizzazione, intervallo fra fasce e mesi | 1.6–11.1% | 0.2–3.6% |
| | $G_{\text{n}}$, intervallo | 3.7–6.3% | 0.5–2.1% |
| | differenza relativa, G $\rightarrow$ $G_{\text{n}}$ | 0.39 $\rightarrow$ 0.11 | 0.70 $\rightarrow$ 0.28 |
| Zone dei cluster (Sez. 6.4) | cluster di $G_{\text{n}}$ | 184877 | 70954 |
| | $D_{\text{reale}}$ nel nucleo, percentile mediano | 5 | 1 |
| | $D_{\text{reale}}$ nel contorno, percentile mediano | 12 | 4 |
| | D nel nucleo, percentile mediano | 27 | 2 |
| Confronti (Sez. 6.6) | segnalazioni di $G_{\text{n}}$ condivise con la variazione in tre ore | 53.9% | 46.4% |
| | condivise con MCD | 52.1% | 45.8% |
| | condivise con HBOS | 39.2% | 24.3% |
| | segnalazioni del solo $G_{\text{n}}$ | 18.1% | 27.4% |
| | valori segnalati da almeno 5 metodi su 9 | 4.22% | 0.72% |
| Cluster (Sez. 6.7) | valori nei cluster con almeno 20 valori | 93% | 85% |
| | durata dei cluster più grandi dei tre tipi principali | 23–40 giorni | 8–24 giorni |

**Confronti con le baseline.** Con la soglia più alta il quadro resta lo stesso, con un accordo più basso. La variazione in tre ore e MCD restano i metodi più vicini a $G_{\mathrm{n}}$, con il 46% delle sue segnalazioni condivise; il metodo più lontano resta HBOS. I valori segnalati da almeno cinque metodi su nove sono lo 0.72%: il calo è in gran parte automatico, perché ogni metodo segnala circa cinque volte meno. L'accordo resta molto sopra il caso: con l'1% due metodi indipendenti condividerebbero circa l'1% delle segnalazioni, mentre $G_{\mathrm{n}}$ ne condivide il 46% con la variazione in tre ore.

**Sintesi.** Le conclusioni sul discriminatore non dipendono dalla soglia, e con una soglia più alta diventano più nette. Anche il quadro del confronto con le baseline non cambia, con un accordo più basso e una percentuale più alta di segnalazioni esclusive di $G_{\mathrm{n}}$. Le catene si accorciano, ma restano. L'effetto della normalizzazione climatologica dipende invece dalla soglia: la normalizzazione riduce le differenze fra luoghi e stagioni di circa tre quarti con il 5% e di circa tre quinti con l'1%.

# Capitolo 7

# Conclusioni e sviluppi futuri

## 7.1 Il problema affrontato

## 7.2 Sintesi dei risultati

## 7.3 Sviluppi futuri

Il primo sviluppo è ripetere la configurazione scelta con più semi, per avere un riferimento con cui leggere le differenze fra configurazioni.

Il secondo riguarda il protocollo: aggiornare periodicamente soglie e normalizzazione climatologica su una finestra di anni recenti, invece di tenerle fisse dalla validazione, ridurrebbe l'effetto della deriva del clima sulla percentuale di valori segnalati.

Il terzo riguarda la valutazione. Il confronto con le anomalie meteorologiche note della Sezione 6.9 si limita a pochi casi; un catalogo esterno di anomalie su tutto il dominio, o anomalie artificiali inserite in posizioni note, darebbe una misura del richiamo, che in questa tesi manca.

Il quarto riguarda l'incertezza dello score. La Sezione 6.8 descrive come la dispersione varia con G; resta da verificare, con un riferimento esterno, se può essere usata come misura di incertezza. I metodi basati su equazioni differenziali stocastiche (Sezione 2.4) potrebbero inoltre essere applicati al rilevatore: richiedono di aggiungere a STGAN una rete di diffusione, una modifica che questa tesi ha evitato per restare vicina all'architettura dell'articolo.

**Ritorno alla previsione fotovoltaica.** Il lavoro è partito dalla previsione della produzione fotovoltaica sui dati PVGIS, ed è passato ai campi ERA5 perché quei dati non permettevano di riconoscere anomalie meteorologiche di tipo generale. Il rilevatore può ora essere riportato a quel problema in più modi.

Il primo passo è allineare i due insiemi di dati: le località PVGIS, su un reticolo di 5 km, ricadono in poche decine di celle ERA5 di 0.5°, e lo score, calcolato ogni tre ore, va riportato alle ore del previsore. Con questo allineamento le segnalazioni del rilevatore possono servire a valutare il previsore separatamente sui valori non segnalati e su quelli segnalati, misurando se l'errore del previsore cresce quando il rilevatore segnala. Possono servire poi all'addestramento, per escludere dall'addestramento le finestre segnalate, secondo il protocollo di SDE U-Net, oppure per dare loro un peso diverso. Lo score può infine entrare nel previsore come ingresso aggiuntivo, oppure regolare l'incertezza delle sue previsioni, aumentandola quando lo score è alto. In ciascun caso la verifica più diretta sarebbe sulle misure di impianti reali, dove disponibili.

# Bibliografia


[1] Stephan Rasp et al. «WeatherBench: A Benchmark Data Set for Data-Driven Weather Forecasting». In: *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 12.11 (2020), e2020MS002203. DOI: 10.1029/2020MS002203.

[2] J. Antonanzas et al. «Review of photovoltaic power forecasting». In: *Solar Energy* 136 (2016), pp. 78–111. DOI: 10.1016/j.solener.2016.06.069.

[3] Hans Hersbach et al. «The ERA5 global reanalysis». In: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730 (2020), pp. 1999–2049. DOI: 10.1002/qj.3803.

[4] Qihang Zhou et al. «Label-Free Multivariate Time Series Anomaly Detection». In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 36.7 (2024), pp. 3166–3179. DOI: 10.1109/TKDE.2024.3349613. arXiv: 2312.11549.

[5] Leyan Deng et al. «Graph Convolutional Adversarial Networks for Spatiotemporal Anomaly Detection». In: *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems* 33.6 (2022), pp. 2416–2428. DOI: 10.1109/TNNLS.2021.3136171.

[6] Xingjian Shi et al. «Convolutional LSTM Network: A Machine Learning Approach for Precipitation Nowcasting». In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 28. Curran Associates, Inc., 2015. arXiv: 1506.04214.

[7] Nicolas Ballas et al. «Delving Deeper into Convolutional Networks for Learning Video Representations». In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2016. arXiv: 1511.06432.

[8] Yarin Gal e Zoubin Ghahramani. «Dropout as a Bayesian Approximation: Representing Model Uncertainty in Deep Learning». In: *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning*. Vol. 48. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2016, pp. 1050–1059. arXiv: 1506.02142.

[9] Manish Gupta et al. «Outlier Detection for Temporal Data: A Survey». In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 26.9 (2014), pp. 2250–2267. DOI: 10.1109/TKDE.2013.184.

[10] Zahra Zamanzadeh Darban et al. «Deep Learning for Time Series Anomaly Detection: A Survey». In: *ACM Computing Surveys* 57.1 (2024), pp. 1–42. DOI: 10.1145/3691338.

[11] Xingjian Wu et al. «CATCH: Channel-Aware Multivariate Time Series Anomaly Detection via Frequency Patching». In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2025. arXiv: 2410.12261.

[12] Sarah Alnegheimish et al. «M$^2$AD: Multi-Sensor Multi-System Anomaly Detection through Global Scoring and Calibrated Thresholding». In: *Proceedings of the 28th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*. Vol. 258. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2025, pp. 4384–4392.

[13] Pankaj Malhotra et al. *LSTM-based Encoder-Decoder for Multi-sensor Anomaly Detection*. Presentato all'ICML 2016 Anomaly Detection Workshop. 2016. arXiv: 1607.00148.

[14] Kyle Hundman et al. «Detecting Spacecraft Anomalies Using LSTMs and Nonparametric Dynamic Thresholding». In: *Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. ACM, 2018, pp. 387–395. DOI: 10.1145/3219819.3219845.

[15] Jiehui Xu et al. «Anomaly Transformer: Time Series Anomaly Detection with Association Discrepancy». In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2022. arXiv: 2110.02642.

[16] Ailin Deng e Bryan Hooi. «Graph Neural Network-Based Anomaly Detection in Multivariate Time Series». In: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 35. 5. 2021, pp. 4027–4035. DOI: 10.1609/aaai.v35i5.16523.

[17] Ian J. Goodfellow et al. «Generative Adversarial Nets». In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 27. Curran Associates, Inc., 2014. arXiv: 1406.2661.

[18] Thomas Schlegl et al. «Unsupervised Anomaly Detection with Generative Adversarial Networks to Guide Marker Discovery». In: *Information Processing in Medical Imaging (IPMI 2017)*. Vol. 10265. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2017, pp. 146–157. DOI: 10.1007/978-3-319-59050-9_12.

[19] Dan Li et al. «MAD-GAN: Multivariate Anomaly Detection for Time Series Data with Generative Adversarial Networks». In: *Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2019: Text and Time Series*. Vol. 11730. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2019, pp. 703–716. DOI: 10.1007/978-3-030-30490-4_56.

[20] Renjie Wu e Eamonn J. Keogh. «Current Time Series Anomaly Detection Benchmarks are Flawed and are Creating the Illusion of Progress». In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 35.3 (2023), pp. 2421–2429. DOI: 10.1109/TKDE.2021.3112126. arXiv: 2009.13807.

[21] Qinghua Liu e John Paparrizos. «The Elephant in the Room: Towards A Reliable Time-Series Anomaly Detection Benchmark». In: *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS 2024), Datasets and Benchmarks Track*. Vol. 37. 2024, pp. 108231–108261. DOI: 10.52202/079017-3437.

[22] Peter Bauer, Alan Thorpe e Gilbert Brunet. «The quiet revolution of numerical weather prediction». In: *Nature* 525.7567 (2015), pp. 47–55. DOI: 10.1038/nature14956.

[23] Remi Lam et al. «Learning skillful medium-range global weather forecasting». In: *Science* 382.6677 (2023), pp. 1416–1421. DOI: 10.1126/science.adi2336.

[24] Yunjie Liu et al. *Application of Deep Convolutional Neural Networks for Detecting Extreme Weather in Climate Datasets*. 2016. arXiv: 1605.01156.

[25] Evan Racah et al. «ExtremeWeather: A large-scale climate dataset for semi-supervised detection, localization, and understanding of extreme weather events». In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017.

[26] Prabhat et al. «ClimateNet: an expert-labeled open dataset and deep learning architecture for enabling high-precision analyses of extreme weather». In: *Geoscientific Model Development* 14 (2021), pp. 107–124. DOI: 10.5194/gmd-14-107-2021.

[27] Pablo G. Zaninelli et al. «AI-Based Anomaly Detection for Extreme Event Attribution: An Analysis of European Heatwaves». In: *Earth Systems and Environment* 10 (2026), pp. 9949–9969. DOI: 10.1007/s41748-026-01122-6.

[28] Aytaç Paçal et al. «A multivariate analysis of atmospheric drivers for Western European heatwaves». In: *Earth System Dynamics* 17 (2026), pp. 955–986. DOI: 10.5194/esd-17-955-2026.

[29] Bing Yu, Haoteng Yin e Zhanxing Zhu. «Spatio-Temporal Graph Convolutional Networks: A Deep Learning Framework for Traffic Forecasting». In: *Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-18)*. 2018, pp. 3634–3640. DOI: 10.24963/ijcai.2018/505.

[30] Kyunghyun Cho et al. «Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation». In: *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. Association for Computational Linguistics, 2014, pp. 1724–1734. DOI: 10.3115/v1/D14-1179. arXiv: 1406.1078.

[31] Moloud Abdar et al. «A review of uncertainty quantification in deep learning: Techniques, applications and challenges». In: *Information Fusion* 76 (2021), pp. 243–297. DOI: 10.1016/j.inffus.2021.05.008.

[32] Balaji Lakshminarayanan, Alexander Pritzel e Charles Blundell. «Simple and Scalable Predictive Uncertainty Estimation using Deep Ensembles». In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017. arXiv: 1612.01474.

[33] Lingkai Kong, Jimeng Sun e Chao Zhang. «SDE-Net: Equipping Deep Neural Networks with Uncertainty Estimates». In: *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*. Vol. 119. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2020, pp. 5405–5415. arXiv: 2008.10546.

[34] Simone Monaco et al. «Uncertainty-aware methods for enhancing rainfall prediction with deep-learning based post-processing segmentation». In: *Computers & Geosciences* 205 (2025), p. 105992. DOI: 10.1016/j.cageo.2025.105992.

[35] Russ Rew e Glenn Davis. «NetCDF: An Interface for Scientific Data Access». In: *IEEE Computer Graphics and Applications* 10.4 (1990), pp. 76–82. DOI: 10.1109/38.56302.

[36] Charles R. Harris et al. «Array Programming with NumPy». In: *Nature* 585.7825 (2020), pp. 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[37] Thomas Huld, Richard Müller e Attilio Gambardella. «A new solar radiation database for estimating PV performance in Europe and Africa». In: *Solar Energy* 86.6 (2012), pp. 1803–1815. DOI: 10.1016/j.solener.2012.03.006.

[38] Sepp Hochreiter e Jürgen Schmidhuber. «Long Short-Term Memory». In: *Neural Computation* 9.8 (1997), pp. 1735–1780. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.

[39] Diederik P. Kingma e Jimmy Ba. «Adam: A Method for Stochastic Optimization». In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2015. arXiv: 1412.6980.

[40] Arthur Gretton et al. «A Kernel Two-Sample Test». In: *Journal of Machine Learning Research* 13.25 (2012), pp. 723–773.

[41] Takuya Akiba et al. «Optuna: A Next-Generation Hyperparameter Optimization Framework». In: *The 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. 2019, pp. 2623–2631. DOI: 10.1145/3292500.3330701.

[42] Adam Paszke et al. «PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library». In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 32. Curran Associates, Inc., 2019.

[43] Stephan Hoyer e Joe Hamman. «xarray: N-D labeled Arrays and Datasets in Python». In: *Journal of Open Research Software* 5.1 (2017), p. 10. DOI: 10.5334/jors.148.

[44] Wes McKinney. «Data Structures for Statistical Computing in Python». In: *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*. 2010, pp. 56–61. DOI: 10.25080/Majora-92bf1922-00a.

[45] Pauli Virtanen et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». In: *Nature Methods* 17.3 (2020), pp. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.