

EXERCÍCIOS

A.10 Dê os elementos dos seguintes conjuntos:

$A = \{x \mid x \text{ é letra da palavra "matemática"}\}$

$B = \{x \mid x \text{ é cor da bandeira brasileira}\}$

$C = \{x \mid x \text{ é nome de estado que começa com "a"}\}$

Solução

$A = \{m, a, t, e, i, c\}$

$B = \{\text{branco, azul, amarelo, verde}\}$

$C = \{\text{amazonas, amapá, acre, alagoas}\}$

A.11 Descreva através de uma propriedade característica dos elementos cada um dos conjuntos seguintes:

$A = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$

$B = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

$C = \{\text{brasília, rio de janeiro, salvador}\}$

Solução

$A = \{x \mid x \text{ é inteiro, par e não negativo}\}$

$B = \{x \mid x \text{ é algarismo arábico}\}$

$C = \{x \mid x \text{ é nome de cidade que já foi capital do Brasil}\}$

A.12 Escreva com símbolos:

a) conjunto dos múltiplos inteiros de 3, entre -10 e +10

b) conjunto dos divisores inteiros de 42

c) conjunto dos múltiplos inteiros de 0

d) conjunto das frações com numerador e denominador compreendidos entre 0 e 3

e) conjunto dos nomes das capitais da região centro-oeste do Brasil

A.13 Descreva por meio de uma propriedade dos elementos

$A = \{+1, -1, +2, -2, +3, -3, +6, -6\}$ $B = \{0, -10, -20, -30, -40, \dots\}$

$C = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}$ $D = \{\text{Lua}\}$

A.14 Quais dos conjuntos abaixo são unitários?

$A = \{x \mid x < \frac{9}{4} \text{ e } x > \frac{6}{5}\}$ $B = \{x \mid 0 \cdot x = 2\}$

$C = \{x \mid x \text{ é inteiro e } x^2 = 3\}$ $D = \{x \mid 2x + 1 = 7\}$

A.15 Quais dos conjuntos abaixo são vazios?

$A = \{x \mid 0 \cdot x = 0\}$

$B = \{x \mid x > \frac{9}{4} \text{ e } x < \frac{6}{5}\}$

$C = \{x \mid x \text{ é divisor de zero}\}$

$D = \{x \mid x \text{ é divisível por zero}\}$

V. CONJUNTOS IGUAIS

40. Definição

Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Em símbolos:

$$A = B \iff (\forall x)(x \in A \iff x \in B)$$

Exemplos

$$1) \{a, b, c, d\} = \{d, c, b, a\}$$

$$2) \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\} = \{x \mid x \text{ é inteiro, positivo e ímpar}\}$$

$$3) \{x \mid 2x + 1 = 5\} = \{2\}$$

Observemos que na definição de igualdade entre conjuntos não intervém a noção de ordem entre os elementos, portanto:

$$\{a, b, c, d\} = \{d, c, b, a\} = \{b, a, c, d\}$$

Observemos ainda que a repetição de um elemento na descrição de um conjunto é algo absolutamente inútil pois, por exemplo:

$$\{a, b, c, d\} = \{a, a, b, b, b, c, d, d, d, d\}$$

(para conferir basta usar a definição). Assim, preferimos sempre a notação mais simples.

41. Se A não é igual a B, escrevemos $A \neq B$. É evidente que A é diferente de B se existe um elemento de A não pertencente a B ou existe em B um elemento não pertencente a A.

Exemplo

$$\{a, b, d\} \neq \{a, b, c, d\}$$

EXERCÍCIOS

A.16 Dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{2, 4\}$, pede-se:

a) escrever com os símbolos da teoria dos conjuntos as seguintes sentenças:

- 1ª) 3 é elemento de A 2ª) 1 não está em B
3ª) B é parte de A 4ª) B é igual a A
5ª) 4 pertence a B

b) classificar as sentenças anteriores em falsa ou verdadeira.

Solução

- 1ª) $3 \in A$ (V)
2ª) $1 \notin B$ (V)
3ª) $B \subset A$ (V)
4ª) $B = A$ (F)
5ª) $4 \in B$ (V)

A.17 Sendo $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 3, 4\}$ e $D = \{1, 2, 3, 4\}$, classificar em V ou F cada sentença abaixo e justificar:

- a) $A \subset D$ b) $A \subset B$ c) $B \subset C$
d) $D \supset B$ e) $C = D$ f) $A \not\subset C$

Solução

- a) V pois $1 \in A$, $1 \in D$, $2 \in A$ e $2 \in D$
b) F pois $1 \in A$ e $1 \notin B$
c) F pois $2 \in B$ e $2 \notin C$
d) V pois $2 \in B$, $2 \in D$, $3 \in B$ e $3 \in D$
e) F pois $2 \in D$ e $2 \notin C$
f) V pois $2 \in A$ e $2 \notin C$

A.18 Quais das igualdades abaixo são verdadeiras?

- a) $\{a, a, a, b, b\} = \{a, b\}$
b) $\{x \mid x^2 = 4\} = \{x \mid x \neq 0 \text{ e } x^3 - 4x = 0\}$
c) $\{x \mid 2x + 7 = 11\} = \{2\}$
d) $\{x \mid x < 0 \text{ e } x \geq 0\} = \emptyset$

A.19 Dizer se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das sentenças abaixo.

- a) $0 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ f) $a \in \{a, \{a\}\}$
b) $\{a\} \in \{a, b\}$ g) $\{a\} \subset \{a, \{a\}\}$
c) $\emptyset \in \{0\}$ h) $\emptyset \subset \{\emptyset, \{a\}\}$
d) $0 \in \emptyset$ i) $\emptyset \in \{\emptyset, \{a\}\}$
e) $\{a\} \subset \emptyset$ j) $\{a, b\} \in \{a, b, c, d\}$

A.20 Fazer um diagrama de Venn que simbolize a situação seguinte: A, B, C, D são conjuntos não vazios, $D \subset C \subset B \subset A$.

A.21 Construir o conjunto das partes do conjunto $A = \{a, b, c, d\}$.

VII. REUNIÃO DE CONJUNTOS

47. Definição

Dados dois conjuntos A e B, chama-se *reunião* de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$


O conjunto $A \cup B$ (lê-se "A reunião B" ou "A u B") é formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A e B.

Notemos que x é elemento de $A \cup B$ se ocorrer ao menos uma das condições seguintes:

$$x \in A \text{ ou } x \in B.$$

Exemplos

- 1) $\{a, b\} \cup \{c, d\} = \{a, b, c, d\}$
2) $\{a, b\} \cup \{a, b, c, d\} = \{a, b, c, d\}$
3) $\{a, b, c\} \cup \{c, d, e\} = \{a, b, c, d, e\}$
4) $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$
5) $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$



48. Propriedades da reunião

Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades:

- 1ª) $A \cup A = A$ (idempotente)
2ª) $A \cup \emptyset = A$ (elemento neutro)
3ª) $A \cup B = B \cup A$ (comutativa)
4ª) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (associativa)

Demonstração

Fazendo $A = \{x \mid x \text{ tem a propriedade } p\}$ ou, simplesmente $A = \{x \mid p(x)\}$ e, ainda: $B = \{x \mid q(x)\}$, $C = \{x \mid r(x)\}$ e $\emptyset = \{x \mid f(x)\}$ onde f é proposição logicamente falsa, temos:

$$A \cup A = \{x \mid p(x) \text{ ou } p(x)\} = \{x \mid p(x)\} = A$$

Analogamente, as demais decorrem das propriedades das proposições vistas no exercício A.6.

VIII. INTERSECÇÃO DE CONJUNTOS

49. Definição

Dados dois conjuntos A e B , chama-se *intersecção* de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B .


$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

O conjunto $A \cap B$ (lê-se "A inter B") é formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos (A e B) *simultaneamente*.

Se $x \in A \cap B$, isto significa que x pertence a A e *também* x pertence a B . O *conectivo e* colocado entre duas condições significa que elas devem ser obedecidas *ao mesmo tempo*.

Exemplos

- 1) $\{a, b, c\} \cap \{b, c, d, e\} = \{b, c\}$
- 2) $\{a, b\} \cap \{a, b, c, d\} = \{a, b\}$
- 3) $\{a, b, c\} \cap \{a, b, c\} = \{a, b, c\}$
- 4) $\{a, b\} \cap \{c, d\} = \emptyset$
- 5) $\{a, b\} \cap \emptyset = \emptyset$



50. Propriedades da intersecção

Sendo A , B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades:

- 1ª) $A \cap A = A$ (idempotente)
- 2ª) $A \cap U = A$ (elemento neutro)
- 3ª) $A \cap B = B \cap A$ (comutativa)
- 4ª) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (associativa)

Como mostramos para a operação de reunião, estas propriedades são também demonstráveis com auxílio do exercício A.6.

51. Conjuntos disjuntos

Quando $A \cap B = \emptyset$, isto é, quando os conjuntos A e B não têm elemento comum, A e B são denominados *conjuntos disjuntos*.

IX. PROPRIEDADES

52. Sendo A , B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades, que inter-relacionam a reunião e a intersecção de conjuntos:

- 1ª) $A \cup (A \cap B) = A$
- 2ª) $A \cap (A \cup B) = A$
- 3ª) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
(distributiva da reunião em relação à intersecção)
- 4ª) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
(distributiva da intersecção em relação à reunião).

Demonstremos, por exemplo, a 1ª e a 3ª:

$$\begin{aligned} A \cup (A \cap B) &= \{x \mid p(x) \vee (p(x) \wedge q(x))\} = \{x \mid (p(x))\} = A \\ A \cup (B \cap C) &= \{x \mid p(x) \vee (q(x) \wedge r(x))\} = \{x \mid (p(x) \vee q(x)) \wedge (p(x) \vee r(x))\} = \\ &= \{x \mid p(x) \vee q(x)\} \cap \{x \mid p(x) \vee r(x)\} = (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{aligned}$$

EXERCÍCIOS

A.22 Dados os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, d\}$ e $C = \{c, e\}$, determinar $A \cup B$, $A \cup C$, $B \cup C$ e $A \cup B \cup C$.

A.23 Provar que $A \subset (A \cup B)$, $\forall A$.

Solução

$$x \in A \Rightarrow x \in A \text{ ou } x \in B$$

é uma implicação verdadeira, $\forall x$, portanto: $A \subset (A \cup B)$

A.24 Classificar em V ou F:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a) $\emptyset \subset (A \cup B)$ | b) $(A \cup B) \subset A$ |
| c) $A \in (A \cup B)$ | d) $(A \cup B) \subset (A \cup B)$ |
| e) $B \subset (A \cup B)$ | f) $(A \cup B) \subset (A \cup B \cup C)$ |

admitindo que A , B e C são conjuntos quaisquer.

A.25 Determinar a reunião dos círculos de raio r , contidos num plano α e que têm um ponto comum $O \in \alpha$.

A.26 Determinar a reunião das retas de um plano α que são paralelas a uma dada reta r de α .

A.27 Dados os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$ e $C = \{c, e, f\}$, pede-se descrever $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ e $A \cap B \cap C$.

A.28 Provar que $(A \cap B) \subset A$, $\forall A$.

Solução

$$x \in (A \cap B) \Rightarrow (x \in A \text{ e } x \in B) \Rightarrow x \in A$$

é uma implicação verdadeira, $\forall x$, portanto $(A \cap B) \subset A$.

A.29 Classificar em V ou F

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a) $\emptyset \subset (A \cap B)$ | b) $A \subset (A \cap B)$ |
| c) $A \in (A \cap B)$ | d) $(A \cap B) \subset (A \cap B)$ |
| e) $(A \cap B) \subset B$ | f) $(A \cap B) \supset (A \cap B \cap C)$ |

admitindo que A , B e C são conjuntos quaisquer.

A.30 Consideremos os conjuntos:

K = conjunto dos quadriláteros planos

$P = \{x \in K \mid x \text{ tem lados 2 a 2 paralelos}\}$

$L = \{x \in K \mid x \text{ tem 4 lados congruentes}\}$

$R = \{x \in K \mid x \text{ tem 4 ângulos retos}\}$

$Q = \{x \in K \mid x \text{ tem 2 lados paralelos e 2 ângulos retos}\}$

Pede-se determinar os conjuntos:

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| a) $L \cap P$ | c) $L \cap R$ | e) $L \cap Q$ |
| b) $R \cap P$ | d) $Q \cap R$ | f) $P \cup Q$ |

A.31 Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ e $C = \{1, 2, 4\}$, determinar o conjunto X tal que $X \cup B = A \cup C$ e $X \cap B = \emptyset$.

Solução

a) $X \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ então os possíveis elementos de X são: 1, 2, 3 e 4.

b) $X \cap B = \emptyset \Rightarrow 3 \notin X$ e $4 \notin X$


Conclusão $X = \{1, 2\}$

A.32 Determinar o conjunto X tal que

$$\{a, b, c, d\} \cup X = \{a, b, c, d, e\}, \{c, d\} \cup X = \{a, c, d, e\} \text{ e } \{b, c, d\} \cap X = \{c\}.$$

A.33 Assinalar no diagrama ao lado, um de cada vez, os seguintes conjuntos:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) $A \cap B \cap C$ | c) $A \cup (B \cap C)$ |
| b) $A \cap (B \cup C)$ | d) $A \cup B \cup C$ |



X. DIFERENÇA DE CONJUNTOS


53. Definição

Dados dois conjuntos A e B , chama-se *diferença* entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B .

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Exemplos

- $\{a, b, c\} - \{b, c, d, e\} = \{a\}$
- $\{a, b, c\} - \{b, c\} = \{a\}$
- $\{a, b\} - \{c, d, e, f\} = \{a, b\}$
- $\{a, b\} - \{a, b, c, d, e\} = \emptyset$



XI. COMPLEMENTAR DE B EM A

54. Definição

Dados dois conjuntos A e B , tais que $B \subset A$, chama-se *complementar de B em relação a A* o conjunto $A - B$, isto é, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B .


Com o símbolo

$$C_A^B \text{ ou } \bar{A}$$

indicamos o complementar de B em relação a A .

Notemos que C_A^B só é definido para $B \subset A$ e aí temos:

$$C_A^B = A - B$$



64. Quando a é divisor de b dizemos que " b é divisível por a " ou " b é múltiplo de a ".

Para um inteiro a qualquer, indicamos com $D(a)$ o conjunto de seus divisores e com $M(a)$ o conjunto de seus múltiplos.

Exemplos

$$1) D(2) = \{1, -1, 2, -2\} \quad M(2) = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots\}$$

$$2) D(-3) = \{1, -1, 3, -3\} \quad M(-3) = \{0, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots\}$$

$$3) D(0) = \mathbb{Z} \quad M(0) = \{0\}$$

65. Dizemos que um número inteiro p é primo quando $p \neq 0, 1$ e -1 e $D(p) = \{1, -1, p, -p\}$.

Exemplos

2, -2, 3, -3, 5, -5, 7 e -7 são primos.

EXERCÍCIOS

A.51 Quais das proposições abaixo são verdadeiras?

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| a) $0 \in \mathbb{N}$ | b) $(2 - 3) \in \mathbb{N}$ | c) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ |
| d) $\mathbb{N} \cup \mathbb{Z}_- = \mathbb{Z}$ | e) $\mathbb{Z}_+ \cap \mathbb{Z}_- = \emptyset$ | f) $(-3)^2 \in \mathbb{Z}_-$ |
| g) $(-4) - (-5) \in \mathbb{Z}_+$ | h) $0 \in \mathbb{Z}_-$ | i) $(5 - 11) \in \mathbb{Z}$ |

A.52 Descrever os seguintes conjuntos: $D(6)$, $D(-18)$, $D(-24) \cap D(16)$, $M(4)$, $M(10)$ e $M(-9) \cap M(6)$.

A.53 Quais dos seguintes elementos de \mathbb{Z} não são primos: 12, -13, 0, 5, 31, -1, 2, -4, 1, 49 e 53?

A.54 Sendo a e b dois números inteiros, pergunta-se:

- $D(a)$ e $D(b)$ podem ser disjuntos?
- Que nome se dá a um inteiro m tal que $D(a) \cap D(b) = D(m)$?
- Quando $D(a) \cap D(b) = \{1, -1\}$, qual é a relação existente entre a e b ?
- Em que caso ocorre $M(a) \subset M(b)$?
- Em que caso ocorre $M(a) \cap M(b) = M(ab)$?
- Que nome se dá a um inteiro n tal que $M(a) \cap M(b) = M(n)$?

A.55 Determinar os seguintes números inteiros:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a) $\text{mdc}(2, 3)$ | b) $\text{mdc}(-4, 6)$ |
| c) $\text{mdc}(-6, -14)$ | d) $\text{mmc}(2, 3)$ |
| e) $\text{mmc}(-4, 6)$ | f) $\text{mmc}(-6, -14)$ |

III. CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS

66. Dado um número inteiro $q \neq 1$ e -1 , o inverso de q não existe em \mathbb{Z} : $\frac{1}{q} \notin \mathbb{Z}$. Por isso não podemos definir em \mathbb{Z} a operação de divisão, dando significado ao símbolo $\frac{p}{q}$. Vamos superar esta dificuldade introduzindo os números racionais.

67. Chama-se conjunto dos números racionais – símbolo \mathbb{Q} – o conjunto dos pares ordenados (ou frações) $\frac{a}{b}$, onde $a \in \mathbb{Z}$ e $b \in \mathbb{Z}^*$, para os quais adotam-se as seguintes definições:

$$(i) \text{ igualdade: } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$$

$$(ii) \text{ adição: } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$(iii) \text{ multiplicação: } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

68. No conjunto dos racionais destacamos os subconjuntos:

\mathbb{Q}_+ = conjunto dos racionais não negativos

\mathbb{Q}_- = conjunto dos racionais não positivos

\mathbb{Q}^* = conjunto dos racionais não nulos

69. Na fração $\frac{a}{b}$, a é o numerador e b o denominador. Se a e b são primos entre si, isto é, se $\text{mdc}(a, b) = 1$, dizemos $\frac{a}{b}$ é uma fração irredutível. Assim, as frações $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{7}$ e $\frac{7}{15}$ são irredutíveis mas $\frac{6}{10}$ não é:

70. Consideremos o conjunto \mathbb{Q}' formado pelos números racionais com denominador unitário: $\mathbb{Q}' = \{\frac{x}{1} \mid x \in \mathbb{Z}\}$. Temos:

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{1} \iff a = b$$

$$\frac{a}{1} + \frac{b}{1} = \frac{a+b}{1} \iff a + b = a + b$$

$$\frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \frac{a \cdot b}{1} \iff a \cdot b = a \cdot b$$

portanto, os racionais com denominador igual a 1 comportam-se para a igualdade, a adição e a multiplicação como se fossem números inteiros. Assim, fazendo o racional $\frac{x}{1}$ coincidir com o inteiro x , decorre que:

$$\mathbb{Q}' = \mathbb{Z}, \text{ logo, } \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

71. Pode-se verificar que a adição e a multiplicação de racionais apresentam as seguintes propriedades:

$$[A.1] \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{e}{f} = \frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right)$$

$$[A.2] \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}$$

$$[A.3] \frac{a}{b} + 0 = \frac{a}{b}$$

$$[A.4] \frac{a}{b} + \left(-\frac{a}{b}\right) = 0$$

$$[M.1] \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot \frac{e}{f} = \frac{a}{b} \left(\frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}\right)$$

$$[M.2] \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}$$

$$[M.3] \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}$$

$$[D] \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right) = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f}$$

onde $\frac{a}{b}$, $\frac{c}{d}$ e $\frac{e}{f}$ são racionais quaisquer, portanto, são válidas as mesmas propriedades formais vistas para os números inteiros. Além dessas, temos mais a seguinte:

[M.4] *simétrico ou inverso para a multiplicação*

para todo $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ e $\frac{a}{b} \neq 0$, existe

$$\frac{b}{a} \in \mathbb{Q} \text{ tal que } \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1.$$

Devido à propriedade [M.4], podemos definir em \mathbb{Q}^* , a operação de divisão, estabelecendo que $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$ para $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ racionais quaisquer não nulos.

72. Notemos finalmente que todo número racional $\frac{a}{b}$ pode ser representado por um número decimal. Na passagem de uma notação para outra podem ocorrer dois casos:

1º) o número decimal tem uma quantidade finita de algarismos, isto é, é uma decimal exata.

Exemplos

$$\frac{3}{1} = 3; \frac{1}{2} = 0,5; \frac{1}{20} = 0,05; \frac{27}{1000} = 0,027$$

2º) o número decimal tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente, isto é, é uma dízima periódica.

Exemplos

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots; \frac{2}{7} = 0,285714285714\dots$$

EXERCÍCIOS

A.56 Quais das seguintes proposições são verdadeiras?

a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$

b) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

c) $0 \in \mathbb{Q}$

d) $517 \in \mathbb{Q}$

e) $0,474747\dots \in \mathbb{Q}$

f) $\{\frac{4}{7}, \frac{11}{3}\} \subset \mathbb{Q}$

g) $1 \in \mathbb{Q} - \mathbb{Z}$

h) $\frac{2}{7} \in \mathbb{Q} - \mathbb{Z}$


i) $\frac{14}{2} \in \mathbb{Q} - \mathbb{Z}$

j) $\frac{21}{14}$ é irredutível

k) $\frac{121}{147} < \frac{131}{150}$


l) $r \in \mathbb{Q} \Rightarrow -r \in \mathbb{Q}$

segmento representa $\frac{1}{2}$. Na figura abaixo representamos sobre a reta vários números racionais.




Os números racionais, entretanto, não preenchem completamente a reta, isto é, há pontos da reta que não representam racional algum. Por exemplo, entre os pontos 1,41 e 1,42 fica um ponto que representa $\sqrt{2} = 1,414215 \dots$ (irracional).

Quando representamos também sobre a reta os números irracionais, cada ponto da reta passa a representar necessariamente um número racional ou irracional (portanto, real), isto é, os reais preenchem completamente a reta.



Esta reta, que representa \mathbb{R} , é chamada *reta real* ou *reta numérica*.

78. Na reta real os números estão *ordenados*. Um número a é menor que qualquer número x colocado à sua direita e maior que qualquer número x à sua esquerda.



EXERCÍCIOS

A.61 Quais das proposições abaixo são verdadeiras?

- | | | |
|---|---|---|
| a) $3 \in \mathbb{R}$ | b) $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ | c) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ |
| d) $\frac{1}{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ | e) $\sqrt{4} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ | f) $\sqrt[3]{4} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ |
| g) $(\sqrt{2} - 3\sqrt{3}) \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ | h) $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ | i) $\frac{3\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$ |

A.62 Provar que se a, b, c, d são racionais, p é primo positivo e $a + b\sqrt{p} = c + d\sqrt{p}$, então $a = c$ e $b = d$.

Solução

$$a + b\sqrt{p} = c + d\sqrt{p} \Leftrightarrow (b - d)\sqrt{p} = c - a$$

Como $c - a$ é racional, a última igualdade só subsiste quando $(b - d)\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$, isto é, se $b - d = 0$. Neste caso, $c - a = 0$, provando a tese.

A.63 Mostrar que $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = 1 + \sqrt{3}$.

A.64 Mostrar que existem a e b racionais tais que $\sqrt{18 - 8\sqrt{2}} = a + b\sqrt{2}$.

A.65 Dados dois números x e y reais e positivos, chama-se *média aritmética de x com y* o real $a = \frac{x + y}{2}$ e chama-se *média geométrica* o real $g = \sqrt{xy}$. Mostrar que $a \geq g$ para todos $x, y \in \mathbb{R}_+$.

A.66 Representar sobre a reta real, cada um dos seguintes conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 3\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0 \text{ ou } x > 2\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 0 \text{ ou } x \geq 3\}$$

V. INTERVALOS

79. Dados dois números reais a e b , com $a < b$, definimos:

a) *intervalo aberto* de extremos a e b é o conjunto

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

que também pode ser indicado por $a \text{---} b$.

b) *intervalo fechado* de extremos a e b é o conjunto

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

que também pode ser indicado por $a \text{---} b$.

c) *intervalo fechado à esquerda* (ou aberto à direita) de extremos a e b é o conjunto

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$

que também pode ser indicado por $a \text{---} b$.

d) *intervalo fechado à direita* (ou aberto à esquerda) de extremos a e b é o conjunto

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

que também pode ser indicado por $a \text{---} b$.

112. Exemplos

$$1^o) \quad f: A \longrightarrow B \\ x \longmapsto 2x$$

é uma função que associa a cada x de A um y de B tal que $y = 2x$.

$$2^o) \quad f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2$$

é uma função que leva a cada x de \mathbb{R} um y de \mathbb{R} tal que $y = x^2$.

$$3^o) \quad f: \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \sqrt{x}$$

é uma função que faz corresponder a cada $x \in \mathbb{R}_+$ um $y \in \mathbb{R}$ tal que $y = \sqrt{x}$.

113. Se $(a, b) \in f$, como já dissemos anteriormente, o elemento b é chamado *imagem* de a pela aplicação f ou *valor* de f no elemento a e indicamos:

$$f(a) = b$$

que se lê "f de a é igual a b".

114. Exemplo

Seja a função

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto 2x + 1 \quad \text{então}$$

a) a imagem de 0 pela aplicação f é 1, isto é:

$$f(0) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

b) a imagem de -2 pela aplicação f é -3, isto é:


$$f(-2) = 2 \cdot (-2) + 1 = -3$$

c) analogamente

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 1 = 2$$

$$f(\sqrt{2}) = 2 \cdot \sqrt{2} + 1$$

$$f(0,7) = 2 \cdot 0,7 + 1 = 2,4$$



EXERCÍCIOS

A.115 Qual é a notação das seguintes funções de \mathbb{R} em \mathbb{R} ?

- a) f associa cada número real ao seu oposto
- b) g associa cada número real ao seu cubo
- c) h associa cada número real ao seu quadrado menos 1
- d) k associa cada número real ao número 2

A.116 Qual é a notação das seguintes funções?

- a) f é função de \mathbb{Q} em \mathbb{Q} que associa cada número racional ao seu oposto adicionado com 1.
- b) g é a função de \mathbb{Z} em \mathbb{Q} que associa cada número inteiro à potência de base 2 desse número.
- c) h é a função de \mathbb{R}^* em \mathbb{R} que associa cada número real ao seu inverso.

A.117 Seja f a função de \mathbb{R} em \mathbb{R} definida por $f(x) = x^2 - 3x + 4$. Calcular:

- a) $f(2)$
- b) $f(-1)$
- c) $f\left(\frac{1}{2}\right)$
- d) $f\left(-\frac{1}{3}\right)$
- e) $f(\sqrt{3})$
- f) $f(1 - \sqrt{2})$

A.118 Seja f a função de \mathbb{Z} em \mathbb{Z} definida por $f(x) = 3x - 2$. Calcular:

- a) $f(2)$
- b) $f(-3)$
- c) $f(0)$
- d) $f\left(\frac{3}{2}\right)$

A.119 Seja f a função de \mathbb{R} em \mathbb{R} assim definida

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ x + 1 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

- a) $f(3)$
- b) $f\left(-\frac{3}{7}\right)$
- c) $f(\sqrt{2})$
- d) $f(\sqrt{4})$
- e) $f(\sqrt{3} - 1)$
- f) $f(0,75)$

A.120 Seja a função f de \mathbb{R} em \mathbb{R} definida por $f(x) = \frac{2x - 3}{5}$. Qual é o elemento do

domínio que tem $-\frac{3}{4}$ como imagem?

Solução

Queremos determinar o valor de x tal que $f(x) = -\frac{3}{4}$;

basta, portanto, resolver a equação $\frac{2x - 3}{5} = -\frac{3}{4}$.

Resolvendo a equação:

$$\frac{2x - 3}{5} = -\frac{3}{4} \iff 4(2x - 3) = -3 \cdot 5 \iff 8x - 12 = -15 \iff x = -\frac{3}{8}$$

Resposta: o elemento é $x = -\frac{3}{8}$.

II. FUNÇÃO IDENTIDADE


129. Definição

Uma aplicação f de \mathbb{R} em \mathbb{R} recebe o nome de *função identidade* quando a cada elemento $x \in \mathbb{R}$ associa o próprio x , isto é:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

O gráfico da função identidade é uma reta que contém as bissetrizes do 1º e 3º quadrantes.

A imagem é $\text{Im} = \mathbb{R}$.



III. FUNÇÃO LINEAR

130. Definição

Uma aplicação de \mathbb{R} em \mathbb{R} recebe o nome de *função linear* quando a cada elemento $x \in \mathbb{R}$ associa o elemento $ax \in \mathbb{R}$ onde $a \neq 0$ é um número real dado, isto é:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto ax, \quad a \neq 0 \quad (*) \end{aligned}$$

Demonstra-se que o gráfico da função linear é uma reta que passa pela origem. (**)


A imagem é $\text{Im} = \mathbb{R}$.

De fato, qualquer que seja o $y \in \mathbb{R}$, existe $x = \frac{y}{a} \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, tal que

$$f(x) = f\left(\frac{y}{a}\right) = a \cdot \frac{y}{a} = y.$$

(*) Observe que se $a = 0$, teremos a função constante $y = 0$.


(**) Essa demonstração será feita para um caso mais geral e se encontra na página 96.



131. Exemplos

1º) Construir o gráfico da função $y = 2x$. Considerando que dois pontos distintos determinam uma reta e no caso da função linear um dos pontos é a origem, basta atribuir a x um valor não nulo e calcular o correspondente $y = 2x$.


x	$y = 2x$
1	2



Pelos pontos $P(0, 0)$ e $Q(1, 2)$ traçamos a reta PQ que é precisamente o gráfico da função dada.

2º) Construir o gráfico da função $y = -2x$. Analogamente, temos:

x	$y = -2x$
1	-2



EXERCÍCIOS

A.137 Construir o gráfico das funções de \mathbb{R} em \mathbb{R} :

- a) $y = 2$ b) $y = -3$
c) $y = \sqrt{2}$ d) $y = 0$

A.138 Construir, num mesmo sistema cartesiano, os gráficos das funções de \mathbb{R} em \mathbb{R} :

- a) $y = x$ b) $y = 2x$ c) $y = 3x$ d) $y = \frac{x}{2}$

A.139 Construir, num mesmo sistema cartesiano, os gráficos das funções de \mathbb{R} em \mathbb{R} :

- a) $y = -x$ b) $y = -2x$ c) $y = -3x$ d) $y = -\frac{x}{2}$

EXERCÍCIOS

A.140 Construir o gráfico cartesiano das funções de \mathbb{R} em \mathbb{R} :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| a) $y = 2x - 1$ | b) $y = x + 2$ |
| c) $y = 3x + 2$ | d) $y = \frac{2x - 3}{2}$ |
| e) $y = -3x - 4$ | f) $y = -x + 1$ |
| g) $y = -2x + 3$ | h) $y = \frac{4 - 3x}{2}$ |

A.141 Resolver analítica e graficamente o sistema de equações:

$$\begin{cases} x - y = -3 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$$

Solução Analítica

Existem diversos processos analíticos pelos quais podemos resolver um sistema de equações. Vamos apresentar dois deles.

1º) processo: Substituição

Este processo, consiste em substituir o valor de uma das incógnitas, obtido a partir de uma das equações, na outra.

Resolvendo, por exemplo, a primeira equação na incógnita x , temos:

$$x - y = -3 \iff x = y - 3$$

e substituímos x por este valor na segunda equação:

$$2(y - 3) + 3y = 4 \iff 2y - 6 + 3y = 4 \iff y = 2$$

que levamos à primeira equação, encontrando:

$$x - 2 = -3 \iff x = -1.$$

A solução do sistema é o par ordenado $(-1, 2)$.

2º) processo: Adição

Este processo baseia-se nas seguintes propriedades:

- I. "Num sistema de equações, se multiplicarmos todos os coeficientes de uma equação por um número não nulo, o sistema que obtemos é equivalente ao anterior (*)"

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} ka_1x + kb_1y = kc_1 \quad (k \neq 0) \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

- II. "Num sistema de equações, se substituirmos uma das equações, pela sua soma com uma outra equação do sistema, o novo sistema é equivalente ao anterior".

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} (a_1 + a_2)x + (b_1 + b_2)y = c_1 + c_2 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

(*) Sistemas de equações são equivalentes quando apresentam as mesmas soluções.

O fundamento do processo da adição, consiste no seguinte: aplicando a primeira propriedade, multiplicamos cada equação por números convenientes, de modo que, os coeficientes de determinada incógnita sejam opostos e pela segunda propriedade, substituímos uma das equações pela soma das duas equações.

Assim, no sistema $\begin{cases} x - y = -3 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$

multiplicamos a primeira equação por 3

$$\begin{cases} 3x - 3y = -9 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$$

Substituindo a primeira equação pela soma das duas equações, temos:

$$\begin{cases} 5x = -5 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$$

que é equivalente a:

$$\begin{cases} x = -1 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$$

substituindo $x = -1$ em $2x + 3y = 4$, encontramos

$$2 \cdot (-1) + 3y = 4 \Rightarrow y = 2$$

A solução do sistema é o par ordenado $(-1, 2)$.

Solução Gráfica

O sistema proposto


$$\begin{cases} x - y = -3 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$$

é equivalente a

$$\begin{cases} y = x + 3 \\ y = \frac{-2x + 4}{3} \end{cases}$$

Construímos os gráficos de

$$y = x + 3 \text{ e } y = \frac{-2x + 4}{3}$$



A solução do sistema são as coordenadas do ponto de intersecção das retas, portanto $(-1, 2)$.

A.142 Resolver analítica e graficamente os sistemas de equações.

- | | |
|--|---|
| a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ | b) $\begin{cases} 3x - 2y = -14 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$ |
| c) $\begin{cases} 2x - 5y = 9 \\ 7x + 4y = 10 \end{cases}$ | d) $\begin{cases} 4x + 5y = 2 \\ 6x + 7y = 4 \end{cases}$ |
| e) $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + 4y = 3 \end{cases}$ | f) $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$ |

A.143 Resolver os sistemas de equações:

$$a) \begin{cases} \frac{1}{x-y} + \frac{1}{x+y} = \frac{3}{4} \\ \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y} = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

Sugestão: faça $\frac{1}{x-y} = a$ e $\frac{1}{x+y} = b$

$$b) \begin{cases} \frac{3}{x+y+1} - \frac{2}{2x-y+3} = \frac{5}{12} \\ \frac{2}{x+y+1} + \frac{3}{2x-y+3} = 1 \end{cases}$$

A.144 Obter a equação da reta que passa pelos pontos (1, 2) e (3, -2).

Solução

Seja $y = ax + b$ a equação procurada. O problema estará resolvido se determinarmos o valores de a e b .

Considerando que o ponto (1, 2), pertence a reta de equação $y = ax + b$, ao substituirmos $x = 1$ e $y = 2$ em $y = ax + b$, temos a sentença verdadeira:

$$2 = a \cdot 1 + b \quad \text{isto é: } a + b = 2$$

Analogamente, para o ponto (3, -2), obtemos:

$$-2 = a \cdot 3 + b \quad \text{isto é: } 3a + b = -2$$

Resolvendo o sistema

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ 3a + b = -2 \end{cases}$$

encontramos $a = -2$ e $b = 4$.

Assim, a equação da reta é $y = -2x + 4$.

A.145 Obter a equação da reta que passa pelos pontos:

- a) (2, 3) e (3, 5) b) (1, -1) e (-1, 2)
c) (3, -2) e (2, -3) d) (1, 2) e (2, 2)

VI. IMAGEM

136. O conjunto imagem da função afim $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ax + b$ com $a \neq 0$ é \mathbb{R} .

De fato, qualquer que seja $y \in \mathbb{R}$ existe $x = \frac{y-b}{a} \in \mathbb{R}$ tal que
 $f(x) = f\left(\frac{y-b}{a}\right) = a \cdot \frac{y-b}{a} + b = y$.

VII. COEFICIENTES DA FUNÇÃO AFIM

137. O coeficiente a da função $f(x) = ax + b$ é denominado *coeficiente angular* ou *declividade* da reta representada no plano cartesiano.

O coeficiente b da função $y = ax + b$ é denominado *coeficiente linear*.

138. Exemplo

Na função $y = 2x + 1$ o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é 1. Observe que se $x = 0$ temos $y = 1$. Portanto, o coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y .

EXERCÍCIOS

A.146 Obter a equação da reta que passa pelo ponto: (1, 3) e tem coeficiente angular igual a 2.

Solução

A equação procurada é da forma $y = ax + b$.

Se o coeficiente angular é 2, então $a = 2$.

Substituindo $x = 1$, $y = 3$ e $a = 2$ em $y = ax + b$, vem:

$$3 = 2 \cdot 1 + b \Rightarrow b = 1.$$

A equação procurada é $y = 2x + 1$.

A.147 Obter a equação da reta que passa pelo ponto (-2, 4) e tem coeficiente angular igual a -3.

A.148 Obter a equação da reta com coeficiente angular igual a $-\frac{1}{2}$ e passando pelo ponto (-3, 1).

A.149 Obter a equação da reta que passa pelo ponto (-2, 1) e tem coeficiente linear igual a 4.

A.150 Obter a equação da reta com coeficiente linear igual a -3 e passa pelo ponto (-3, -2).

142. Exemplo

A função $f(x) = 2x$ é crescente em \mathbb{R} , pois:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \underbrace{2x_1}_{f(x_1)} < \underbrace{2x_2}_{f(x_2)} \text{ para todo } x_1 \in \mathbb{R} \text{ e todo } x_2 \in \mathbb{R}.$$

143. Definição

A função $f: A \rightarrow B$ definida por $y = f(x)$ é *decrecente* no conjunto $A_1 \subset A$ se, para dois valores quaisquer x_1 e x_2 pertencentes a A_1 , com $x_1 < x_2$, tem-se $f(x_1) > f(x_2)$.


Em símbolos: f é decrescente quando

$$(\forall x_1, x_2)(x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2))$$

e isto também pode ser posto assim:

$$(\forall x_1, x_2)(x_1 \neq x_2 \Rightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0)$$

Na linguagem prática, (não matemática) isto significa que a função é decrescente no conjunto A_1 se, ao aumentarmos o valor atribuído a x , o valor de y diminui.




144. Exemplo

A função $f(x) = -2x$ é decrescente em \mathbb{R} , pois

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \underbrace{-2x_1}_{f(x_1)} > \underbrace{-2x_2}_{f(x_2)} \text{ para todo } x_1 \in \mathbb{R} \text{ e todo } x_2 \in \mathbb{R}.$$


Notemos que uma mesma função $y = f(x)$, pode não ter o mesmo comportamento (crescente ou decrescente) em todo o seu domínio.

É bastante comum que uma função seja crescente em certos subconjuntos de D e decrescente em outros. O gráfico ao lado representa uma função crescente em \mathbb{R}_+ e decrescente em \mathbb{R}_- .



EXERCÍCIO

A.152 Com base nos gráficos abaixo, de funções de \mathbb{R} em \mathbb{R} , especificar os intervalos onde a função é crescente ou decrescente.



X. TEOREMA

145. "A função afim é *crescente* (*decrecente*) se, e somente se, o coeficiente angular for *positivo* (*negativo*)".

Demonstração

$$\begin{aligned} f(x) = ax + b \text{ é crescente} &\iff \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0 \quad (x_1 \neq x_2) \iff \\ &\iff \frac{(ax_1 + b) - (ax_2 + b)}{x_1 - x_2} > 0 \quad (x_1 \neq x_2) \iff \frac{a(x_1 - x_2)}{x_1 - x_2} > 0 \quad (x_1 \neq x_2) \iff \\ &\iff a > 0. \end{aligned}$$

Fica como exercício provar que $f(x) = ax + b$ decrescente equivale a $a < 0$.

EXERCÍCIOS

A.153 Especificar para cada uma das funções abaixo, se é crescente ou decrescente em \mathbb{R} :

a) $y = 3x - 2$

b) $y = -4x + 3$

Solução

a) É crescente, pois o coeficiente angular é positivo ($a = 3$)

b) É decrescente, pois o coeficiente angular é negativo ($a = -4$).

A.154 Especificar para cada uma das funções abaixo, se é crescente ou decrescente em \mathbb{R} .

- a) $y = 1 + 5x$ b) $y = -3 - 2x$
c) $y = x + 2$ d) $y = 3 - x$
e) $y = -2x$ f) $y = 3x$

A.155 Estudar segundo os valores do parâmetro m , a variação (crescente, decrescente ou constante) da função $y = (m - 1)x + 2$.

Solução

Se $m - 1 > 0$, isto é, $m > 1$, então a função terá coeficiente angular positivo e, portanto, crescente em \mathbb{R} .

Se $m - 1 < 0$, isto é, $m < 1$, então a função terá coeficiente angular negativo e, portanto, decrescente em \mathbb{R} .

Se $m - 1 = 0$, isto é, $m = 1$, então será função $y = (1 - 1)x + 2$, ou seja, $y = 2$ que é constante em \mathbb{R} .

A.156 Estudar segundo os valores do parâmetro m , a variação (crescente, decrescente ou constante) das funções abaixo

- a) $y = (m + 2)x - 3$ b) $y = (4 - m)x + 2$
c) $y = 4 - (m + 3)x$ d) $y = m(x - 1) + 3 - x$

XI. SINAL DE UMA FUNÇÃO


146. Seja a função $f: A \rightarrow B$ definida por $y = f(x)$. Vamos resolver o problema "para que valores de x temos $f(x) > 0$, $f(x) = 0$ ou $f(x) < 0$?"

Resolver este problema significa estudar o sinal da função $y = f(x)$ para cada x pertencente ao seu domínio.

Para se estudar o sinal de uma função, quando a função está representada no plano cartesiano, basta examinar se é positiva, nula ou negativa a ordenada de cada ponto da curva.


147 Exemplo

Estudar o sinal da função $y = f(x)$ cujo gráfico está abaixo representado.



Observemos, inicialmente, que interessa o comportamento da curva $y = f(x)$ em relação ao eixo dos x , não importando a posição do eixo dos y .

Preparando o gráfico com aspecto prático, temos:



Conclusão:


$$f(x) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 2 \text{ ou } x = 4 \text{ ou } x = 7$$


$$f(x) > 0 \iff -1 < x < 2 \text{ ou } 2 < x < 4 \text{ ou } x > 7$$

$$f(x) < 0 \iff x < -1 \text{ ou } 4 < x < 7.$$


EXERCÍCIO

A.157 Estudar o sinal das funções cujos gráficos estão representados abaixo.





ou, simplesmente:



151. Exemplos

1º) Estudar os sinais da função $f(x) = 2x - 1$.

Temos:

$$f(x) = 0 \Rightarrow 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$a = 2 \Rightarrow a > 0 \text{ e } -a < 0$$

Logo:

$$\text{para } x > \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) > 0 \text{ (sinal de } a = 2 > 0)$$

$$\text{para } x < \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) < 0 \text{ (sinal de } -a = -2 < 0)$$

Fazendo o esquema gráfico, temos



2º) Estudar os sinais de $f(x) = -2x + 4$.

Temos


$$f(x) = 0 \Rightarrow -2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$a = -2 \Rightarrow a < 0 \text{ e } -a > 0$$

$$\text{para } x > 2 \Rightarrow f(x) < 0 \text{ (sinal de } a = -2 < 0)$$

$$\text{para } x < 2 \Rightarrow f(x) > 0 \text{ (sinal de } -a = 2 > 0)$$



Fazendo o esquema gráfico



152. Um outro processo para analisarmos a variação do sinal da função afim é construir o gráfico cartesiano.

Lembremos que na função afim $f(x) = ax + b$ o gráfico cartesiano é uma reta e a função é crescente (decrescente) se o coeficiente angular a é positivo (negativo).

Assim nos dois últimos exemplos, temos:



EXERCÍCIOS

A.158 Estudar os sinais das funções definidas em \mathbb{R} :

a) $y = 2x + 3$

b) $y = -3x + 2$

c) $y = 4 - x$

d) $y = 5 + x$

e) $y = 3 - \frac{x}{2}$

f) $y = \frac{x}{3} + \frac{3}{2}$

g) $y = 2x - \frac{4}{3}$

h) $y = -x$

A.159 Seja a função de \mathbb{R} em \mathbb{R} definida por $f(x) = 4x - 5$. Determine os valores do domínio da função que produzem imagens maiores que 2.

Solução

Os valores do domínio da função que produzem imagens maiores que 2, são os valores de $x \in \mathbb{R}$ tais que

$$4x - 5 > 2$$

e, portanto,

$$x > \frac{7}{4}$$

A.160 Para que valores do domínio da função de \mathbb{R} em \mathbb{R} definida por $f(x) = \frac{3x - 1}{2}$ a imagem é menor que 4?

A.161 Para que valores de $x \in \mathbb{R}$ a função $f(x) = \frac{2}{3} - \frac{x}{2}$ é negativa?


A.162 Sejam as funções $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 2 - 3x$ e $h(x) = \frac{4x - 1}{2}$ definidas

em \mathbb{R} . Para que valores de $x \in \mathbb{R}$, tem-se:

- a) $f(x) \geq g(x)$? b) $g(x) < h(x)$? c) $f(x) \geq h(x)$?

A.163 Dados os gráficos das funções f , g e h definidas em \mathbb{R} . Determinar os valores de $x \in \mathbb{R}$, tais que:

- a) $f(x) > g(x)$
b) $g(x) \leq h(x)$
c) $f(x) \geq h(x)$
d) $g(x) > 4$
e) $f(x) \leq 0$



XIII. INEQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

153. A dupla desigualdade $f(x) < g(x) < h(x)$ se decompõe em duas inequações simultâneas, isto é, equivale a um sistema de duas equações em x , separadas pelo conectivo e:

$$f(x) < g(x) < h(x) \iff \begin{cases} f(x) < g(x) & \textcircled{I} \\ g(x) < h(x) & \textcircled{II} \end{cases}$$

Indicando com S_1 o conjunto-solução de \textcircled{I} e S_2 o conjunto-solução de \textcircled{II} , o conjunto-solução da dupla desigualdade é $S = S_1 \cap S_2$.

154. Exemplo


$$\text{Resolver } \underbrace{3x + 2 < -x + 3}_{\textcircled{I}} \underbrace{\leq x + 4}_{\textcircled{II}}$$

Temos que resolver duas inequações:

- $\textcircled{I} \quad 3x + 2 < -x + 3 \implies 4x < 1 \implies x < \frac{1}{4}$
 $\textcircled{II} \quad -x + 3 \leq x + 4 \implies -2x \leq 1 \implies x \geq -\frac{1}{2}$

A intersecção desses dois conjuntos é

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{4} \right\}$$



EXERCÍCIOS

A.164 Resolver as inequações em \mathbb{R} :


- a) $-2 < 3x - 1 < 4$ d) $x + 1 \leq 7 - 3x < \frac{x}{2} - 1$
b) $-4 < 4 - 2x \leq 3$ e) $3x + 4 < 5 < 6 - 2x$
c) $-3 < 3x - 2 < x$ f) $2 - x < 3x + 2 < 4x + 1$

A.165 Resolver os sistemas de inequações em \mathbb{R} :

- a) $\begin{cases} 3x - 2 > 4x + 1 \\ 5x + 1 \leq 2x - 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 5 - 2x < 0 \\ 3x + 1 \geq 4x - 5 \\ x - 3 \geq 0 \end{cases}$
c) $\begin{cases} 3x + 2 \geq 5x - 2 \\ 4x - 1 > 3x - 4 \\ 3 - 2x < x - 6 \end{cases}$ d) $\begin{cases} \frac{2x - 5}{1 - x} \leq -2 \\ \frac{x^2 + x + 3}{x + 1} > x \end{cases}$

A.166 Com base nos gráficos das funções f , g e h definidas em \mathbb{R} , determinar os valores de $x \in \mathbb{R}$, tais que

- a) $f(x) < g(x) \leq h(x)$
b) $g(x) \leq f(x) < h(x)$
c) $h(x) \leq f(x) < g(x)$



XIV. INEQUAÇÕES-PRODUTO

155. Sendo $f(x)$ e $g(x)$ duas funções na variável x , as inequações $f(x) \cdot g(x) > 0$, $f(x) \cdot g(x) < 0$, $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ e $f(x) \cdot g(x) \leq 0$ são denominadas *inequações-produto*.

2º) “toda potência de base real e expoente par é um número real não negativo”, isto é

$$a^{2n} \geq 0, \forall a \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$$

Assim sendo, temos as seguintes equivalências:

$$[f(x)]^n > 0 \iff \begin{cases} f(x) > 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ f(x) \neq 0 & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

$$[f(x)]^n < 0 \iff \begin{cases} f(x) < 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \nexists x \in \mathbb{R} & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

$$[f(x)]^n \geq 0 \iff \begin{cases} f(x) \geq 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \forall x \in D(f) & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

$$[f(x)]^n \leq 0 \iff \begin{cases} f(x) \leq 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ f(x) = 0 & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

Exemplos

$$1^\circ) (3x - 2)^3 > 0 \implies 3x - 2 > 0 \implies S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{2}{3}\}$$

$$2^\circ) (4x - 3)^6 > 0 \implies 4x - 3 \neq 0 \implies S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{3}{4}\}$$

$$3^\circ) (2x + 1)^5 < 0 \implies 2x + 1 < 0 \implies S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{1}{2}\}$$

$$4^\circ) (x - 2)^4 < 0 \implies S = \emptyset$$

$$5^\circ) (3 - 5x)^7 \geq 0 \implies 3 - 5x \geq 0 \implies S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{3}{5}\}$$

$$6^\circ) (4x - 5)^2 \geq 0 \implies S = \mathbb{R}$$

$$7^\circ) (8 - 2x)^4 \leq 0 \implies 8 - 2x = 0 \implies S = \{4\}$$

EXERCÍCIOS

A.167 Resolver em \mathbb{R} as inequações:

- a) $(3x + 3)(5x - 3) > 0$ b) $(4 - 2x)(5 + 2x) < 0$
c) $(5x + 2)(2 - x)(4x + 3) > 0$ d) $(3x + 2)(-3x + 4)(x - 6) < 0$
e) $(6x - 1)(2x + 7) \geq 0$ f) $(5 - 2x)(-7x - 2) \leq 0$
g) $(3 - 2x)(4x + 1)(5x + 3) \geq 0$ h) $(5 - 3x)(7 - 2x)(1 - 4x) \leq 0$


A.168 Resolver em \mathbb{R} as inequações:

- a) $(x - 3)^4 > 0$ b) $(3x + 8)^3 < 0$
c) $(4 - 5x)^6 < 0$ d) $(1 - 7x)^5 > 0$
e) $(3x + 5)^2 \geq 0$ f) $(5x + 1)^3 \leq 0$
g) $(4 + 3x)^4 \leq 0$ h) $(3x - 8)^5 \geq 0$

A.169 Resolver em \mathbb{R} a inequação $(x - 3)^5 \cdot (2x + 3)^6 < 0$.

Solução

Estudemos separadamente os sinais das funções $f(x) = (x - 3)^5$ e $g(x) = (2x + 3)^6$. Lembrando que a potência de expoente ímpar e base real tem o sinal da base, então, o sinal de $(x - 3)^5$ é igual ao sinal de $x - 3$, isto é:



A potência de expoente par e base real não nula é sempre positiva, então $(2x + 3)^6$ é positivo se $x \neq -\frac{3}{2}$ e $(2x + 3)^6$ é nulo se $x = -\frac{3}{2}$, isto é:



Fazendo o quadro-produto, temos:

	$-\frac{3}{2}$	3	
$f(x)$	-	0	+
$g(x)$	+	0	+
$f(x) \cdot g(x)$	-	0	+

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 3 \text{ e } x \neq -\frac{3}{2}\}$$

A.170 Resolver em \mathbb{R} as inequações:

- a) $(5x + 4)^4 \cdot (7x - 2)^3 \geq 0$
b) $(3x + 1)^3 \cdot (2 - 5x)^5 \cdot (x + 4)^8 > 0$
c) $(x + 6)^7 \cdot (6x - 2)^4 \cdot (4x + 5)^{10} \leq 0$
d) $(5x - 1) \cdot (2x + 6)^8 \cdot (4 - 6x)^6 \geq 0$

XV. INEQUAÇÕES-QUOCIENTE

162. Sendo $f(x)$ e $g(x)$ duas funções na variável x , as inequações

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 0, \frac{f(x)}{g(x)} < 0, \frac{f(x)}{g(x)} \geq 0 \text{ e } \frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$$

são denominadas *inequações-quociente*.

Considerando que as regras de sinais do produto e do quociente de números reais são análogas, podemos, então, construir o quadro-quociente de modo análogo ao quadro-produto, observando o fato de que o denominador de uma fração não pode ser nulo.

163. Exemplo

Resolver em \mathbb{R} a inequação $\frac{3x+4}{1-x} \leq 2$. Temos:

$$\begin{aligned} \frac{3x+4}{1-x} \leq 2 &\Rightarrow \frac{3x+4}{1-x} - 2 \leq 0 \Rightarrow \frac{3x+4-2(1-x)}{1-x} \leq 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{5x+2}{1-x} \leq 0 \end{aligned}$$

Fazendo o quadro-quociente, temos

	$-\frac{2}{5}$		1	
$f(x) = 5x + 2$	-	0	+	+
$g(x) = 1 - x$	+	+	0	-
$\frac{f(x)}{g(x)}$	-	0	+	-

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -\frac{2}{5} \text{ ou } x > 1\}$$

Podemos resolver a inequação $\frac{3x+4}{1-x} \leq 2$, multiplicando por $h(x) = 1 - x$ e examinando dois casos:

a) $h(x) = 1 - x > 0$, isto é, $x < 1$.

$$\frac{3x+4}{1-x} \leq 2 \Rightarrow 3x+4 \leq 2(1-x) \Rightarrow x \leq -\frac{2}{5}$$

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -\frac{2}{5}\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -\frac{2}{5}\}$$

b) $h(x) = 1 - x < 0$, isto é, $x > 1$

$$\frac{3x+4}{1-x} \leq 2 \Rightarrow 3x+4 \geq 2(1-x) \Rightarrow x \geq -\frac{2}{5}$$

$$S_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -\frac{2}{5}\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$$

O conjunto solução é:

$$S = S_1 \cup S_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -\frac{2}{5} \text{ ou } x > 1\}$$

Daremos sempre preferência ao método do quadro-quociente, por sua maior simplicidade.

EXERCÍCIOS

A.171 Resolver as inequações em \mathbb{R} :

a) $\frac{2x+1}{x+2} > 0$

b) $\frac{3x-2}{3-2x} < 0$

c) $\frac{3-4x}{5x+1} \geq 0$

d) $\frac{-3-2x}{3x+1} \leq 0$

A.172 Resolver em \mathbb{R} as inequações:

a) $\frac{5x-3}{3x-4} > -1$

b) $\frac{5x-2}{3x+4} < 2$

c) $\frac{x-1}{x+1} \geq 3$

d) $\frac{3x-5}{2x-4} \leq 1$

A.173 Resolver as inequações em \mathbb{R} :

a) $\frac{(1-2x)(3+4x)}{(4-x)} > 0$

b) $\frac{(3x+1)}{(2x+5)(5x+3)} < 0$

c) $\frac{(5x+4)(4x+1)}{(5-4x)} \geq 0$

d) $\frac{(1-2x)}{(5-x)(3-x)} \leq 0$

A.174 Resolver em \mathbb{R} as inequações:

a) $\frac{1}{x-4} < \frac{2}{x+3}$

b) $\frac{1}{x-1} < \frac{2}{x-2}$

c) $\frac{x+1}{x+2} > \frac{x+3}{x+4}$

d) $\frac{x+5}{3x+2} \leq \frac{x-2}{3x+5}$

e) $\frac{5x+2}{4x-1} > \frac{5x-1}{4x+5}$

f) $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x-3} < 0$

g) $\frac{2}{3x-1} \geq \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$

V. ZEROS

168. Definição

Os zeros ou raízes da função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ são os valores de x reais tais que $f(x) = 0$ e, portanto, as soluções da equação do segundo grau

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Utilizando a forma canônica, temos:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c = 0 &\iff a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 \iff \\ &\iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \iff \\ &\iff x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \iff x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \end{aligned}$$

169. Discussão

Observe que a existência de raízes reais para a equação do segundo grau $ax^2 + bx + c = 0$ fica condicionada ao fato de $\sqrt{\Delta} \in \mathbb{R}$. Assim, temos três casos a considerar:

1º) $\Delta > 0$, a equação apresentará duas raízes distintas que são

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

2º) $\Delta = 0$, a equação apresentará duas raízes iguais que são

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}.$$

3º) $\Delta < 0$, considerando que nesse caso $\sqrt{\Delta} \notin \mathbb{R}$, diremos que a equação não apresenta raízes reais.


170. Resumo

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff \begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\ \Delta = 0 \Rightarrow x = \frac{-b}{2a} \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{não existem raízes reais.} \end{cases}$$

171. Interpretando geometricamente, diremos que os zeros da função quadrática são as abscissas dos pontos onde a parábola corta o eixo dos x .

Exemplo

Construindo o gráfico da função $y = x^2 - 4x + 3$ podemos notar que a parábola corta o eixo dos x nos pontos de abscissas 1 e 3, que são as raízes da equação $x^2 - 4x + 3 = 0$.



EXERCÍCIOS

A.177 Determinar os zeros reais das funções:

- $f(x) = x^2 - 3x + 2$
- $f(x) = -x^2 + 7x - 12$
- $f(x) = 3x^2 - 7x + 2$
- $f(x) = x^2 - 2x + 2$
- $f(x) = x^2 + 4x + 4$
- $f(x) = -x^2 + \frac{3}{2}x + 1$
- $f(x) = x^2 - 2x - 1$
- $f(x) = -x^2 + 3x - 4$
- $f(x) = x^2 - \sqrt{2}x + \frac{1}{2}$
- $f(x) = x^2 + (1 - \sqrt{3})x - \sqrt{3}$
- $f(x) = 2x^2 - 4x$
- $f(x) = -3x^2 + 6$
- $f(x) = 4x^2 + 3$
- $f(x) = -5x^2$

A.178 (MAPOFEI-76) Resolver o sistema

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{12} \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$$

VI. MÁXIMO E MÍNIMO

172. Definição

Dizemos que o número $y_M \in \text{Im}(f)$ ($y_m \in \text{Im}(f)$) é o *valor de máximo (mínimo)* da função $y = f(x)$ se, e somente se, $y_M \geq y$ ($y_m \leq y$) para qualquer $y \in \text{Im}(f)$ e o valor de $x_M \in D(f)$ ($x_m \in D(f)$) tal que $y_M = f(x_M)$ ($y_m = f(x_m)$) é chamado *ponto de máximo (mínimo)* da função.

173. Teorema

"A função quadrática $y = ax^2 + bx + c$ admite um valor máximo (mínimo) $y = \frac{-\Delta}{4a}$ em $x = \frac{-b}{2a}$ se, e somente se, $a < 0$ ($a > 0$)".

Demonstração

Consideremos a função quadrática na forma canônica

$$y = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] \quad (1)$$

Considerando que $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ e $\frac{-\Delta}{4a^2}$ para uma dada função tem valor constante, então y assumirá valor máximo (mínimo) quando $a < 0$ ($a > 0$) e a diferença

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}$$

for a menor possível, isto é

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{-b}{2a}.$$

Substituindo $x = \frac{-b}{2a}$ em (1) temos

$$y = a\left[\left(-\frac{b}{2a} + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = a\left[0^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = \frac{-\Delta}{4a}$$

174. Exemplos

1º) Na função real $f(x) = 4x^2 - 4x - 8$ temos: $a = 4$, $b = -4$, $c = -8$ e $\Delta = 144$.

Como $a = 4 > 0$, a função admite um valor mínimo:

$$y_M = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-144}{4 \cdot 4}, \text{ isto é: } y_m = -9$$

em

$$x_m = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2 \cdot 4}, \text{ isto é: } x_m = \frac{1}{2}.$$

2º) Na função real $f(x) = -x^2 + x + \frac{3}{4}$, temos: $a = -1$, $b = 1$, $c = \frac{3}{4}$ e $\Delta = 4$.

Como $a = -1 < 0$, a função admite um valor máximo:

$$y_M = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-4}{4(-1)}, \text{ isto é: } y_M = 1$$

em

$$x_M = \frac{-b}{2a} = \frac{-1}{2(-1)}, \text{ isto é: } x_M = \frac{1}{2}$$

VII. VÉRTICE DA PARÁBOLA

175. Definição

O ponto $V\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a}\right)$ é chamado *vértice* da parábola representativa da função quadrática.

EXERCÍCIOS

A.194 Determinar o valor máximo ou o valor mínimo, e o ponto de máximo ou o ponto de mínimo das funções abaixo, definidas em \mathbb{R} .

a) $y = 2x^2 + 5x$

b) $y = -3x^2 + 12x$

c) $y = 4x^2 - 8x + 4$

d) $y = x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{5}{2}$

e) $y = -x^2 + 5x - 7$

f) $y = -\frac{x^2}{2} + \frac{4}{3}x - \frac{1}{2}$

EXERCÍCIOS

A.211 Fazer o esboço do gráfico da função $y = x^2 - 4x + 3$.

Solução

Concavidade

Como $a = 1 > 0$ a parábola tem a concavidade voltada para cima.

Zeros da função

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

Os pontos no eixo x são $P_1(1, 0)$ e $P_2(3, 0)$

Vértice

Em $y = x^2 - 4x + 3$, temos

$$a = 1, \quad b = -4, \quad c = 3 \quad \text{e} \quad \Delta = 4$$


$$\text{como } \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2 \cdot 1} = 2 \quad \text{e} \quad \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-4}{4 \cdot 1} = -1,$$

o vértice é $V(2, -1)$.

Gráfico

Observe que a parábola sempre intercepta o eixo y . Para determinarmos onde o faz, basta lembrar que o ponto situado no eixo y tem abscissa nula, logo $y(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 + 3 = 3$, isto é, o ponto no eixo y é $(0, 3)$.

Determinado o ponto onde a parábola corta o eixo y , podemos determinar um outro ponto $(4, 3)$ da parábola, simétrico a $(0, 3)$ em relação a reta $x = 2$ (eixo de simetria da parábola).



A.212 Fazer o esboço do gráfico da função $y = -x^2 + 4x - 4$.

Solução

Concavidade

Como $a = -1 < 0$ a parábola tem a concavidade voltada para baixo.

Zeros da função


$$-x^2 + 4x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

A parábola admite um único ponto no eixo x que é $P = (2, 0)$.

Vértice

Considerando que a parábola admite um único ponto no eixo x , então esse ponto é o vértice da parábola.

Gráfico



A.213 Fazer o esboço do gráfico da função $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$.

Solução

Concavidade

Como $a = \frac{1}{2} > 0$, a parábola tem a concavidade voltada para cima.

Zeros da função

$$\frac{1}{2}x^2 + x + 1 = 0 \Rightarrow \Delta = -1 < 0 \Rightarrow \text{nenhuma raiz real.}$$

A parábola não tem pontos no eixo dos x .


Vértice

Em $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$, temos:

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = 1, \quad c = 1 \quad \text{e} \quad \Delta = -1.$$

$$\text{Como } \frac{-b}{2a} = \frac{-1}{2 \cdot \frac{1}{2}} = -1 \quad \text{e} \quad \frac{-\Delta}{4a} = \frac{1}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}, \quad \text{o vértice é } V(-1, \frac{1}{2}).$$

Gráfico



A.214 Construir o gráfico cartesiano das funções definidas em \mathbb{R} :

a) $y = x^2 - 2x - 3$

b) $y = 4x^2 - 10x + 4$

c) $y = -x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

d) $y = -3x^2 + 6x - 3$

e) $y = x^2 - 3x + \frac{9}{4}$

f) $y = 3x^2 - 4x + 2$

g) $y = -x^2 + x - 1$

h) $y = -\frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2}$

$$\begin{cases} f(x) > 0 & \text{para } x < -2 \text{ ou } x > 3 \\ f(x) = 0 & \text{para } x = -2 \text{ ou } x = 3 \\ f(x) < 0 & \text{para } -2 < x < 3. \end{cases}$$

2º) $f(x) = -2x^2 + 3x + 2$ apresenta $\Delta = 3^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 2 = 25$, logo $f(x)$ tem dois zeros reais e distintos:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 + 5}{-4} = -\frac{1}{2} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 - 5}{-4} = 2$$

e, como $a = -2 < 0$, concluímos que

$$\begin{cases} f(x) < 0 & \text{para } x < -\frac{1}{2} \text{ ou } x > 2 \\ f(x) = 0 & \text{para } x = -\frac{1}{2} \text{ ou } x = 2 \\ f(x) > 0 & \text{para } -\frac{1}{2} < x < 2 \end{cases}$$

EXERCÍCIO

A.215 Estudar os sinais de cada uma das funções do exercício A.214.

XII. INEQUAÇÃO DO 2º GRAU


185. Se $a \neq 0$ as inequações $ax^2 + bx + c > 0$, $ax^2 + bx + c < 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$ e $ax^2 + bx + c \leq 0$ são denominadas *inequações do 2º grau*.

Resolver, por exemplo, a inequação

$$ax^2 + bx + c > 0$$

é responder à pergunta: "existe x real tal que $f(x) = ax^2 + bx + c$ seja positiva?"

A resposta a esta pergunta se encontra no estudo do sinal de $f(x)$, que pode, inclusive, ser feito através do gráfico da função. Assim, no nosso exemplo, dependendo de a e de Δ podemos ter uma das seis respostas seguintes:



EXERCÍCIOS


A.216 Resolver a inequação $x^2 - 2x + 2 > 0$.

Solução

Considerando $f(x) = x^2 - 2x + 2$, temos $a = 1 > 0$ e $\Delta = -4 < 0$ então $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Como a inequação é $f(x) > 0$, vem:

$$S = \mathbb{R}.$$



A.217 Resolver a inequação $x^2 - 2x + 1 \leq 0$.


Solução

Considerando $f(x) = x^2 - 2x + 1$, temos $a = 1 > 0$, $\Delta = 0$ e o zero duplo $x = \frac{-b}{2a} = 1$, então

$$\begin{cases} f(x) > 0 & \forall x \in \mathbb{R} - \{1\} \\ f(x) = 0 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Como a inequação é $f(x) \leq 0$, vem:

$$S = \{1\}.$$




A.218 Resolver a inequação $-2x^2 + 3x + 2 \geq 0$.

Solução

Considerando $f(x) = -2x^2 + 3x + 2$, temos $a = -2 < 0$, $\Delta = 25 > 0$ e os

zeros $x_1 = -\frac{1}{2}$ e $x_2 = 2$, então

$$\begin{cases} f(x) < 0 & \text{para } x < -\frac{1}{2} \text{ ou } x > 2 \\ f(x) = 0 & \text{para } x = -\frac{1}{2} \text{ ou } x = 2 \\ f(x) > 0 & \text{para } -\frac{1}{2} < x < 2 \end{cases}$$



Como a inequação é $f(x) \geq 0$, vem:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq 2\}$$

A.219 Resolver as inequações em \mathbb{R} :

a) $x^2 - 3x + 2 > 0$

b) $-x^2 + x + 6 > 0$

c) $-3x^2 - 8x + 3 \leq 0$

d) $-x^2 + \frac{3}{2}x + 10 \geq 0$

e) $8x^2 - 14x + 3 \leq 0$

f) $4x^2 - 4x + 1 > 0$

g) $x^2 - 6x + 9 \geq 0$

h) $-4x^2 + 12x - 9 \geq 0$

i) $x^2 + 3x + 7 > 0$

j) $-3x^2 + 3x - 3 < 0$


k) $2x^2 - 4x + 5 < 0$

l) $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} > 0$

A.220 Resolver a inequação $(x^2 - x - 2)(-x^2 + 4x - 3) > 0$ em \mathbb{R} .

Solução

Analisando os sinais dos fatores, temos:



Fazendo o quadro-produto, vem

	-1	1	2	3	
$f(x) = x^2 - x - 2$	+	0	-	0	+
$g(x) = -x^2 + 4x - 3$	-	0	+	0	-
$f(x) \cdot g(x)$	-	0	+	0	-

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 1 \text{ ou } 2 < x < 3\}$$

A.221 Resolver em \mathbb{R} as inequações:

a) $(1 - 4x^2) \cdot (2x^2 + 3x) > 0$

b) $(2x^2 - 7x + 6) \cdot (2x^2 - 7x + 5) \leq 0$

c) $(x^2 - x - 6) \cdot (-x^2 + 2x - 1) > 0$

d) $(x^2 + x - 6) \cdot (-x^2 - 2x + 3) \geq 0$

e) $x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0$

f) $2x^3 - 6x^2 + x - 3 \leq 0$

A.222 (MAPOFEI-71) É dada a função $y = (2x^2 - 9x - 5)(x^2 - 2x + 2)$.


Determinar:

- a) os pontos de intersecção do gráfico da função com o eixo das abscissas.
b) o conjunto dos valores de x para os quais $y \leq 0$.

A.223 Resolver a inequação $\frac{2x^2 + x - 1}{2x - x^2} \leq 0$ em \mathbb{R} .

Solução

Analisando os sinais do numerador e do denominador, temos:



Fazendo o quadro-quociente, vem

	-1	0	1/2	2	
$f(x) = 2x^2 + x - 1$	+	0	-	0	+
$g(x) = 2x - x^2$	-	0	+	0	-
$f(x)$	-	0	+	0	-
$g(x)$	-	0	+	0	-

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \text{ ou } 0 < x \leq \frac{1}{2} \text{ ou } x > 2\}$$

A.224 Resolver em \mathbb{R} as inequações:

a) $\frac{4x^2 + x - 5}{2x^2 - 3x - 2} > 0$

b) $\frac{-9x^2 + 9x - 2}{3x^2 + 7x + 2} \leq 0$

c) $\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 5x + 6} \geq 0$

d) $\frac{2 - 3x}{2x^2 + 3x - 2} < 0$

e) $\frac{x^2 + 3x - 16}{-x^2 + 7x - 10} \geq 1$

f) $\frac{2x^2 + 4x + 5}{3x^2 + 7x + 2} < -2$

g) $\frac{6x^2 + 12x + 17}{-2x^2 + 7x - 5} \geq -1$

h) $\frac{(x + 1)^3 - 1}{(x - 1)^3 + 1} > 1$

EXERCÍCIOS

A.251 Construir o gráfico das funções definidas em \mathbb{R} :

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x) &= \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases} & \text{b) } f(x) &= \begin{cases} -2x + 3 & \text{se } x \geq 1 \\ 1 & \text{se } -1 < x < 1 \\ 2 + x & \text{se } x \leq -1 \end{cases} \\ \text{c) } f(x) &= \begin{cases} -2 & \text{se } x \leq -2 \\ x & \text{se } -2 < x < 2 \\ 2 & \text{se } x \geq 2 \end{cases} & \text{d) } f(x) &= \begin{cases} x^2 - 4x + 3 & \text{se } x \geq 1 \\ x - 1 & \text{se } x < 1 \end{cases} \\ \text{e) } f(x) &= \begin{cases} x^2 - 2x & \text{se } x \geq 0 \\ 1 - x & \text{se } x < 0 \end{cases} & \text{f) } f(x) &= \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{se } x > -2 \\ 1 & \text{se } x \leq -2 \end{cases} \\ \text{g) } f(x) &= \begin{cases} x^2 - 4x & \text{se } x \geq 0 \\ -x^2 - 4x & \text{se } x < 0 \end{cases} & \text{h) } f(x) &= \begin{cases} x^2 - 4x + 3 & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 + 4x + 3 & \text{se } x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

A.252 (MAPOFEI-74) Esboçar o gráfico da função

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{se } x \geq 2 \\ x^2 - 1 & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ |x| & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

A.253 Na função real $f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 2 & \text{se } x > -2 \\ -\frac{x}{2} + 1 & \text{se } x \leq -2 \end{cases}$ determine os valores do domínio que têm imagem 4.

Solução

Para determinarmos o valor de $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 4$ resolvemos as equações

$$x^2 + x - 2 = 4 \implies x^2 + x - 6 = 0 \implies \begin{cases} x = -3 & (\text{não convém}) \\ x = 2 \end{cases}$$

e

$$-\frac{x}{2} + 1 = 4 \implies x = -6$$

logo, os valores do domínio são $x = 2$ ou $x = -6$.

A.254 Na função real $f(x) = \begin{cases} x^2 - \frac{5}{2}x + 1 & \text{se } x \geq 0 \\ x + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$ determine os valores do domínio que têm imagem 7.

II. MÓDULO

198. Definição

Seja $x \in \mathbb{R}$, define-se *módulo* ou *valor absoluto* de x que se indica por $|x|$, através da relação

$$\begin{cases} |x| = x & \text{se } x \geq 0 \\ \text{ou} \\ |x| = -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Isto significa que:

1.º) o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número;

2.º) o módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número.

Assim, por exemplo, temos:

$$|+2| = +2, \quad |-7| = +7, \quad |0| = 0, \quad |-\frac{3}{5}| = +\frac{3}{5}, \quad |-\sqrt{2}| = +\sqrt{2}, \quad |+\sqrt{3}| = +\sqrt{3}$$

199. Propriedades

Decorrem da definição as seguintes propriedades:

- I. $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
- II. $|x| = 0 \iff x = 0$
- III. $|x| \cdot |y| = |xy|, \forall x, y \in \mathbb{R}$
- IV. $|x|^2 = x^2, \forall x \in \mathbb{R}$
- V. $|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$
- VI. $|x - y| \geq |x| - |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$
- VII. $|x| \leq a$ e $a > 0 \iff -a \leq x \leq a$
- VIII. $|x| \geq a$ e $a > 0 \iff x \leq -a$ ou $x \geq a$

III. FUNÇÃO MODULAR


200. Definição

Uma aplicação de \mathbb{R} em \mathbb{R} recebe o nome de *função módulo* ou *modular* quando a cada $x \in \mathbb{R}$ associa o elemento $|x| \in \mathbb{R}$.

Isto é: $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto |x|$

Utilizando o conceito de módulo de um número real, a função modular pode ser definida também da seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$



O gráfico da função modular é a reunião de duas semi-retas de origem O, que são as bissetrizes do 1º e 2º quadrantes.

A imagem desta função é $\text{Im} = \mathbb{R}_+$, isto é, a função modular somente assume valores reais não negativos.

EXERCÍCIOS

A.255 Construir os gráficos das funções definidas em \mathbb{R} :

a) $f(x) = |2x|$

b) $f(x) = |3x|$

A.256 Construir o gráfico da função real definida por $f(x) = |x + 1|$.

Solução

Podemos construir o gráfico de $f(x) = |x + 1|$ por dois processos:


Primeiro Processo

Notemos que $|x + 1| = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq -1 \\ -x - 1 & \text{se } x < -1 \end{cases}$

então a função pode ser definida como uma função a duas sentenças ou seja,

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq -1 \\ -x - 1 & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

cujo gráfico está representado ao lado.



Segundo Processo

Para construirmos o gráfico de


$$f(x) = |x + 1|,$$

fazemos inicialmente o gráfico da função $g(x) = x + 1$, que está representado ao lado.

Para obtermos o gráfico de


$$f(x) = |g(x)| = |x + 1|$$

fazemos em duas etapas:



Primeira Etapa



Se $g(x) \geq 0$, vamos ter $f(x) = |g(x)| = g(x)$, isto é, o gráfico da função f coincidirá com o gráfico da função g .



Segunda Etapa:

Se $g(x) < 0$, vamos ter $f(x) = |g(x)| = -g(x)$, isto é, o gráfico da função f será simétrico do gráfico da função g , relativamente ao eixo das abscissas.

Construindo os gráficos obtidos, nas duas etapas, no mesmo plano cartesiano temos o gráfico da função $f(x) = |x + 1|$.



A.257 Construir os gráficos das seguintes funções reais:

a) $f(x) = |x - 1|$

b) $f(x) = |2x - 1|$

c) $f(x) = |2x + 3|$

d) $f(x) = |2 - 3x|$

e) $f(x) = |x^2 + 4x|$

f) $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$


g) $f(x) = |4 - x^2|$

A.258 Construir o gráfico da função definida em \mathbb{R} por $f(x) = |x - 1| + 2$


Solução

Construimos inicialmente o gráfico da função $g(x) = |x - 1|$

Para obtermos o gráfico de $f(x) = g(x) + 2$ deslocamos cada ponto do gráfico da função g duas unidades "para cima".



$$g(x) = |x - 1|$$



$$f(x) = |x - 1| + 2$$

A.259 Construir os gráficos das seguintes funções reais

a) $f(x) = |x| - 3$

b) $f(x) = |2x - 1| - 2$

c) $f(x) = |3x - 4| + 1$

d) $f(x) = |x^2 - 1| - 2$

e) $f(x) = |x^2 - 4| + 3$

f) $f(x) = |x^2 + 4x + 3| - 1$

A.260 Construir o gráfico da função definida em \mathbb{R} $f(x) = |x + 2| + x - 1$.

Solução

Notemos que

$$|x + 2| = \begin{cases} x + 2 & \text{se } x \geq -2 \\ -x - 2 & \text{se } x < -2 \end{cases}$$

Devemos, então considerar dois casos

1º) quando $x \geq -2$, temos:

$$\begin{aligned} f(x) &= |x + 2| + x - 1 = \\ &= x + 2 + x - 1 = 2x + 1 \end{aligned}$$


2º) quando $x < -2$, temos:

$$\begin{aligned} f(x) &= |x + 2| + x - 1 = \\ &= -x - 2 + x - 1 = -3. \end{aligned}$$

Anotando a função f como uma função definida a duas sentenças, vem:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x \geq -2 \\ -3 & \text{se } x < -2 \end{cases}$$

cujo gráfico está ao lado.



A.261 Construir os gráficos das funções reais abaixo.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| a) $f(x) = x + x$ | b) $f(x) = x - x$ |
| c) $f(x) = x - 3 + x + 2$ | d) $f(x) = x + 1 - x + 3$ |
| e) $f(x) = 2x - 1 + x - 2$ | f) $f(x) = 3x + 2 - 2x + 3$ |
| g) $f(x) = x^2 - 4 x + 3$ | h) $f(x) = x^2 - 2 x - 3 $ |
| i) $f(x) = x^2 - 2x + x + 2$ | |

A.262 Construir o gráfico da função $f(x) = \frac{|x|}{x}$ definida em \mathbb{R}^* .

A.263 Construir o gráfico da função $f(x) = \frac{|x - 1|}{1 - x}$ definida em $\mathbb{R} - \{1\}$.

A.264 Construir o gráfico da função definida em \mathbb{R} por:

$$f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$$

Solução

$$\text{Notemos que } |2x + 1| = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x \geq -\frac{1}{2} \\ -2x - 1 & \text{se } x < -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{e } |x - 1| = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \geq 1 \\ -x + 1 & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

Devemos então, considerar 3 casos:

1º) quando $x < -\frac{1}{2}$, temos $f(x) = |2x + 1| + |x - 1| = -2x - 1 - x + 1 = -3x$


2º) quando $-\frac{1}{2} \leq x < 1$, temos $f(x) = |2x + 1| + |x - 1| = 2x + 1 - x + 1 = x + 2$

3º) quando $x \geq 1$, temos $f(x) = |2x + 1| + |x - 1| = 2x + 1 + x - 1 = 3x$

Anotando a função f como uma função definida a várias sentenças vem:

$$f(x) = \begin{cases} -3x & \text{se } x < -\frac{1}{2} \\ x + 2 & \text{se } -\frac{1}{2} \leq x < 1 \\ 3x & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

cujo gráfico está ao lado.



A.265 Construir os gráficos das seguintes funções reais:

- | | |
|---------------------------------|--|
| a) $f(x) = x + 1 + x - 1 $ | b) $f(x) = x + 1 - x - 1 $ |
| c) $f(x) = 2x - 2 + x + 3 $ | d) $f(x) = 3x + 3 - 2x - 3 $ |
| e) $f(x) = x^2 - 4 - x - 2 $ | f) $f(x) = \frac{ x^2 - 2x - x^2 - 4 }{2}$ |

A.266 Construir o gráfico da função definida em \mathbb{R}

$$f(x) = ||2x - 2| - 4|$$

Solução

Construímos inicialmente o gráfico de $g(x) = |2x - 2| - 4$.

Analisemos as duas possibilidades

1º) Se $g(x) \geq 0$, temos:

$$f(x) = |g(x)| = g(x)$$



isto é, o gráfico da função f coincidirá com o gráfico da função g .

2º) Se $g(x) < 0$, temos:

$$f(x) = |g(x)| = -g(x)$$

isto é, o gráfico da função f é o oposto do gráfico da função g .

Considerando as duas possibilidades e representando num mesmo plano cartesiano temos:



A.267 Construir os gráficos das funções reais:

- a) $f(x) = ||x| - 2|$
- b) $f(x) = ||2x + 3| - 2|$
- c) $f(x) = ||x^2 - 1| - 3|$
- d) $f(x) = ||x - 1| + x - 3|$
- e) $f(x) = |x^2 - 4|x| + 3|$
- f) $f(x) = ||x + 2| - |x - 2||$
- g) $f(x) = ||3x - 3| - |2x + 1||$

IV. EQUAÇÕES MODULARES

Lembremos da propriedade do módulo dos números reais, para $k > 0$

$$|x| = k \iff x = k \text{ ou } x = -k$$

e, utilizando essa propriedade, vamos resolver algumas equações modulares.

201. Exemplos

1º) Resolver $|2x - 1| = 3$

Então

$$|2x - 1| = 3 \iff \begin{cases} 2x - 1 = 3 \implies x = 2 \\ \text{ou} \\ 2x - 1 = -3 \implies x = -1 \end{cases}$$

$$S = \{2, -1\}$$

2º) Resolver $|3x - 1| = |2x + 3|$

Lembrando da propriedade

$$|a| = |b| \iff a = b \text{ ou } a = -b$$

temos:

$$|3x - 1| = |2x + 3| \iff \begin{cases} 3x - 1 = 2x + 3 \implies x = 4 \\ \text{ou} \\ 3x - 1 = -2x - 3 \implies x = -\frac{2}{5} \end{cases}$$

$$S = \{4, -\frac{2}{5}\}$$

3º) Resolver $|x + 1| = 3x + 2$

Devemos ter inicialmente

$$3x + 2 \geq 0 \implies x \geq -\frac{2}{3}$$

para que seja possível a igualdade.

Supondo $x \geq -\frac{2}{3}$ temos

$$|x + 1| = 3x + 2 \implies \begin{cases} x + 1 = 3x + 2 \implies x = -\frac{1}{2} \\ \text{ou} \\ x + 1 = -3x - 2 \implies x = -\frac{3}{4} \end{cases} \text{ (não convém)}$$

$$S = \{-\frac{1}{2}\}$$

EXERCÍCIOS

A.268 Resolver as seguintes equações em \mathbb{R} :

- a) $|x + 2| = 3$
- b) $|3x - 1| = 2$
- c) $|4x - 5| = 0$
- d) $|2x - 3| = -1$
- e) $|x^2 - 3x - 1| = 3$
- f) $|x^2 - \frac{5}{2}x - \frac{1}{4}| = \frac{5}{4}$
- g) $|x^2 - 4x + 5| = 2$

A.269 Resolver em \mathbb{R} as seguintes equações:

- a) $|3x + 2| = |x - 1|$
- b) $|4x - 1| - |2x + 3| = 0$
- c) $|x^2 + x - 5| = |4x - 1|$
- d) $|x^2 + 2x - 2| = |x^2 - x - 1|$

A.270 Resolver as seguintes equações em \mathbb{R} :

- a) $|x - 2| = 2x + 1$
- b) $|3x + 2| = 2x - 3$
- c) $|2x - 5| = x - 1$
- d) $|2x^2 + 15x - 3| = x^2 + 2x - 3$
- e) $|3x - 2| = 3x - 2$
- f) $|4 - 3x| = 3x - 4$

V. INEQUAÇÕES MODULARES

Lembrando das propriedades de módulo dos números reais, para $k > 0$:

- 1) $|x| < k \iff -k < x < k$
- 2) $|x| > k \iff x < -k \text{ ou } x > k$

e, utilizando essas propriedades, podemos resolver algumas inequações modulares.

202. Exemplos

1º) Resolver em \mathbb{R} : $|2x + 1| < 3$

Então:

$$|2x + 1| < 3 \implies -3 < 2x + 1 < 3 \implies -2 < x < 1$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 1\}$$

2º) Resolver em \mathbb{R} : $|4x - 3| > 5$

Então:

$$\begin{aligned} |4x - 3| > 5 &\implies (4x - 3 < -5 \text{ ou } 4x - 3 > 5) \implies \\ &\implies (x < -\frac{1}{2} \text{ ou } x > 2) \end{aligned}$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{1}{2} \text{ ou } x > 2\}.$$

EXERCÍCIOS

A.271 Resolver em \mathbb{R} as inequações abaixo:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a) $ 3x - 2 < 4$ | b) $ 2x - 3 \leq 1$ |
| c) $ 4 - 3x \leq 5$ | d) $ 3x + 4 \leq 0$ |
| e) $ 2x + 4 < -3$ | f) $ 2x - 1 > 3$ |
| g) $ 5x + 4 \geq 4$ | h) $ 2 - 3x \geq 1$ |
| i) $ 3x - 5 > 0$ | j) $ 4x - 7 \geq -1$ |
| k) $1 < x - 1 \leq 3$ | |

A.272 Resolver as inequações seguintes em \mathbb{R} :

- | | |
|---|---|
| a) $ x^2 - 5x + 5 < 1$ | b) $ x^2 - x - 4 > 2$ |
| c) $ x^2 - 5x \geq 6$ | d) $ x^2 - 3x - 4 \leq 6$ |
| e) $\left \frac{2x - 3}{3x - 1} \right > 2$ | f) $\left \frac{x + 1}{2x - 1} \right \leq 2$ |
| g) $ x - 2 > 1$ | h) $ 2x + 1 - 3 \geq 2$ |
| i) $ 2x - 1 - 4 \leq 3$ | |

A.273 Resolver em \mathbb{R} a inequação $2x - 7 + |x + 1| \geq 0$.

Solução

$$\text{Notando que } |x + 1| = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq -1 \\ -x - 1 & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

devemos então, considerar dois casos:

1º) Se $x \geq -1$, temos:

$$2x - 7 + |x + 1| \geq 0 \implies 2x - 7 + x + 1 \geq 0 \iff x \geq 2$$

A solução S_1 é

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$$

2º) Se $x < -1$ temos:

$$2x - 7 + |x + 1| \geq 0 \implies 2x - 7 - x - 1 \geq 0 \implies x \geq 8.$$

A solução S_2 é

$$S_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1\} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8\} = \emptyset$$

A solução da inequação proposta é

$$S = S_1 \cup S_2$$

e portanto

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$$

A.274 Resolver em \mathbb{R} as seguintes inequações:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| a) $ x - 1 - 3x + 7 \leq 0$ | b) $ 2x + 1 + 4 - 3x > 0$ |
| c) $ 3x - 2 + 2x - 3 \leq 0$ | d) $ x + 1 - x + 2 \geq 0$ |
| e) $ 3x - 4 + 2x + 1 < 0$ | f) $ x^2 - 4x - 3x + 6 \leq 0$ |
| g) $ x^2 - 6x + 5 + 1 < x$ | |

A.275 (MAPOFEI-76) Resolver a inequação $|x^2 - 4| < 3x$.

A.276 Resolver a inequação em \mathbb{R} $|2x - 6| - |x| \leq 4 - x$.

Solução

Notando que:

$$|2x - 6| = \begin{cases} 2x - 6 & \text{se } x \geq 3 \\ -2x + 6 & \text{se } x < 3 \end{cases} \quad \text{e} \quad |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Construímos a tabela:

	0	3	x
$ 2x - 6 =$	$-2x + 6$	$-2x + 6$	$2x - 6$
$ x =$	$-x$	x	x
$ 2x - 6 - x =$	$-x + 6$	$-3x + 6$	$x - 6$

Observemos que a função $f(x) = x^3$:

a) é uma função crescente em \mathbb{R} , isto é:

$$(\forall x_1 \in \mathbb{R}, \forall x_2 \in \mathbb{R}) (x_1 < x_2 \implies x_1^3 < x_2^3)$$

b) tem imagem $\text{Im} = \mathbb{R}$ pois, qualquer que seja o $y \in \mathbb{R}$, existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $y = x^3$, isto é, $x = \sqrt[3]{y}$.

EXERCÍCIO

A.279 Fazer o esboço dos gráficos das seguintes funções definidas em \mathbb{R} .

- a) $f(x) = x^3 + 1$
- b) $f(x) = -x^3$
- c) $f(x) = 2 - x^3$
- d) $f(x) = (x + 1)^3$
- e) $f(x) = (2 - x)^3$
- f) $f(x) = (x - 1)^3 - 1$
- g) $f(x) = 2 + (1 - x)^3$
- h) $f(x) = |x^3|$

II. FUNÇÃO RECÍPROCA

204. Definição


Uma aplicação f de \mathbb{R}^* em \mathbb{R} recebe o nome de *função recíproca* quando a cada elemento $x \in \mathbb{R}^*$ associa o elemento $\frac{1}{x}$.

Isto é: $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

Vamos inicialmente construir a tabela

x	-4	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4
$y = \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	-3	-4	4	3	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$
ponto	A	B	C	D	E	F	G	G'	F'	E'	D'	C'	B'	A'



205. Observemos que a função recíproca $y = \frac{1}{x}$:

- a) não é definida para $x = 0$;
- b) tem imagem $\text{Im} = \mathbb{R}^*$ pois, dado um número real $y \neq 0$, sempre existe um x também real tal que $y = \frac{1}{x}$;
- c) tem por gráfico uma hipérbole equilátera^(*)

(*) Isto está provado em nosso livro de Geometria Analítica desta coleção.

EXERCÍCIOS

A.280 Fazer o esboço do gráfico das funções

a) $f(x) = -\frac{1}{x}$

b) $f(x) = \frac{1}{2x}$

c) $f(x) = -\frac{1}{2x}$


d) $f(x) = \frac{1}{|x|}$

A.281 Fazer o esboço do gráfico da função $f(x) = \frac{1}{x+1}$

Solução

Vamos construir uma tabela da seguinte maneira: atribuímos valores a $x+1$, calculamos $\frac{1}{x+1}$ e finalmente calculamos x :

x	$x+1$	$y = \frac{1}{x+1}$
-4	-3	$-\frac{1}{3}$
-3	-2	$-\frac{1}{2}$
-2	-1	-1
$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-2
$-\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	-3
$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	3
$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2
0	1	1
1	2	$\frac{1}{2}$
2	3	$\frac{1}{3}$



A.282 Fazer o esboço gráfico das seguintes funções:

a) $f(x) = \frac{1}{x-1}$

b) $f(x) = \frac{1}{2-x}$

c) $f(x) = \frac{1}{|x+2|}$

A.283 Fazer o esboço gráfico da função $f(x) = \frac{x}{x-1}$


Solução

Observemos que:

$$\frac{x}{x-1} = \frac{x-1+1}{x-1} = \frac{x-1}{x-1} + \frac{1}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$$

Vamos construir a tabela da seguinte maneira: atribuímos valores a $x-1$, calculamos $1 + \frac{1}{x-1}$ e finalmente x .

x	$x-1$	$y = 1 + \frac{1}{x-1}$
-2	-3	$\frac{2}{3}$
-1	-2	$\frac{1}{2}$
0	-1	0
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1
$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	-2
$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	4
$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	3
2	1	2
3	2	$\frac{3}{2}$
4	3	$\frac{4}{3}$



EXERCÍCIOS

A.289 Sejam as funções reais f e g , definidas por $f(x) = x^2 + 4x - 5$ e $g(x) = 2x - 3$.

Pede-se:

- obter as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$
- calcular $(f \circ g)(2)$ e $(g \circ f)(2)$
- determinar os valores do domínio da função $f \circ g$ que produzem imagem 16.

Solução

a) A lei que define $f \circ g$ é obtida a partir da lei de f , trocando-se x por $g(x)$:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = [g(x)]^2 + 4[g(x)] - 5 = (2x - 3)^2 + 4(2x - 3) - 5 \\ (f \circ g)(x) &= 4x^2 - 4x - 8.\end{aligned}$$

A lei que define $g \circ f$ é obtida a partir da lei de g , trocando-se x por $f(x)$:

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = 2 \cdot f(x) - 3 = 2(x^2 + 4x - 5) - 3 \\ (g \circ f)(x) &= 2x^2 + 8x - 13\end{aligned}$$

b) Calculemos $f \circ g$ para $x = 2$

$$(f \circ g)(2) = 4 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 - 8 = 0$$

calculemos $g \circ f$ para $x = 2$

$$(g \circ f)(2) = 2 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 - 13 = 11$$

c) o problema em questão, resume-se em resolver a equação

$$(f \circ g)(x) = 16$$

ou seja

$$4x^2 - 4x - 8 = 16 \implies 4(x^2 - x - 6) = 0 \implies x = 3 \text{ ou } x = -2.$$

A.290 Sejam as funções reais f e g , definidas por $f(x) = x^2 - x - 2$ e $g(x) = 1 - 2x$.

Pede-se:

- obter as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$
- calcular $(f \circ g)(-2)$ e $(g \circ f)(-2)$
- determinar os valores do domínio da função $f \circ g$ que produzem imagem 10.

A.291 Sejam as funções reais f e g , definidas por $f(x) = x^2 - 4x + 1$ e $g(x) = x^2 - 1$.

Obter as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.

A.292 Sejam as funções reais f e g , definidas por $f(x) = 2$ e $g(x) = 3x - 1$. Obter as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.

A.293 Nas funções reais f e g , definidas por $f(x) = x^2 + 2$ e $g(x) = x - 3$, obter as leis que definem:

- $f \circ g$
- $g \circ f$
- $f \circ f$
- $g \circ g$

A.294 Considere a função em \mathbb{R} definida por $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$. Qual é a lei

que define $f(-x)$? E $f(\frac{1}{x})$? E $f(x - 1)$?

A.295 Dadas as funções reais definidas por $f(x) = 3x + 2$ e $g(x) = 2x + a$, determinar o valor de a de modo que se tenha $f \circ g = g \circ f$.

A.296 Se $f(x) = x^3$ e $g(x) = x^4$, mostre que $f \circ g = g \circ f$.

A.297 Sejam as funções $f(x) = x^2 + 2x + 3$ e $g(x) = x^2 + ax + b$. Mostre que se $f \circ g = g \circ f$ então $f = g$.

A.298 Sejam as funções definidas por $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = x^2 - 3x - 4$. Determinar os domínios das funções $f \circ g$ e $g \circ f$.

Solução

$$a) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x^2 - 3x - 4}.$$

Para que exista $(f \circ g)(x) \in \mathbb{R}$, devemos ter $x^2 - 3x - 4 \geq 0$, isto é: $x \leq -1$ ou $x \geq 4$. Então

$$D(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \text{ ou } x \geq 4\}$$

$$b) (g \circ f)(x) = g(f(x)) = [g(x)]^2 - 3 \cdot g(x) - 4 = |x| - 3\sqrt{x} - 4.$$

Para que exista $(g \circ f)(x) \in \mathbb{R}$, devemos ter $x \geq 0$. Então

$$D(g \circ f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}.$$

A.299 Sejam $f(x) = \sqrt{x - 1}$ e $g(x) = 2x^2 - 5x + 3$. Determinar os domínios das funções $f \circ g$ e $g \circ f$.

A.300 Sejam as funções $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ definida para todo x real e $x \neq 2$ e $g(x) = 2x + 3$

definida para todo x real. Pedem-se:

- o domínio e a lei que define $f \circ g$
- o domínio e a lei que define $g \circ f$.

A.301 Sejam as funções reais $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2 - 1$ e $h(x) = 3x + 2$. Obter a lei que define $(h \circ g) \circ f$.

A.302 Sejam as funções reais $f(x) = 1 - x$, $g(x) = x^2 - x + 2$ e $h(x) = 2x + 3$. Obter a lei que define $h \circ (g \circ f)$.

A.303 Sejam as funções reais $f(x) = 3x - 5$ e $(f \circ g)(x) = x^2 - 3$. Determinar a lei da função g .

Solução

Se $f(x) = 3x - 5$ então trocando-se x por $g(x)$ temos:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 3 \cdot g(x) - 5$$

mas é dado que: $(f \circ g)(x) = x^2 - 3$ então

$$3 \cdot g(x) - 5 = x^2 - 3$$

ou seja

$$g(x) = \frac{x^2 + 2}{3}.$$

219. Resumo:

Dada a função f de A em B , consideram-se as retas horizontais por $(0, y)$ com $y \in B$:

1º) se nenhuma reta corta o gráfico mais de uma vez, então f é *injetora*.

2º) se toda reta corta o gráfico, então f é *sobrejetora*.

3º) se toda reta corta o gráfico em um só ponto, então f é *bijetora*.

220. Teorema

Se duas funções f de A em B e g de B em C são sobrejetoras, então a função composta $g \circ f$ de A em C é também sobrejetora.

Demonstração

A função g é sobrejetora então, para todo z de C , existe y em B tal que $g(y) = z$ e a função f é sobrejetora, isto é, dado y em B existe x em A tal que $f(x) = y$.

Logo, para todo z em C , existe x em A tal que

$$z = g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$$

o que prova que $g \circ f$ é sobrejetora.

221. Teorema


Se duas funções f de A em B e g de B em C são injetoras, então a função composta $g \circ f$ de A em C é também injetora.

Demonstração


Consideremos x_1 e x_2 dois elementos quaisquer de A e suponhamos que $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$, isto é, $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Como g é injetora, da última igualdade resulta que $f(x_1) = f(x_2)$, como f é também injetora vem, $x_1 = x_2$; portanto $g \circ f$ é injetora.

EXERCÍCIOS

A.313 Indique qual das funções abaixo é injetora, sobrejetora ou bijetora?



A.314 Para as funções em \mathbb{R} abaixo representadas qual é injetora? E sobrejetora? E bijetora?



A.315 Nas funções seguintes classifique em

- I) injetora II) sobrejetora III) bijetora
IV) não é sobrejetora e nem injetora.

- a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x + 1$
b) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = 1 - x^2$
c) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $h(x) = |x - 1|$
d) $m: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $m(x) = 3x + 2$
e) $n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $n(x) = [x]$
f) $p: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ tal que $p(x) = \frac{1}{x}$
g) $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $q(x) = x^3$
h) $r: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $r(x) = |x| \cdot (x - 1)$

A.316 Determine o valor de b em $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq b\}$ de modo que a função f de \mathbb{R} em B definida por $f(x) = x^2 - 4x + 6$ seja sobrejetora.

A.317 Determine o maior valor de a em $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$ de modo que a função f de A em \mathbb{R} definida por $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$ seja injetora.

A.318 Nas funções seguintes classifique em

- I) injetora II) sobrejetora III) bijetora
IV) não é injetora e nem sobrejetora.

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0 \\ x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

b) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \geq 1 \\ 0 & \text{se } -1 < x < 1 \\ x + 1 & \text{se } x \leq -1 \end{cases}$$

c) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$h(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{se } x \geq 2 \\ x - 2 & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

d) $m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$m(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{se } x \leq 1 \\ x^2 - 6x + 8 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

e) $n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$n(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \text{ é par} \\ \frac{x+1}{2} & \text{se } x \text{ é ímpar} \end{cases}$$

f) $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$

$$p(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ [x] & \text{se } x \in (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \end{cases}$$

A.319 Sejam as funções: f de A em B , definida por $y = f(x)$; identidade em A , anotada por I_A , de A em A e definida por $I_A(x) = x$; identidade em B , anotada por I_B , de B em B e definida por $I_B(x) = x$. Prove:

$$f \circ I_A = f \quad \text{e} \quad I_B \circ f = f.$$

A.320 As funções I_A e I_B do exercício anterior são iguais? Justificar.

A.321 Os conjuntos A e B têm, respectivamente m e n elementos. Considera-se uma função $f: A \rightarrow B$. Qual a condição sobre m e n para que f possa ser injetora? E para f ser sobrejetora? E bijetora?

A.322 Quantas são as injeções de $A = \{a, b\}$ em $B = \{c, d, e, f\}$?

A.323 Quantas são as sobrejeções de $A = \{a, b, c\}$ em $B = \{d, e\}$?

A.324 Mostrar com um exemplo que a composta de uma injeção com uma sobrejeção pode não ser nem injetora nem sobrejetora.

V. FUNÇÃO INVERSA

222. Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{1, 3, 5, 7\}$ consideremos a função f de A em B definida por $f(x) = 2x - 1$.

Notemos que a função f é bijetora formada pelos pares ordenados

$$f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$$

onde $D(f) = A$ e $\text{Im}(f) = B$.


A relação $f^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in f\}$, inversa de f , é também uma função pois, f é uma bijeção de A em B , isto é, para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(y, x) \in f^{-1}$.

A função f^{-1} é formada pelos pares ordenados

$$f^{-1} = \{(1, 1), (3, 2), (5, 3), (7, 4)\}$$

onde

$$D(f^{-1}) = B \quad \text{e} \quad \text{Im}(f^{-1}) = A.$$



Observemos que a função f é definida pela sentença $y = 2x - 1$, e f^{-1} é

definida pela sentença $x = \frac{y+1}{2}$, isto é

1º) f leva cada elemento $x \in A$ até o $y \in B$ tal que $y = 2x - 1$

2º) f^{-1} leva cada elemento $y \in B$ até o $x \in A$ tal que $x = \frac{y+1}{2}$

223. Teorema

Seja $f: A \rightarrow B$. A relação f^{-1} é uma função de B em A se, e somente se, f é bijetora.

Demonstração

1ª Parte: se f^{-1} é uma função de B em A então f é bijetora.


a) para todo $y \in B$ existe um $x \in A$ tal que $f^{-1}(y) = x$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$, ou ainda, $(x, y) \in f$. Assim f é sobrejetora.

2º) $y = x^2$

x	y
0	0
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36

$y = \sqrt{x}$

x	y
0	0
1	1
4	2
9	3
16	4
25	5
36	6




3º) $y = x^3$

x	y
-3	-27
-2	-8
-1	-1
0	0
1	1
2	8
3	27

$y = \sqrt[3]{x}$

x	y
-27	-3
-8	-2
-1	-1
0	0
1	1
8	2
27	3



230. Teorema

Seja f uma função bijetora de A em B . Se f^{-1} é a função inversa de f então

$$f^{-1} \circ f = I_A \quad \text{e} \quad f \circ f^{-1} = I_B$$

Demonstração

$$\forall x \in A, (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$$

$$\forall y \in B, (f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y.$$

231. Teorema

Se as funções f de A em B e g de B em C são bijetoras então

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Demonstração

Observemos inicialmente: se as funções f de A em B e g de B em C , são bijetoras, então a função composta, $g \circ f$ de A em C é bijetora, logo, existe a função inversa $(g \circ f)^{-1}$ de C em A .

Queremos provar que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, então basta provar que

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = I_A \quad \text{e} \quad (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = I_C.$$

Notemos que

$$f^{-1} \circ f = I_A, \quad f \circ f^{-1} = I_B, \quad g^{-1} \circ g = I_B \quad \text{e} \quad g \circ g^{-1} = I_C.$$

Então:

$$\begin{aligned} (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= [(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ g] \circ f = [f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g)] \circ f = [f^{-1} \circ I_B] \circ f = \\ &= f^{-1} \circ f = I_A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) &= [(g \circ f) \circ f^{-1}] \circ g^{-1} = [g \circ (f \circ f^{-1})] \circ g^{-1} = [g \circ I_B] \circ g^{-1} = \\ &= g \circ g^{-1} = I_C. \end{aligned}$$

EXERCÍCIOS

A.325 Para cada função abaixo pede-se provar que é bijetora e determinar sua inversa:

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x - 5$

b) $g: \mathbb{R} - \{4\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ tal que $g(x) = \frac{x+1}{x-4}$

c) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h(x) = x^5$

A.326 Nas funções abaixo de \mathbb{R} em \mathbb{R} , obter a lei de correspondência que define a função inversa.

a) $f(x) = 2x + 3$

b) $g(x) = \frac{4x-1}{3}$

c) $h(x) = x^3 + 2$

d) $p(x) = (x-1)^3 + 2$

e) $q(x) = \sqrt[3]{x+2}$

f) $r(x) = \sqrt[3]{x-1}$

g) $s(x) = \sqrt[3]{1-x^3}$

A.327 A função f em \mathbb{R} definida por $f(x) = x^2$, admite função inversa? Justificar.

A.328 Seja a função f de \mathbb{R}_- em \mathbb{R}_+ , definida por $f(x) = x^2$. Qual é a função inversa de f ?

Solução

A função dada é $f(x) = y = x^2$ com $x \leq 0$ e $y \geq 0$.

Aplicando a regra prática, temos:

I) permutando as variáveis:

$$x = y^2 \text{ com } y \leq 0 \text{ e } x \geq 0$$

II) expressando y em função de x

$$x = y^2 \Rightarrow y = \sqrt{x} \text{ ou } y = -\sqrt{x}$$

Considerando que na função inversa f^{-1} , devemos ter $y \leq 0$ e $x \geq 0$ a lei de correspondência da função inversa será $f^{-1}(x) = -\sqrt{x}$.

Resposta: É a função f^{-1} de \mathbb{R}_+ em \mathbb{R}_- definida por $f^{-1}(x) = -\sqrt{x}$.

A.329 Obter a função inversa nas seguintes funções abaixo

a) $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$f(x) = x^2$$

b) $f: A \rightarrow \mathbb{R}_+$, onde $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\}$

$$f(x) = (x - 1)^2$$

c) $f: A \rightarrow \mathbb{R}_-$, onde $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$

$$f(x) = -(x - 2)^2$$

d) $f: A \rightarrow \mathbb{R}_-$, onde $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1\}$

$$f(x) = -(x + 1)^2$$

e) $f: \mathbb{R} \rightarrow B$, onde $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$

$$f(x) = x^2 + 1$$

f) $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow B$, onde $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 4\}$

$$f(x) = 4 - x^2$$

g) $f: \mathbb{R}_- \rightarrow B$, onde $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -1\}$

$$f(x) = x^2 - 1$$

A.330 Seja a função bijetora f , de $\mathbb{R} - \{2\}$ em $\mathbb{R} - \{1\}$ definida por $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$. Qual é a função inversa de f ?

Solução

A função dada é $f(x) = y = \frac{x+1}{x-2}$ com $x \neq 2$ e $y \neq 1$.

Aplicando a regra prática, temos:

$$x = \frac{y+1}{y-2} \Rightarrow xy - 2x = y + 1 \Rightarrow xy - y = 2x + 1 \Rightarrow y(x - 1) = 2x + 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = \frac{2x+1}{x-1}$$

Resp.: É a função f^{-1} , de $\mathbb{R} - \{1\}$ em $\mathbb{R} - \{2\}$, definida por $f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

A.331 Obter a função inversa das seguintes funções:

a) $f: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$

$$f(x) = \frac{x+3}{x-3}$$

b) $f: \mathbb{R} - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$

$$f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$$

c) $f: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-1\}$

$$f(x) = \frac{4-x}{x-3}$$

d) $f: \mathbb{R} - \{\frac{1}{3}\} \rightarrow \mathbb{R} - \{\frac{5}{3}\}$

$$f(x) = \frac{5x+2}{3x-1}$$

e) $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} - \{4\}$

$$f(x) = \frac{4x+2}{x}$$

f) $f: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{3\}$

$$f(x) = \frac{3x+2}{x-3}$$

A.332 Seja a função f de $\mathbb{R} - \{-2\}$ em $\mathbb{R} - \{4\}$ definida por $f(x) = \frac{4x-3}{x+2}$. Qual é o valor do domínio de f^{-1} com imagem 5?

Solução

Queremos determinar $a \in \mathbb{R} - \{4\}$ tal que $f^{-1}(a) = 5$, para isto, basta determinar a tal que $f(5) = a$

$$a = f(5) = \frac{4 \cdot 5 - 3}{5 + 2} = \frac{17}{7} \Rightarrow a = \frac{17}{7}.$$

A.333 Seja a função f de $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1\}$ em $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$ definida por $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2}$. Qual é o valor do domínio de f^{-1} com imagem 3?

A.334 Sejam os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 2\}$ e a função f de A em B definida por $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Obter a função inversa de f .

Solução

A função dada é $f(x) = y = x^2 - 2x + 3$ com $x \geq 1$ e $y \geq 2$.

Aplicando a regra prática temos:

I) permutando as variáveis:

$$x = y^2 - 2y + 3 \text{ com } y \geq 1 \text{ e } x \geq 2$$

II) expressando y em função de x

$$\begin{aligned} x &= y^2 - 2y + 3 \Rightarrow x = y^2 - 2y + 1 + 3 - 1 \Rightarrow x = (y - 1)^2 + 2 \Rightarrow \\ \Rightarrow (y - 1)^2 &= \sqrt{x - 2} \Rightarrow y - 1 = \sqrt{x - 2} \text{ ou } y - 1 = -\sqrt{x - 2} \Rightarrow \\ \Rightarrow y &= 1 + \sqrt{x - 2} \text{ ou } y = 1 - \sqrt{x - 2}. \end{aligned}$$

Considerando que na função inversa f^{-1} , devemos ter $y \geq 1$ e $x \geq 2$, a sentença que define a função inversa é $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 2}$

Resposta: $f^{-1}: B \rightarrow A$

$$f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 2}$$

A.335 Obter a função inversa das seguintes funções:

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -1\}$

$f: A \rightarrow B$

$f(x) = x^2 - 2x$

b) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$

$f: A \rightarrow B$

$f(x) = x^2 + 2x + 2$

c) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -1\}$

$f: A \rightarrow B$

$f(x) = x^2 - 4x + 3$

d) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{3}{2}\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -\frac{1}{4}\}$

$f: A \rightarrow B$

$f(x) = x^2 - 3x + 2$

e) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 9\}$

$f: A \rightarrow B$

$f(x) = -x^2 + 4x + 5$

f) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 5\}$

$f: A \rightarrow B$

$f(x) = -x^2 - 2x + 4$

g) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{5}{4}\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -\frac{9}{8}\}$

$f: A \rightarrow B$

$f(x) = 2x^2 - 5x + 2$

A.336 Seja a função bijetora de \mathbb{R} em \mathbb{R} definida por $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x \geq 0 \\ x - 1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$

Determinar f^{-1} .

Solução

Notemos que

1º) se $x \geq 0$ então $f(x) = y = x^2 - 1$, logo $y \geq -1$.

2º) se $x < 0$ então $f(x) = y = x - 1$, logo $y < -1$.

A função proposta é

$y = x^2 - 1$ com $x \geq 0$ e $y \geq -1$ ou $y = x - 1$ com $x < 0$ e $y < -1$.

Aplicando a regra prática:

I) permutando as variáveis, temos:

$x = y^2 - 1$ com $y \geq 0$ e $x \geq -1$ ou $x = y - 1$ com $y < 0$ e $x < -1$

II) expressando y em função de x , temos:

$y = \sqrt{x+1}$ com $y \geq 0$ e $x \geq -1$ ou $y = x+1$ com $y < 0$ e $x < -1$.

Logo, a função inversa f^{-1} é de \mathbb{R} em \mathbb{R} e definida por

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{x+1} & \text{se } x \geq -1 \\ x+1 & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

A.337 Nas seguintes funções em \mathbb{R} , determinar a função inversa.

a) $f(x) = \begin{cases} 2x+3 & \text{se } x \geq 2 \\ 3x+1 & \text{se } x < 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 5-3x & \text{se } x \geq -1 \\ 4-4x & \text{se } x < -1 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0 \\ 2x & \text{se } x < 0 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} x^3 - 2 & \text{se } x < -1 \\ 4x+1 & \text{se } x \geq -1 \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-3} & \text{se } x \geq 3 \\ (3-x)^3 & \text{se } x < 3 \end{cases}$

f) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 7 & \text{se } x \geq 2 \\ 2x - 1 & \text{se } -1 < x < 2 \\ -x^2 - 2x - 4 & \text{se } x \leq -1 \end{cases}$

A.338 A função f em \mathbb{R} definida por $f(x) = |x+2| + |x-1|$, admite função inversa?

A.339 Seja a função f em \mathbb{R} definida por $f(x) = 2x + |x+1| - |2x-4|$. Determinar a função inversa de f .


A.340 Seja a função f em \mathbb{R} definida por $f(x) = 2x - 3$. Construir num mesmo plano cartesiano os gráficos de f e f^{-1} .

Solução

$f(x) = 2x - 3$ $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$

x	y
-1	-5
0	-3
1	-1
2	1
3	3
4	5

x	y
-5	-1
-3	0
-1	1
1	2
3	3
5	4



A.341 Nas funções que seguem, construir num mesmo plano cartesiano os gráficos de f e f^{-1} .

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $f(x) = 2x + 1$

b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $f(x) = \frac{2x+4}{3}$

c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $f(x) = 1 - x^3$

d) $f: \mathbb{R}_- \rightarrow B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 1\}$
 $f(x) = 1 - x^2$

e) $f: A \rightarrow A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$
 $f(x) = x^2 + 2x$

f) $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$
 $f(x) = \frac{1}{x}$

g) $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$
 $f(x) = \frac{x-1}{x}$

h) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $f(x) = 2^x$

i) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$