

Resúmenes Análisis

1. Conjuntos.

Definición (Punto de acumulación). Un punto x en un espacio métrico M es un punto de acumulación de un conjunto $A \subset M$ si todo conjunto abierto U que contiene a x también contiene a algún punto de A distinto de x .

Teorema. *Un conjunto $A \subset M$ es cerrado \iff todos los puntos de acumulación de A pertenecen a A .*

2. Sucesiones.

Proposición. *Una sucesión $\{x_n\}$ en M converge a $x \in M \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : k \geq N \implies d(x, x_k) < \varepsilon$*

Proposición. *$\{v_n\} \rightarrow v \in \mathbb{R}^n \iff$ cada sucesión de coordenadas converge a la coordenada correspondiente de v como una sucesión en \mathbb{R}*

Proposición.

- *Un conjunto $A \subset M$ es cerrado $\iff \forall \{x_n\} \subset A$ con $\{x_n\}$ convergente, el límite es un elemento de A .*
- *Para un conjunto $B \subset M$, $x \in \bar{B} \iff$ existe una sucesión $\{x_n\} \in B$ tal que $\{x_n\} \rightarrow x$*

Demostración. Demostraremos el primero.

Sea A un conjunto cerrado y $\{x_n\} \rightarrow x$. Entonces x es un punto de acumulación de A . x es un punto de acumulación de A , pues cualquier entorno de x contiene algún punto de $\{x_n\} \subset A$. Ahora, como sabemos que A es cerrado si contiene a todos sus puntos de acumulación, A es cerrado y x es un punto de acumulación entonces $x \in A$.

De la misma forma, sea $x \in A$ un punto de acumulación de A y elegimos $\{x_n\} \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$. De esta forma, $\{x_n\} \rightarrow x$ (pues $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1/\varepsilon$ con lo que $k \geq N \implies x_k \in B(x, \varepsilon)$). Así, tenemos una sucesión de elementos de A que converge a un elemento de A , y su límite es un punto de acumulación, por tanto por el teorema anterior, A es cerrado. \square

Definición (Sucesión de Cauchy). Una sucesión de Cauchy es una sucesión $\{x_n\} \in M$ tal que $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ tal que si $p, q \geq N$ entonces $d(x_p, x_q) < \varepsilon$. M es completo \iff toda sucesión de Cauchy en M converge a un punto de M .

Proposición. Una sucesión convergente en un espacio normado o métrico está acotada.

Demostración. Sea $\{x_n\} \rightarrow x$, sabemos que $\exists N : d(x_n, x) < 1$ si $n \geq N$, así que $x_n \in B(x, 1)$ si $n \geq N$. Basta tomar $R = \max\{1, d(x_1, x), \dots, d(x_{N-1}, x)\}$ y así $d(x, x_n) \leq R \forall n$ por lo que $x_n \in B(x, R) \forall n$ y así está acotada. \square

Teorema (Teorema de Bolzano Weierstrass). Sea $\{x_n\}$ una sucesión de \mathbb{R}^N acotada. Entonces existe una sucesión parcial suya $\{x_{\sigma(n)}\}$ convergente.

Demostración. Notaremos $x_n = (x_n^1, \dots, x_n^N)$. Como $\{x_n^1\}$ es acotada en \mathbb{R} , existe $\sigma_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente tal que $\{x_{\sigma_1(n)}^1\}$ es convergente.

Ahora, como $\{x_n^2\}$ es acotada, $\{x_{\sigma_1(n)}^2\}$ también es acotada, y existe $\sigma_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente tal que $\{x_{(\sigma_2 \circ \sigma_1)(n)}^1\}$ es convergente.

Procediendo de esta forma con cada componente de x_n , obtenemos $\sigma_1, \dots, \sigma_N$, y $\{x_{\sigma_1(n)}^1\}, \{x_{(\sigma_2 \circ \sigma_1)(n)}^2\}, \dots, \{x_{(\sigma_N \circ \dots \circ \sigma_2 \circ \sigma_1)(n)}^N\}$ sucesiones convergentes en \mathbb{R} . Al ser σ_i estrictamente creciente $\forall i = 1, \dots, N$, $\{x_{(\sigma_N(n) \circ \dots \circ \sigma_{i+1} \circ \sigma_i \circ \dots \circ \sigma_1)(n)}^i\}$ también es convergente (toda sucesión parcial de una sucesión convergente es convergente).

Así, tomando $\sigma = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_N$, $\{x_{\sigma(n)}\}$ es convergente. \square

Proposición.

- (i) Toda sucesión convergente en un espacio métrico es una sucesión de Cauchy.
- (ii) Una sucesión de Cauchy en un espacio métrico debe estar acotada.
- (iii) Si una subsucesión de una sucesión de Cauchy converge a x , entonces la sucesión converge a x .

Teorema (\mathbb{R}^n es completo). Una sucesión $x_n \in \mathbb{R}^n$ converge a un punto de $\mathbb{R}^n \iff$ es una sucesión de Cauchy

Demostración.

\Leftarrow

Dado $\varepsilon > 0$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq m$ entonces $d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}$, y si $p, q \geq m$ entonces $d(x_p, x_q) \leq d(x_p, x) + d(x, x_q) < \varepsilon$

\Rightarrow

Como $\{x_n\}$ es de Cauchy, $\{x_n^i\}$ es de Cauchy $\forall i = 1, \dots, N$ (porque $|x_n^i - x_m^i| \leq |x_n - x_m|$).
 $\Rightarrow \{x_n^i\} \rightarrow x^i$ es convergente, por ser \mathbb{R} completo. Luego $\{x_n\}$ es convergente.

□

3. Conjuntos compactos y conexos.

Definición (Compacto). Un subconjunto A de un espacio métrico M es compacto si todo recubrimiento abierto de A contiene un subrecubrimiento finito.

Definición (Otra definición de compacto.). Sea $A \subset X$ con X espacio métrico.

A es compacto $\iff \forall \{x_n\} \subset A \exists \{x_{\sigma(n)}\}$ parcial de $\{x_n\}$ con $\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow x \in A$

Teorema (Teorema de Heine-Borel). Un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ es compacto \iff es cerrado y acotado.

Demostración.

\Rightarrow

Suponemos que $A \subset \mathbb{R}^n$ es compacto. Entonces, por su definición, $\forall \{x_n\} \subset A \exists \{x_{\sigma(n)}\}$ parcial de $\{x_n\}$ con $\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow x \in A$. Supongamos que A no está acotado. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N}, \exists a_n \in A : |a_n| \geq n$, por lo que $\{a_n\}$ no converge y por tanto $\sigma(n) \geq n \implies \{a_{\sigma(n)}\}$ no converge, por lo que A está acotado.

Supongamos ahora que $\{x_n\} \rightarrow x \implies \exists \{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow x \in A$, y como sabemos que si una sucesión es convergente todas sus parciales convergen al mismo límite, entonces eso implica que $\{x_n\} \rightarrow x \in A$ por lo que toda sucesión converge a un punto de A , y así A es cerrado.

\Leftarrow

Supongamos ahora que A es cerrado y acotado. Sea $\{x_n\}$ una sucesión cualquiera de puntos de A .

Como A es acotado, entonces $\exists R > 0 : A \subset B(0, R)$. Además, como $\{x_n\} \subset A \forall n \implies |x_n| < R \forall n \in \mathbb{N}$, así $\{x_n\}$ es acotada.

Como $\{x_n\}$ es acotada, por el teorema de Bolzano Weierstrass, $\exists \sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente con $\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow x \in \mathbb{R}^n$, y como $\{x_{\sigma(n)}\}$ es una subsucesión de puntos de A que converge a x y el conjunto A es cerrado, entonces el límite de esta sucesión está en A , es

decir:

$$\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow x \in A$$

Por lo que tenemos la definición de conjunto compacto.

□

Definición (Función continua). Una aplicación $f : A \rightarrow M$ es continua si $\{x_n\} \rightarrow x \implies \{f(x_n)\} \rightarrow f(x)$ para toda sucesión x_n convergente a un punto de A con $x_n \in A$

Proposición (Caracterización de continuidad). Sea $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}^N$, y $f : A \rightarrow \mathbb{R}^M$. Entonces:

$$f \text{ es continua en } a \iff \forall \{x_n\} \subseteq A \text{ con } \{x_n\} \rightarrow a \Rightarrow \{f(x_n)\} \rightarrow f(a).$$

Definición (Conjunto convexo). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^N$ se dice *convexo* si $\forall x, y \in A$ se tiene que el segmento de extremos x e y está incluido en A . En otras palabras:

$$A \text{ convexo} \iff [x, y] = \{tx + (1-t)y : t \in [0, 1]\} \subseteq A.$$

Definición (Poligonalmente conexo). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^N$ se dice *poligonalmente conexo* si $\forall x, y \in A$ existe una poligonal que los une y no se sale de A . En otras palabras:
 $A \text{ poligonalmente conexo} \iff \exists \{x = a_0, a_1, \dots, a_k = y\} \subseteq A$ tal que:

$$\bigcup_{i=1}^k [a_{i-1}, a_i] \subseteq A.$$

Definición (Conjunto arco-conexo). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^N$ se dice *arco-conexo* (conexo por arcos) si $\forall x, y \in A$ existe un camino incluido en A que los une. En otras palabras,
 $A \text{ es conexo por arcos} \iff \exists \varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$ continua verificando:

$$\varphi(a) = x; \quad \varphi(b) = y; \quad \varphi([a, b]) \subseteq A.$$

Definición (Conjunto no conexo). Decimos que un conjunto $A \in \mathbb{R}^N$ es *NO conexo* si existen U, V abiertos en \mathbb{R}^N tales que:

$$U \cap A \neq \emptyset; \quad V \cap A \neq \emptyset; \quad A \subseteq U \cup V; \quad A \cap U \cap V = \emptyset.$$

Nota. La misma definición se aplica para un espacio topológico (X, τ) .

Definición (Conjunto conexo). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^N$ se dice *conexo* si no es no conexo. Equivalentemente, $\forall U, V$ abiertos en \mathbb{R}^N tales que $U \cap A \neq \emptyset, V \cap A \neq \emptyset, A \subseteq U \cup V$, se tiene que forzosamente $A \cap U \cap V \neq \emptyset$.

Teorema. Los conjuntos conexos por arcos en \mathbb{R} son convexos.

Demostración. Sean x, y dos puntos de A . Suponemos $x \leq y$ (si fuera al revés, cambiamos los nombres).

Como A es arco conexo $\implies \exists \varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $\varphi(a) = x$, $\varphi(b) = y$ y $\varphi([a, b])$ es un intervalo por el teorema del valor intermedio en \mathbb{R} .

Ahora, $\forall \alpha, \beta \in \varphi([a, b])$ con $\alpha \leq \beta \implies [\alpha, \beta] \subseteq \varphi([a, b])$ y así tenemos $\varphi(a), \varphi(b) \in \varphi([a, b]) \implies [\varphi(a), \varphi(b)] = [x, y] \subseteq \varphi([a, b]) \subseteq A$ \square

4. Funciones continuas

Definición (Límite). Supongamos que x_0 es un punto de acumulación de A . Decimos que $b \in \mathbb{R}$ es el límite de f en x_0 , denotado por:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$$

Si $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que $\forall x \in A$ que sea distinto de x_0 y $d(x, x_0) < \delta$, entonces $d(f(x), b) < \varepsilon$

Definición (Función continua). Una función $f : A \rightarrow B$ es continua en un punto x_0 de su dominio $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in A$ que cumpla que $d(x, x_0) < \delta \implies d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$

Teorema. Sea $f : A \rightarrow B$ continua y $K \subset A$ conexo. Entonces, $f(K)$ es conexo. Análogamente, si K es arco-conexo, entonces, $f(K)$ es arco-conexo.

Teorema (Teorema de Weierstrass). Sea $f : A \rightarrow B$ continua y $K \subset A$ un compacto. Entonces, $f(K)$ es compacto.

Demostración. Sea $\{x_n\} \subseteq K$ cualquiera. Entonces $\{f(x_n)\} \subseteq f(K)$. Como K es compacto, existe $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente tal que $\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow a \in K$. Luego, $\{f(x_{\sigma(n)})\} \rightarrow f(a) \in f(K)$ y queda probado que $f(K)$ es compacto.

Nota. Para toda sucesión $\{y_n\}$ de puntos de $f(K)$, podemos tomar una sucesión $\{x_n\} \subset K$ tal que $f(x_n) = y_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, pues f es sobreyectiva en su imagen.

\square

Teorema. Sean M, N, P espacios métricos y supongamos que $f : A \subset M \rightarrow N$ y $g : B \subset N \rightarrow P$ son transformaciones continuas tales que $f(A) \subset B$. Entonces, $g \circ f : A \subset M \rightarrow P$ es continua.

Teorema (Teorema del máximo-mínimo). Sea (M, d) un espacio métrico, $A \subset M$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Sea $K \subset A$ un conjunto compacto. Entonces f está

acotada en K , es decir: $B = \{f(x) : x \in K\} \subset \mathbb{R}$ es un conjunto acotado. Además, existen puntos $x_0, x_1 \in K$ tales que $f(x_0) = \inf(B)$ y $f(x_1) = \sup(B)$. Decimos que $\sup(B)$ es el máximo de f en K e $\inf(B)$ el mínimo de f en K .

Teorema (Teorema de los valores intermedios). Sean M un espacio métrico, $A \subset M$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Supongamos que $K \subset A$ es conexo y que $x, y \in K$. Para cada número $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) < c < f(y)$ existe un punto $z \in K : f(z) = c$

4.1. Continuidad uniforme

Definición (Uniformemente continua). Sean (M, d) y (N, p) espacios métricos, $A \subset M$, $f : A \rightarrow N$ y $B \subset A$. Decimos que f es uniformemente continua en el conjunto B si $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x, y \in B \text{ y } d(x, y) < \delta \implies p(f(x), f(y)) < \varepsilon$

Teorema (Teorema de la continuidad uniforme. Teorema de Heine-Cantor.). Sean $f : A \rightarrow N$ continua y $K \subset A$ un compacto. Entonces, f es uniformemente continua en K .

Demostración. La condición para la continuidad uniforme es la siguiente:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in A : d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Vamos a proceder por reducción al absurdo, para lo cual negamos esta condición:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x, y \in A : d(x, y) < \delta \wedge d(f(x), f(y)) \geq \varepsilon_0$$

Tomamos este ε_0 , lo que nos da, para cada $\delta > 0$, un par de puntos x e y que cumplen la propiedad expresada arriba. Tomamos $\delta = \frac{1}{n} \forall n \in \mathbb{N}$. Esto nos da dos sucesiones $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ tales que

$$d(x_n, y_n) < \frac{1}{n} \wedge d(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0$$

Por ser A compacto, el teorema de Bolzano-Weierstrass nos da dos sucesiones parciales $\{x_{n_k}\}$ a x_0 e $\{y_{n_k}\}$ a y_0 . Por tanto:

$$d(x_{n_k}, y_{n_k}) < \frac{1}{n_k} \wedge d(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \geq \varepsilon_0$$

Sin embargo, $\{x_{n_k}\}$ e $\{y_{n_k}\}$ convergen al mismo punto (por converger su distancia a cero), y como f es continua, esta proposición no puede ser verdadera. Hemos llegado por tanto a una contradicción, luego f debe ser uniformemente continua. \square

5. Transformaciones diferenciables

Definición (Diferenciable). Una transformación $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $x_0 \in A$ si existe una transformación lineal, denotada $Df(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ llamada diferencial de f en x_0 tal que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x) - f(x_0) - Df(x_0)(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} = 0$$

Donde $Df(x_0)(x - x_0)$ es el valor de la aplicación lineal aplicada al vector $(x - x_0)$.

Equivalentemente, podemos decir que $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que si $x \in A$ y $\|x - x_0\| < \delta$ entonces:

$$\|f(x) - f(x_0) - Df(x_0)(x - x_0)\| \leq \varepsilon \|x - x_0\|$$

Teorema (Matriz jacobiana de f). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en A . Entonces, las derivadas parciales $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ existen y la matriz de la transformación lineal $Df(x)$ con respecto de las bases canónicas en \mathbb{R}^n y \mathbb{R}^m es:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

donde cada derivada parcial se evalúa en $x = (x_1, \dots, x_n)$. Esta matriz es la matriz jacobiana de f .

Definición (Gradiente (caso $f : A \rightarrow \mathbb{R}$)). En el caso de que $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, entonces $Df(x)$ es una matriz $1 \times n$. El vector cuyas componentes son iguales a las de $Df(x)$ se denomina gradiente de f y se denota ∇f .

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

Teorema. Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si $f = (f_1, \dots, f_m)$ y cada $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ existe y es continua en A , entonces f es diferenciable en A .

Definición (Derivada direccional). Las derivadas parciales de una función miden su variación en las direcciones paralelas a los ejes. Las derivadas direccionales hacen lo mismo en otras direcciones.

Sea f una función escalar definida en un entorno de $x_0 \in \mathbb{R}^n$ y sea $e \in \mathbb{R}^n$ un vector unitario, entonces:

$$\frac{d}{dt} f(x_0 + te)|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te) - f(x_0)}{t}$$

es la derivada direccional de f en x_0 en la dirección e .

Se puede afirmar que la derivada direccional en la dirección de e es igual a $Df(x_0)(e)$. Se suele notar $D_e f(x)$.

Proposición (Regla de la cadena). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en $x_0 \in A$. Sean $B \subset \mathbb{R}^m$ abierto y $f(A) \subset B$ y $g : B \rightarrow \mathbb{R}^p$ diferenciable en $f(x_0)$. Entonces, la composición $g \circ f$ es diferenciable en x_0 y

$$D(g \circ f)(x_0) = Dg(f(x_0)) \circ Df(x_0)$$

Teorema (Teorema del valor medio).

- (i) Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en un abierto A . $\forall a, b \in A$ tales que el segmento de recta que une a con b esté en A , existe un punto c en ese segmento tal que:

$$f(b) - f(a) = Df(c)(b - a)$$

- (ii) Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en el conjunto abierto A . Supongamos que el segmento de recta que une x e y está contenido en A y $f = (f_1, \dots, f_m)$. Entonces, existen puntos c_1, \dots, c_m en ese segmento tales que:

$$f_i(y) - f_i(x) = Df_i(c_i)(y - x) \quad i = 1, \dots, m$$

Demostración. Lo vamos a hacer para una función $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y lo aplicamos luego a cada coordenada de f .

Consideremos la función $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(t) = f((1-t)a + tb) \quad \forall t \in [0, 1]$ es continua en $[0, 1]$ y por la regla de la cadena es derivable en $]0, 1[$ con:

$$h'(t) = Df((1-t)a + tb)(b - a)$$

. El TVM para funciones de \mathbb{R} en \mathbb{R} nos da un $t_0 \in]0, 1[$ tal que:

$$f(b) - f(a) = h(1) - h(0) = h'(t_0) = Df((1-t_0)a + t_0b)(b - a)$$

Si tomamos $c = (1-t_0)a + t_0b \in [a, b]$ obtenemos el c que buscábamos.

□

Teorema (Matriz Hessiana). Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces diferenciable en el conjunto abierto A . Entonces, la matriz $D^2f(x) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en la base canónica está dada por:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{pmatrix}$$

donde cada derivada parcial está evaluada en el punto $x = (x_1, \dots, x_n)$

Proposición. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es dos veces diferenciable en el conjunto abierto A con D^2f continua, entonces D^2f es simétrica, es decir:

$$\frac{\partial^2 f_k}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_j \partial x_i}$$

Teorema (Teorema de Taylor. Caso $n=1$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $a \in A$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $f \in \mathcal{C}^2(A)$. Entonces, $\forall x \in A \exists c$ comprendido entre x y a tal que:

$$f(x) = f(a) + \frac{Df(a)(x-a)}{1!} + \frac{(x-a)^t Hf(c)(x-a)}{2!}$$

Donde $(x-a)$ es un vector columna.

6. Máximos y mínimos

Definición. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ donde A es abierto. Si existe un entorno de $x_0 \in A$ en el que $f(x_0)$ es máximo, es decir si $f(x_0) \geq f(x) \forall x$ en el entorno, entonces x_0 es un punto de máximo local y $f(x_0)$ es un máximo local de f . Análogamente se define un mínimo local de f . Un punto es extremo si es un máximo o un mínimo local de f . Un punto x_0 es un punto crítico si f es diferenciable en ese punto y $Df(x_0) = 0$.

Teorema.

- (i) Si $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función \mathcal{C}^2 definida en un abierto A y x_0 es un punto crítico de f tal que $H_{x_0}(f)$ es definida negativa, entonces f tiene un máximo local en x_0 .
- (ii) Si f tiene un máximo local en x_0 , entonces $H_{x_0}(f)$ es semidefinida negativa.

Para el caso del mínimo, reemplazamos negativa por positiva. La matriz hessiana, es la vista anteriormente.

7. Clasificación de matrices según su signo

Si A_k es el determinante del menor de orden K de una matriz A , entonces:

- A es definida positiva $\iff A_k > 0 \forall k$
- A es definida negativa $\iff A_k > 0$ si K es par y $A_k < 0$ si K es impar.