

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Modelos Matemáticos I

Doble Grado de Informática y Matemáticas

Curso 2016/17

1. Relación 1

1.1. Ejercicio 2

Sea la ecuación:

$$x_{n+1} = 1/3x_n + 2^n$$

Hallar una solución del tipo $x_n = c2^n$.

Lo primero es ver que esta ecuación es una ecuación en diferencias de primer orden lineal no homogénea. Vamos a hallar el c que nos piden. Entonces:

$$c2^{n+1} = \frac{1}{3}c2^n + 2^n \implies 2^n[2c - c\frac{1}{3} - 1] = 0$$

$$2c - \frac{1}{3}c - 1 = 0 \implies c = \frac{3}{5}$$

Por tanto, la solución es: $x'_n = \frac{3}{5}2^n$, pero esta es una solución particular.

Ahora, probaremos que x_n es solución de la ecuación inicial $\iff z_n = x_n - x'_n$ donde x'_n es una solución particular, es solución de: $z_{n+1} = \frac{1}{3}z_n$.

Lo probamos: Que x_n es solución de la inicial implica que $x_{n+1} = \frac{1}{3}x_n + 2^n$. Que x'_n es solución de la inicial implica que $x'_{n+1} = \frac{1}{3}x'_n 2^n$.

Si restamos estas dos obtenemos que:

$$x_{n+1} - x'_{n+1} = \frac{1}{3}(x_n - x'_n)$$

Lo que implica que $z_{n+1} = x_{n+1} - x'_{n+1}$ y $z_n = (x_n - x'_n)$

Ahora, continuamos la resolución del ejercicio:

1. Encontrar una solución particular de la ecuación inicial, $x'_n = \frac{3}{5}2^n$

2. Resolvemos la ecuación homogénea asociada

$$z_{n+1} = \frac{1}{3}z_n \implies z_n = K\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

3. Usando el resultado:

$$x_n = x'_n + z_n = \frac{3}{5}2^n + K\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

4. Aplicamos la condición inicial $x_0 = 1$.

Así, la solución es $x_n = \frac{3}{5}2^n + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ con $n \geq 0$

1.2. Ejercicio 4

Llamaremos primero x_n el número de clientes de $Paga^+$ en el año n . Llamaremos y_n el número de clientes de $Paga^-$ en el año n . Ahora, tenemos que:

$$\left. \begin{aligned} x_{n+1} &= 0,5x_n + 0,25y_n \\ y_{n+1} &= 0,75y_n + 0,5x_n \end{aligned} \right\}$$

Sabemos que $x_n + y_n = 1$, que es el 100 % de los clientes. Podemos despejar así una en función de la otra y nos queda:

$$x_{n+1} = 0,5x_n + 0,25(1 - x_n)$$

Esta es una ecuación en diferencias de primer orden lineal no homogénea. Despejando, tenemos:

$$x_{n+1} = 0,25x_n + 0,25 \implies x_n = x^* + z_n \implies x_n = \frac{0,25}{1 - 0,25} + K(0,25)^n$$

Ahora, tenemos que tomar el límite pues nos piden el mercado a largo plazo. Esto es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{0,25}{0,75} = \frac{1}{3}$$

Podemos afirmar ahora que, asintóticamente, $\frac{1}{3}$ de los clientes estarán en $Paga^+$ y $\frac{2}{3}$ en $Paga^-$

1.3. Ejercicio 6

Vamos a llamar A_n al número de empleados en el departamento A en el año n . Del mismo modo, llamaremos B_n a los del departamento B en el año n . Si $0 \leq p \leq 1$ y $0 \leq q \leq 1$, tenemos que:

$$\left. \begin{aligned} A_{n+1} &= (1 - p)A_n + qB_n \\ B_{n+1} &= pA_n + (1 - q)B_n \end{aligned} \right\}$$

Y tenemos ahora que $A_n + B_n = M$, (aunque se podría tomar como 1) por lo que el sistema lo reducimos a una ecuación teniendo:

$$A_{n+1} = (1 - p)A_n + q(M - A_n) \implies A_{n+1} = (1 - p - q)A_n + qM$$

Teniendo de nuevo una ecuación en diferencias de primer orden lineal no homogénea. Así, su solución es:

$$A_n = \frac{qM}{1 - (1 - p - q)} + K(1 - p - q)^n$$

Estudiamos primero la solución constante.

$$A_* = \frac{qM}{1 - (1 - p - q)} = \frac{qM}{p + q}$$

Impondremos que $p + q \neq 0$, al menos 1 trabajador cambiará de departamento. Nuestro término general es:

$$A_n = \frac{qM}{p+q} + K(1-p-q)^n$$

Estudiaremos esto a largo plazo. Tenemos que $-1 \leq 1-p-q < 1$. Tenemos que $|1-p-q| < 1$, por lo que:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{qM}{p+q} = M \frac{q}{p+q} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (M - A_n) = M - M \frac{q}{p+q} = \frac{p}{p+q} M \end{cases}$$

1.4. Ejercicio 8

1. X_n es el número de árboles en el año n .

$$x_{n+1} = 0,9x_n + K$$

Esto tiende a la solución constante $x_* = \frac{K}{0,1}$

2. MACHASGASANALASTAMAGA