

1.

$$a) AB - BA = \frac{d}{dx} - x \frac{d^2}{dx^2} \quad b) AB - BA = \frac{d^2}{dx^2} + 1 - x \frac{d}{dx} - x^2 - \frac{d^2}{dx^2} + 1 - x \frac{d}{dx} + x^2 = 2 - 2x \frac{d}{dx}$$

$$c) AB - BA = 1 - 1 = 0 \quad d) \frac{d^3}{dx^3} + 2 - x \frac{d}{dx} - x^3 - \frac{d^3}{dx^3} + 1 - x^2 \frac{d}{dx} + x^3 = 3 - x \frac{d}{dx} - x^2 \frac{d}{dx}$$

2.

به نقل از کتاب زتیلی، سرعت گروه سرعتی است که کل ذره با آن سرعت حرکت می‌کند و سرعت فاز سرعتی است که اگر موج‌های درون wavepacket ذره را به صورت مستقل نگاه کنیم، در درون ذره (یعنی مکان‌هایی که حد احتمال آن بیش‌تر است) با این سرعت حرکت می‌کنند و بسته به گذرایی محیط دارند، پس سرعتی که الکترون در اصل دارد حرکت می‌کند همان سرعت گروه‌ش است، اما موج‌های درون الکترون با سرعت فاز حرکت می‌کنند که تغییرات فاز موج الکترون را با این سرعت تغییر می‌دهند.

3.

$$3) a) 1 = \langle \psi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle \psi | x \rangle \langle x | \psi \rangle dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx = A^2 (\pi \Delta^2)^{\frac{1}{2}} = 1$$

$$\Rightarrow \text{Normalized: } \psi(x) = \frac{1}{(\pi \Delta^2)^{\frac{1}{4}}} e^{-(x-a)^2/\Delta^2}$$

$$3) b) P(x) dx = |\psi(x)|^2 dx = \frac{1}{\sqrt{\pi \Delta^2}} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx$$

$$3) c) \langle x \rangle = \langle \psi | x | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle \psi | x \rangle \langle x | x | \psi \rangle dx$$

Knowing that $\langle x | x | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle x | x | x' \rangle \langle x' | \psi \rangle dx'$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x \delta(x-x') \psi(x') dx' = x \psi(x),$$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) x \psi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi \Delta^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} x dx$$

ادامه‌ی قسمت C در صفحه‌ی بعد:

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

Change of Variable from $y = x - a$ and $dy = dx$,

$$\langle X \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi D^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} (y+a) e^{-y^2/D^2} dy = a$$

$$\Delta x = [\langle \psi | x^2 - \langle x \rangle^2 | \psi \rangle]^{1/2} = [\langle \psi | x^2 - 2x\langle x \rangle + \langle x \rangle^2 | \psi \rangle]^{1/2}$$

$$= [\langle \psi | x^2 - \langle x \rangle^2 | \psi \rangle]^{1/2} \quad (\text{Since } \langle \psi | x | \psi \rangle = \langle x \rangle)$$

$$= [\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2]^{1/2} = [\langle x^2 \rangle - a^2]^{1/2}$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{(\pi D^2)^{1/2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-a)^2/D^2} \cdot x^2 \cdot e^{-(x-a)^2/D^2} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi D^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/D^2} (y^2 + 2ya + a^2) dy = \frac{D^2}{2} + a^2$$

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{D}{\sqrt{2}}$$

قسمت د-۱ در صفحه‌ی بعد:

Subject:

Year:

Month:

Date:

$$D-1) \langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) dx$$

Putting this into the definition of F.T

$$\Rightarrow \langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iqx} \tilde{\psi}^*(q) dq \right) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} \tilde{\psi}(k) dk \right) dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iqx} \tilde{\psi}^*(q) dq \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} e^{ikx} \tilde{\psi}(k) dk \right) dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\psi}^*(q) \tilde{\psi}(k) e^{-iqx} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} e^{ikx} dx dq dk$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\psi}^*(q) \tilde{\psi}(k) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iqx} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} e^{ikx} dx \right) dq dk$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\psi}^*(q) \tilde{\psi}(k) \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iqx} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} e^{ikx} dx \right)}_{= 2\pi \delta(k-q) \hbar k} dq dk$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\psi}^*(q) \tilde{\psi}(k) \hbar k \delta(k-q) dq dk$$

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\psi}^*(k) \hbar k \tilde{\psi}(k) dk = \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{\psi}(k)|^2 \hbar k dk$$

$$\langle \hat{p}^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi^*(x) \left(-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi(x)$$

$$= -\hbar^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi^*(x) \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x)$$

$$= \hbar^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{iqx} \tilde{\psi}^*(q) \right) \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ikx} \tilde{\psi}(k) \right)$$

$$= \frac{\hbar^2}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left(\int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-iqx} \tilde{\psi}^*(q) \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} dk \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} e^{ikx} \right) \tilde{\psi}(k) \right)$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left(\int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-iqx} \tilde{\psi}^*(q) \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} dk (-k^2) e^{ikx} \tilde{\psi}(k) \right)$$

$$= \hbar^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dq \tilde{\psi}^*(q) \int_{-\infty}^{+\infty} dk k^2 \tilde{\psi}(k) \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{i(k-q)x}}_{= \delta(k-q)}$$

$$\langle \hat{p}^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dk |\tilde{\psi}(k)|^2 (\hbar k)^2$$

Taylor expansion $\approx \langle \hat{p} \rangle \psi(x) + \frac{\hat{p}^2}{2!} \psi'(x) + \dots$

$\approx \psi(x) + \frac{\langle \hat{p}^2 \rangle}{2!} \psi'(x) + \dots$

Using our Previous Results:

$$\langle \hat{p} \psi \rangle = \psi(x) \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{\psi}(k)|^2 k dk + \frac{1}{2!} \psi'(x) \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{\psi}(k)|^2 (k^2) dk + \dots$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{\psi}(k)|^2 \left(\psi(x) + k \psi'(x) + \frac{(k^2)}{2!} \psi''(x) + \dots \right) dk$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{\psi}(k)|^2 \psi(x) dk$$

قسمت د-۲:

D-2) $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi D^2}} e^{-(x-a)^2/2D^2}$

$$\tilde{\psi}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} \frac{1}{\sqrt[4]{\pi D^2}} e^{-(x-a)^2/2D^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt[4]{\pi D^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} e^{-(x-a)^2/2D^2} dx$$

Subject: _____ Year: _____ Month: _____ Date: _____

First, we consider $a = 0$ and $\Delta = 1$ for integration. Calculating $\hat{F}_0(\tilde{e}^{ikx})$

$$\frac{d}{dk} \hat{F}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} (ikx) e^{-ikx} dx e^{-\frac{k^2}{2}} = \frac{i}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{d}{dx} e^{-x^2} \right) e^{-ikx} dx$$

Integrating by Parts we have: $\frac{d}{dk} \hat{F}(k) = -\frac{i}{2} k \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{-ikx} dx = -\frac{i}{2} k \hat{F}(k)$

$$\frac{d}{dk} \hat{F}(k) = -\frac{i}{2} k \hat{F}(k) \Rightarrow \hat{F}(k) = C_0 \cdot e^{-\frac{k^2}{4}} \quad C_0 = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) dx = \sqrt{\pi} = \hat{F}(0)$$

$$\hat{F}(\tilde{x}-a) = e^{-ika} \hat{F}(k)$$

Using these two Properties of the \hat{F} ,

$$\hat{F}(k) = \frac{1}{|b|} \hat{F}\left(\frac{k}{b}\right) \quad \hat{F}(k) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{k^2}{4}} \quad \hat{F}(\tilde{x}-a) = \sqrt{\pi} e^{-ika} e^{-\frac{k^2}{4}}$$

$$\hat{F}\left(\frac{\tilde{x}-a}{\sqrt{2}\Delta}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}\Delta} \sqrt{\pi} e^{-\frac{iKa}{\sqrt{2}\Delta}} e^{-\frac{K^2}{8\Delta^2}} = \text{Circled expression}$$

Returning the coefficients, we have:

$$\tilde{\varphi}(k) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi^2\Delta^2} \sqrt{2}\Delta} e^{-\frac{iKa}{\sqrt{2}\Delta}} e^{-\frac{K^2}{8\Delta^2}}$$

$$|\tilde{\varphi}(k)|^2 = |\tilde{\varphi}(k)| \times \tilde{\varphi}(k) = \frac{1}{24\Delta^2\sqrt{2}\Delta^2} e^{-\frac{iKa}{\sqrt{2}\Delta}} e^{-\frac{K^2}{8\Delta^2}} e^{\frac{iKa}{\sqrt{2}\Delta}} e^{-\frac{K^2}{8\Delta^2}}$$

$$= \frac{1}{24\Delta^2\sqrt{2}\Delta^2} e^{-\frac{K^2}{4\Delta^2}}$$

$$\hat{Z}_{\Delta} = \frac{1}{24\Delta^2\sqrt{2}\Delta^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{K^2}{4\Delta^2}} K K dK = -\frac{K}{2\sqrt{2}\Delta^2} e^{-\frac{K^2}{4\Delta^2}}$$

$$= \frac{K}{2\sqrt{2}\Delta^2} e^{-\frac{K^2}{4\Delta^2}} = \frac{-K}{2\sqrt{2}\Delta^2}$$

ادامه‌ی د-۲ و ه:

$DP = (\langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2)^{1/2}$ (Same way we did for X)

$\langle P^2 \rangle = \frac{1}{4\pi\Delta^2\sqrt{\pi\Delta^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{-k^2}{4\Delta^2}} k^2 dk$ (Same with $a = \pi$) \Rightarrow

$= \frac{k^2}{4\Delta^2\sqrt{\pi\Delta^2}} \times \frac{4\Delta^2\sqrt{\pi\Delta^2}}{2} = k^2$

$(\langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2)^{1/2} = \left(\frac{k^2}{1} - \frac{k^2}{4\pi\Delta^2} \right)^{1/2} = k \sqrt{1 - \frac{1}{4\pi\Delta^2}}$

$DP = \frac{\Delta}{\sqrt{2}} \times k \sqrt{1 - \frac{1}{4\pi\Delta^2}} \neq \frac{k}{2}$

باید به سانس عدم قطعیت در سیدیم، احتمالاً در حساب من استمخ داده است غیره نام

آن را باید

ه) اگر مع حقیر باشد، در اشکل $\langle \hat{Q} \rangle$ یک نام کار داده که یک سمرز است، بینه سمر

اشکل زوج مستند \Rightarrow اشکل صفر باشد از اینها (هه، ده، -)

قسمت و:

$$\begin{aligned}
 \text{In the } x \text{ Basis, } \langle p \rangle &= \int dx \psi^*(x) (-i\hbar \frac{d}{dx}) \psi(x) \\
 &\Rightarrow -i\hbar \int dx \psi^*(x) e^{-\frac{i p_0 x}{\hbar}} \frac{d}{dx} \psi(x) e^{\frac{i p_0 x}{\hbar}} \\
 &= -i\hbar \int dx \psi^*(x) e^{-\frac{i p_0 x}{\hbar}} \left[+\frac{i p_0}{\hbar} \psi(x) e^{\frac{i p_0 x}{\hbar}} + e^{\frac{i p_0 x}{\hbar}} \frac{d}{dx} \psi(x) \right] \\
 &= -i\hbar \left[\int dx \left(\frac{i p_0}{\hbar} e^{-\frac{i p_0 x}{\hbar}} \psi^*(x) e^{\frac{i p_0 x}{\hbar}} \psi(x) \right) + \right. \\
 &\quad \left. \int dx \left(\psi^*(x) e^{-\frac{i p_0 x}{\hbar}} e^{\frac{i p_0 x}{\hbar}} \frac{d}{dx} \psi(x) \right) \right] \\
 &= \underbrace{p_0 \int dx \psi^*(x) \psi(x)}_{= 1} - \underbrace{i\hbar \int dx \psi^*(x) \frac{d}{dx} \psi(x)}_{\langle p \rangle} \\
 &= p_0 + \langle p \rangle
 \end{aligned}$$