

PKZ02 - Modul Pankreaskarzinom für onkologische Zentren und Darmkrebszentren: Kennzahlenabfrage

Anlage EB Version F4.1

| Basis-Kriterien | Grundlage sind die Daten aus den Auswertungen PKZ01.1 und PKZ01.2 |
|-----------------|---|
| Filterkriterien | "Bezugsjahr (Histologie)": Dropdown mit allen Jahren, in denen ein Histologieformular existiert |
| Datumsbezug | Datum der ersten Histologie |
| Hinweise | Für den Zähler gelten implizit die Kriterien des jeweiligen Nenners Falls kein UICC vorhanden ist, wird das prätherapeutische UICC zur Berechnung herangezogen. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel Kennzahl 2: Ist ein Konferenzformular angelegt, müssen dort die Felder "Konferenz" UND "Art der Besprechung" gefüllt sein. |
| | 4. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel Kennzahl 2: Zur Erfüllung des Zählers muss entweder ein Konferenzformular ODER ein Therapieplanformular dokumentiert sein. |

| Nr. | EB | Kennzahlen-definition | Kennzahlenziel | Kennwert | Text aus Kennzahlenbogen | AlcedisMED | Formular | Feld | Inhalt | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|--|----------|----------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|---|--|--|--------------|--|------------------|
| 1 | 1.2.0 | Primärfälle Zentrum | Siehe Sollvorgabe | Anzahl | Primärfälle | | automatische | er Übertrag aus den Basisda | ten | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nenner | Primärfälle (= Kennzahl 1) | | automatische | er Übertrag aus den Basisda | ten | | | | | |
| | | | | | | | Therapieplan | Grundlage der Therapieplanung | Tumorkonferenz | | | | | |
| 2 | 1.2.3 | Prätherapeutische Fallvorstellung | Prätherapeutische Vorstellung aller | | | | | Zähler | 7ähler | Primärfälle mit einem Pankreaskarzinom, die in der präoperativen Tumorkonferenz | Pat., die in einer prätherapeutischen | тпегаріеріап | Zeitpunkt der Therapie- entscheidung prätherapeutisch | prätherapeutisch |
| | | _ | Primärfälle | Zaniei | vorgestellt wurden | Tumorkonferenz vorgestellt wurden. | Konferenz | Konferenz | Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen | | | | | |
| | | | | | | | Konferenz | Art der Besprechung | prätherapeutisch | | | | | |

| Nr. | EB | Kennzahlen-definition | Kennzahlenziel | Kennwert | Text aus Kennzahlenbogen | AlcedisMED | Formular | Feld | Inhalt |
|-----|-------|----------------------------------|---|----------|---|--|---------------------------|--|---|
| | | | | Nenner | Operative Primärfälle Pankreas (5-524ff und 5-525ff mit ICD-10 | | automatisch | er Übertrag aus den Basisda | aten |
| | | | | | | | Therapieplan | Grundlage der Therapieplanung | Tumorkonferenz |
| 3 | 1.2.3 | Postoperative Fallvorstellung | Postoperative Vorstellung aller | | Operative Primärfälle Pankreas, die in | Pat., die in einer posttherapeutischen | rnerapiepian | Zeitpunkt der Therapie- entscheidung | postoperativ/ posttherapeutisch |
| | | 0 | Primärfälle | Zähler | der postoperativen Konferenz vorgestellt wurden | Tumorkonferenz vorgestellt wurden. | | Konferenz | Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen |
| | | | | | | - | Konferenz | Art der Besprechung | posttherapeutisch |
| | | | | | | | | T | |
| | | | | | | Alle Primärfälle | Tumorstatus | Anlass | Beurteilung Primärtumor |
| | | | | | | mit gültigem UICC | Tamorstatus | UICC | IA*, IB*, IIA*, IIB*, III* o. IV* |
| 4 | 1.4.2 | Psychoonkologische Betreuung | Adäquate Rate an psychoonkologischer Betreuung | Nenner | Primärfälle (= Kennzahl 1) + Patienten mit Rezidiv bzw. neuaufgetretenen Metastasen | und alle Rezidive (wenn mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr, dann nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen) | Tumorstatus | Anlass | Beurteilung des n. Rezidivs |
| | | | | | Patienten, die psychoonkologisch | Pat., die eine psychoonkologische | Beratung und | Psychoonkologische Betreuung erfolgt | ja |
| | | | | Zähler | betreut wurden (Gesprächsdauer ≥ 25 Min.) | Betreuung erhalten haben. | Betreuung | Dauer des psycho- onkologischen Gesprächs | ≥ 25 Minuten |
| | | | | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | | Alle Primärfälle | Tumorstatus | Anlass | Beurteilung Primärtumor |
| | | | | | | mit gültigem UICC | Tamorstatus | UICC | IA*, IB*, IIA*, IIB*, III* o. IV* |
| 5 | 1.5.2 | Beratung Sozialdienst | Möglichst hohe Rate an Patienten, die durch den Sozialdienst beraten wurden | Nenner | Primärfälle (= Kennzahl 1) + Patienten mit Rezidiv bzw. neuaufgetretenen Metastasen | und alle Rezidive (wenn mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr, dann nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen) | Tumorstatus | Anlass | Beurteilung des n. Rezidivs |
| | | | | Zähler | Patienten, die durch den Sozialdienst beraten wurden | Pat., die vom Sozialdienst beraten wurden. | Beratung und Betreuung | Beratung durch den Sozialdienst erfolgt | ja |

| Nr. | ЕВ | Kennzahlen-definition | Kennzahlenziel | Kennwert | Text aus Kennzahlenbogen | AlcedisMED | Formular | Feld | Inhalt | |
|-----|-------|---|---|-----------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| | | | | Nenner | Primärfälle (= Kennzahl 1) | | automatische | er Übertrag aus den Basisda | aten | |
| 6 | 1.7.6 | Studienteilnahme | · · | | Patienten mit Pankreaskarzinom (nicht | Studienteilnahme im Kennzahlenjahr (Zähler ist unabhängig vom Nenner, d.h. eine Studie wird gezählt | | Datum der Einverständnis erklärung | | |
| | | | Patienten in Studien | Zähler | nur Primärfälle), die in eine Studie eingebracht wurden | wenn das Studienbezugsdatum im Kennzahlenjahr liegt. Es können auch mehrere Studien pro Jahr gezählt werden) | Studien-teilnahme | Beginndatum der Studie | Datum | |
| | | | | Nenner | Per ERCP untersuchte Patienten | Anzahl aller Patienten mit ERCP | Untersuchung | Art der Untersuchung | mind. 1 OPS-Code mit 1-642 ; 5- 513 o. 3-e05.y | |
| | | | | | | Pankreatitis | Pat., bei denen nach der | | Komplikation | Pankreatitis |
| 7 | 2.1 | Endoskopie Komplikationen | Möglichst niedrige Rate an endoskopiespezifisch | Zähler 7a | nach ERCP (EB 2.1) | ERCP die Komplikation "Pankreatitis" auftrat | Komplikation | aufgrund welcher Untersuchung | Untersuchung mit OPS-Code mit 1-642; 5-513 o. 3-e05.y | |
| | | Kompilikationen | en Komplikationen | | Blutung u. Perforation nach | Pat., bei denen nach der ERCP eine der | | Komplikation | "Blutung" o. "Perforation" | |
| | | | | Zähler 7b | ERCP (EB 2.1) | Komplikationen "Blutung" oder "Perforation" auftrat | Komplikation | aufgrund welcher Untersuchung | Untersuchung mit OPS-Code mit 1-642; 5-513 o. 3-e05.y | |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | 5.2.4 | Operative Primärfälle Pankreas (ausschließlich ICD-10 C25 in Verbindung mit 5-524ff und 5-525ff) | Siehe Sollvorgabe | Anzahl | Operative Primärfälle Pankreas (5-524ff, 5-525ff ausschließlich mit ICD- 10 C25) (Def. 5.2.4) | | | | aten | |

Hilfetext PKZ02

| Nr. | ЕВ | Kennzahlen-definition | Kennzahlenziel | Kennwert | Text aus Kennzahlenbogen | AlcedisMED | Formular | Feld | Inhalt | |
|-----|-------|--|--|----------|---|---|----------|-----------|---|--|
| 9 | 5.2.4 | Operative Expertise Pankreas gesamt | Siehe Sollvorgabe | Anzahl | Pankreasresektionen (Pankreaslinks-, Pankreaskopfresektion, Totale Pankreatektomie, 5- 524ff und 5-525ff, mit u. ohne ICD-10 C25) | automatischer Übertrag aus den Basisdaten | | | | |
| | | | | Nenner | Pankreasresektionen (5-524ff und 5-525ff, mit u. ohne ICD-10 C25) (= Kennzahl 9) | automatischer Übertrag aus den Basisdaten | | | | |
| 10 | 5.2.7 | Revisions-OP's Pankreas | Möglichst niedrige Rate an Revisions- OP's nach OP | Zähler | Revisions-OP's infolge von perioperativen Komplikationen innerhalb von 30d nach Pankreasresektion | Pat., bei denen die Differenz zwischen Datum der Revisions-OP und eines Eingriffs (mit einem OPS Code 5- 524.* oder 5-525.*) ≤ 30 Tage war. | Eingriff | Resektion | Revisions-OP aufgrund von Komplikationen | |

| Nr. | ЕВ | Kennzahlen-definition | Kennzahlenziel | Kennwert | Text aus Kennzahlenbogen | AlcedisMED | Formular | Feld | Inhalt |
|-----|-------|--------------------------------|---|----------|---|---|--------------|-------------------------------|--|
| | | | | Nenner | Pankreasresektionen (5-524ff und 5-525ff, mit u. ohne ICD-10 C25) (= Kennzahl 9) | | automatische | er Übertrag aus den Basisd | laten |
| | | | | | | Pat. mit Pankreasresektionen, | Eingriff | Maßnahmen beim Eingriff | mind. 1 OPS-Code mit 5-524.* oder 5-525.* |
| | | | Möglichst niedrige | | | die innerhalb von 30 Tagen | | Datum des Auftretens | innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff |
| 11 | 5.2.7 | Postoperative Wundinfektion | Rate an postoperativen Wundinfektionen mit Notwendigkeit der chirurgischen Wundrevision (Spülung, Spreizung, VAC-Verband) | Zähler | Postoperative Wundinfektionen innerhalb von 30d nach Pankreasresektion mit Notwendigkeit der chirurgischen Wundrevision (Spülung, Spreizung, VAC-Verband) | eine Wundinfektion | Komplikation | Komplikation | "Wundinfektion" oder "Wundinfektion A1 (oberflächl. Infektion)" oder "Wundinfektion A2 (tiefe Infektion)" oder "Wundinfektion A3 (Räume/Organe)" oder "Wundinfektion bis CTC Grad 2" |
| | | | | | | aufgrund der Pankreasresektion hatten, | | aufgrund welchen Eingriffs | Zuordnung zur Pankreasresektion |
| | | | | | | die eine der 3 genannten Wundrevisionen notwendig machte. | | chirurgische Wundrevision | Spülung Spreizung VAC-Verband |
| ļ | | | | | | - | | | |
| | | Mortalität | Möglichst niedrige Rate an postoperativ | Nenner | Pankreasresektionen (5-524ff und 5-525ff, mit u. ohne ICD-10 C25) (= Kennzahl 9) | | automatische | er Übertrag aus den Basisd | laten |
| 12 | 5.2.7 | postoperativ | verstorbenen Patienten nach operativen Eingriffen | 7"11 | Postoperativ verstorbene Patienten | Pat., bei denen zwischen dem Datum des Eingriffs | LIIISIIII | Maßnahmen beim Eingriff | mind. 1 OPS-Code mit 5-524.* oder 5-525.* |
| | | operativen Ein | | Zähler | nach Pankreasresektionen innerhalb von 30d | und dem Todesdatum bis zu 30 Tage liegen. | Abschluss | Todesdatum | gefüllt |

Hilfetext PKZ02

| Nr. | EB | Kennzahlen-definition | Kennzahlenziel | Kennwert | Text aus Kennzahlenbogen | AlcedisMED | Formular | Feld | Inhalt |
|-----|------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|---|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| 13 | 5.2.7 | Lokale R0-Resektionen | Möglichst hohe Rate an lokalen | Nenner | Operative Primärfälle Pankreas (5-524ff, 5-525ff ausschließlich mit ICD-10 C25) (= Kennzahl 8) | automatischer Übertrag aus den Basisdaten | | | aten |
| | | Pankreas | R0-Resektionen | Zähler | Lokale RO-Resektionen Pankreas nach Abschluss der operativen Therapie | Pat., die RO-resiziert wurden. | Tumorstatus | R (lokal) | RO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Anlass | Beurteilung Primärtumor |
| | | | | | Operative Primärfälle Pankreas (5-524ff, 5-525ff ausschließlich mit ICD-10 C25), die eine | Operative Primärfälle | Tumorstatus | Morphologie | ICD-O-3-Code ist ungleich 8453/* |
| | | | | Nenner | | | Eingriff | Maßnahmen beim Eingriff | mind. 1 OPS-Code mit 5-524 oder 5- 525 |
| | | Lymphknoten- | Mind. 10 regionäre LK | | Lymphadenektomie erhalten haben | mit gültigem UICC, | Tumorstatus | UICC | IA*, IB*, IIA*, IIB*, III* o. IV* |
| 14 | . 1 8.13 1 | | im OP-Präparat | | ernalten naben | die eine Lymphadenektomie erhalten haben. | Eingriff | Maßnahmen beim Eingriff | mind. 1 OPS-Code mit 5-402* bis 5- 404* 5-406* und 5-407* und 5-e22.y |
| | | | | Operative Primärfälle Pankreas mit ≥ 10 regionären LK im OP-Präparat nach Abschluss der operativen Therapie | Pat., bei denen mind. 10 Lymphknoten entnommen wurden. | Tumorstatus | LK Anzahl entfernt | ≥ 10 | |

| Nr. | ЕВ | Kennzahlen-definition | Kennzahlenziel | Kennwert | Text aus Kennzahlenbogen | AlcedisMED | Formular | Feld | Inhalt |
|-----|------|-------------------------------|--|----------|--|--|----------------------|--|-------------------------|
| | | | | Nenner | Operative Primärfälle Pankreas (5-524ff, 5-525ff ausschließlich mit ICD-10 C25) (= Kennzahl 8) | | automatische | r Übertrag aus den Basisda | iten |
| | | | | | | Für eine vo | ollständige path. Au | farbeitung müssen folgend | e Felder gefüllt sein: |
| | | | | | | рТ | | Т | рТ |
| | | | | | | pN | | N | pN |
| | | | | | | Anzahl untersuchte LK | | LK Anzahl entfernt | Inhalt anzeigen |
| | | | | | | Anzahl befallene LK | Tumorstatus | LK Anzahl befallen | Inhalt anzeigen |
| | | | | | | G | | G | Inhalt anzeigen |
| | | | Möglichst hohe Rate | | | R | | R | Inhalt anzeigen |
| 15 | 8.10 | Pathologische Aufarbeitung | an patholog. vollständig aufgearbeiteten | | Operative Primärfälle mit pathologisch | Status an der Resektions- fläche zum Restpankreas | | Status an der Resektionsfläche zum Restpankreas | Inhalt anzeigen |
| | | / tarar seriang | Präparaten | Zähler | vollständig aufgearbeiteten Präparaten | nache zam nesepanni cas | | Art | Befundung von OP-Gewebe |
| | | | entsprechend EB 8.10 | | entsprechend EB 8.10 | Status an den circum- | Histologie | Status an den circumferentiellen Resektionsrändern | Inhalt anzeigen |
| | | | | | | ferentiellen Resektions- rändern | | circumferentieller Resektionsrand | Inhalt anzeigen |
| | | | | | | | | Art | Befundung von OP-Gewebe |
| | | | | | | L | | L | Inhalt anzeigen |
| | | | | | | V | | V | Inhalt anzeigen |
| | | | | | | Pn (Perineurale Invasion/ Nervenscheiden- invasion) | Tumorstatus | Pn (Feld ppn) | Inhalt anzeigen |

| Nr. | ЕВ | Kennzahlen-definition | Kennzahlenziel | Kennwert | Text aus Kennzahlenbogen | AlcedisMED | Formular | Feld | Inhalt | | |
|-----|---------------------------|--|--------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | Anzahl der Histologieformulare | Histologie | Art | Befundung von OP-Gewebe | | |
| | | | | | | | aus folgendem Patientenkollektiv: | | | | |
| | | | | | Befundberichte von operativen | | | Anlass | Beurteilung Primärtumor | | |
| | | | | Nenner | Primärfällen | Operative Primärfälle | Tumorstatus | Morphologie | ICD-O-3-Code ist ungleich 8453/* | | |
| | 8.10 | Inhalt | Möglichst häufig | | | | Eingriff | Maßnahmen beim Eingriff | mind. 1 OPS-Code mit 5-524 oder 5- 525 | | |
| 16 | LL QI 3 | Pathologieberichte | vollständige | | | mit gültigem UICC. | Tumorstatus | UICC | IA*, IB*, IIA*, IIB*, III* o. IV* | | |
| | | | Pathologieberichte | | | | | Art | Befundung von OP-Gewebe | | |
| | | | | | | | | Т | рТ | | |
| | | | | | Befundberichte von operativen | Pat., bei denen der | Histologie | N | pN | | |
| | | | | Zähler | Primärfällen mit Angabe von: pT, pN, M; Tumorgrading; Verhältnis von | pathologische Befundbericht | | M | M (darf nicht MX sein!) | | |
| | | | | befallenen zu entfernten LK | vollständig ist. | | G | G | | | |
| | | | | | | | LK befallen | gefüllt | | | |
| | | | | | | | | LK entfernt | gefüllt | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tumors Operative Primärfälle | Tumorstatus | Anlass | Beurteilung Primärtumor | | |
| | | | | | Operative Primärfälle Pankreaskarzinom | | Tumorstatus | Morphologie | ICD-O-3-Code ist ungleich 8453/* | | |
| | | | | Nenner | UICC Stad. I-III und RO-Resektion | | Eingriff | Maßnahmen beim Eingriff | mind. 1 OPS-Code mit 5-524 oder 5- 525 | | |
| | | | Möglichst häufig | | | mit gültigem UICC I-III | Turnanatatus | UICC | IA*, IB*, IIA*, IIB* o. III* | | |
| 17 | 6.2.8 | Adjuvante | adjuvante | | | und R0 | Tumorstatus | R | RO | | |
| 17 | LL QI 4 Chemotherapie Gen | Chemotherapie mit Gemcitabine u/o 5- FU/Folinsäure | | | 5 | Systemische | Intention | "adjuvant kurativ" o. "postoperativ palliativ" | | | |
| | | ro/rollisaure | | Operative Primärfälle Pankreaskarzinom UICC Stad. I-III, RO- | Pat., die eine adj. Chemotherapie mit | Therapie | Therapieschema | mit folgender Therapieart: | | | |
| | | | Zähler | Resektion und adjuvanter | Gemcitabin u./o. 5- | | Therapieart | Chemotherapie | | | |
| | | | | Chemotherapie mit Gemcitabin o. 5- | FU/Folinsäure erhalten | n l | | Gemcitabin | | | |
| | | | | | FU/Folinsäure | haben. | Vorlage Therapie | erapie Wirkstoff | Folinsäure | | |
| | | | | | | | | WIINSCOIL | Fluorouracil | | |

Hilfetext PKZ02

| Nr. | ЕВ | Kennzahlen-definition | Kennzahlenziel | Kennwert | Text aus Kennzahlenbogen | AlcedisMED | Formular | Feld | Inhalt |
|-----|------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| | <u> </u> | | | | | T | | | |
| | | | | | | Primärfälle | Tumorstatus | Anlass | Beurteilung Primärtumor |
| | | | | | Primärfälle mit | mit UICC III | | UICC | III* |
| | | I Chemotheranie Stad. | Nenner | Pankreaskarzinom UICC Stad. III (Palliative Situation) und IV | in palliativer Situation | Therapieplan | Intention der Gesamttherapie | palliativ | |
| | | | 0 | | Primärfälle mit Pankreaskarzinom UICC | oder mit UICC IV, | Tumorstatus | UICC | IV* |
| 18 | 6.2.8 LL QI 5 | | Chemotherapie Stad. | | | deren ECOG zwischen 0 und 2 liegt. | Anamnese | ECOG | 0-2 |
| | | | ECOG 0-2 | 7ë blar | | Pat., die eine palliative | Systemische Therapie | Intention | "palliativ" o. "postoperativ palliativ" o. "präoperativ palliativ" |
| | | | Zähler | Stad III und IV, ECOG 0-2 und palliativer Chemotherapie | Chemotherapie erhalten haben. | | Therapieschema | mit folgender Therapieart: | |
| | | | | | napen. | Vorlage Therapie | Therapieart | Chemotherapie | |

| CLINICAL RESEARCH • IT SOLUTIONS | Alcedis | GmbH | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Alcedis MED 4 - Ausw | ertung PKZ02 | | | | | | | | | | |
| Titel | PKZ02 - Mod | dul Pankreaskarzir | nom für Onkologische Zentren und Darmkrebszentren (Version F3.1 vom 12.12.2014 | 4): Kennzahlenabfrage | | | | | | | |
| Ausgabeformat | RTF | | | | | | | | | | |
| Basis-Kriterien | Grundlage si | ind die Daten aus | Auswertung PKZ01 | | | | | | | | |
| Filterkriterien | "Bezugsjahr | (Histologie)": Drop | odown mit allen Jahren, in denen eine Histologie existiert | | | | | | | | |
| Datumsbezug | Datum der e | rsten Histologie | | | | | | | | | |
| Hinweise | Für den Zähl | ler gelten implizit a | alle Kriterien des Nenners | | | | | | | | |
| | UICC: falls 'UICC g | ilt nach neoadjuva | inter Therapie' = 1, dann den Wert aus der Spalte "UICC prätherapeutisch" der pkz0 | 1.1 nehmen | | | | | | | |
| Kennzahl | Parameter | Bezugstabelle | Felder aus Bezugstabelle | Anmerkungen | | | | | | | |
| 1 | Anzahl | PKZ01.1 | 'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER UICC' = IIB* ODER 'UICC' = III* ODER 'UICC' = IV*] | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Summe der Felder 1-6 | | | | | | | |
| 2 | Nenner | PKZ01.1 | 'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA" ODER 'UICC' = IIB* ODER 'UICC' = IV*] | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Summe der Felder 1-6 | | | | | | | |
| 2 | Zähler | PKZ01.1 | 'präth. Konferenz' = 1 | | | | | | | | |
| 3 | Nenner | PKZ01.1 | 'Operativer Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = III* ODER 'UICC' = IV*] | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Summe der Felder 7-12 | | | | | | | |
| 3 | Zähler | PKZ01.1 | 'postop. Konferenz' = 1 | | | | | | | | |
| 4 | Nenner | PKZ01.1 | ['Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = IIB* ODER 'UICC' = III* ODER 'UICC' = IV*]] ODER ['Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs/Progresses UND wenn mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr, dann nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen] | | | | | | | | |
| 4 | Zähler | PKZ01.1 | 'psychoonkologische Betreuung' = 1 | | | | | | | | |
| 5 | Nenner | PKZ01.1 | ['Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = IIB* ODER 'UICC' = III* ODER 'UICC' = IV*]] ODER ['Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs/Progresses UND wenn mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr, dann nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen] | | | | | | | | |
| 5 | Zähler | PKZ01.1 | 'Sozialdienst' = 1 | | | | | | | | |

pkz02_fs_rpt_td - PKZ02

| Kennzahl | Parameter | Bezugstabelle | Felder aus Bezugstabelle | Anmerkungen |
|----------------------------------|-----------|---------------|--|---|
| 6 | Nenner | PKZ01.1 | 'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = IIB* ODER 'UICC' = IV*] | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Summe der Felder 1-6 |
| 6 | Zähler | PKZ01.1 | Studienteilnahme im Kennzahlenjahr (Zähler ist unabhängig vom Nenner, d.h eine Studie wird gezählt wenn das Studienbezugsdatum im Kennzahlenjahr liegt. Es können auch mehrere Studien pro Jahr gezählt werden.) | |
| 7a | Nenner | PKZ01.1 | Alle Patienten mit ERCP (nicht pro Fall) | |
| 7a (Pankreatitis/ERCP) | Zähler | PKZ01.1 | Pankreatitis nach ERCP pro Patient | |
| 7b | Nenner | PKZ01.1 | Alle Patienten mit ERCP (nicht pro Fall) | |
| 7b (Blutung u. Perforation/ERCP) | Zähler | PKZ01.1 | Blutung oder Perforation nach ERCP pro Patient | |
| 8 | Anzahl | PKZ01.1 | 'Operativer Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = III* ODER 'UICC' = IV*] | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Summe der Felder 7-12 |
| 9 | Anzahl | PKZ01.2 | Summe aller Eingriffe mit OPS 5-524.* und 5-525.* auch zu NICHT C25- Diagnosen Es werden alle Eingriffe betrachtet, nicht nur die Eingriffe bei den Primärfällen! Es werden auch Patienten-Daten außerhalb der Erkrankung "Pankreas" berücksichtigt! Der Eingriff muss im Zeitraum des Filters liegen und entsprechender Organisation zugewiesen sein. | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Feld 13 |
| 10 | Nenner | PKZ01.2 | Summe aller Eingriffe mit OPS 5-524.* und 5-525.* auch zu NICHT C25- Diagnosen Es werden alle Eingriffe betrachtet, nicht nur die Eingriffe bei den Primärfällen! Es werden auch Patienten-Daten außerhalb der Erkrankung "Pankreas" berücksichtigt! Der Eingriff muss im Zeitraum des Filters liegen und entsprechender Organisation zugewiesen sein. | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Feld 13 |
| 10 | Zähler | PKZ01.2 | RevisionsOP innerhalb von 30 Tagen = 1 | |

pkz02_fs_rpt_td - PKZ02

| Kennzahl | Parameter | Bezugstabelle | Felder aus Bezugstabelle | Anmerkungen |
|----------|-----------|---------------|---|---|
| 11 | Nenner | PKZ01.2 | Summe aller Eingriffe mit OPS 5-524.* und 5-525.* auch zu NICHT C25- Diagnosen | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Feld 13 |
| | | | Es werden alle Eingriffe betrachtet, nicht nur die Eingriffe bei den Primärfällen! Es werden auch Patienten-Daten außerhalb der Erkrankung "Pankreas" berücksichtigt! | |
| | | | Der Eingriff muss im Zeitraum des Filters liegen und entsprechender Organisation zugewiesen sein. | |
| 11 | Zähler | PKZ01.2 | Anzahl Wundinfektion innerhalb von 30 Tagen | |
| 12 | Nenner | PKZ01.2 | Summe aller Eingriffe mit OPS 5-524.* und 5-525.* auch zu NICHT C25- Diagnosen | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Feld 13 |
| | | | Es werden alle Eingriffe betrachtet, nicht nur die Eingriffe bei den Primärfällen! Es werden auch Patienten-Daten außerhalb der Erkrankung "Pankreas" berücksichtigt! | |
| | | | Der Eingriff muss im Zeitraum des Filters liegen und entsprechender Organisation zugewiesen sein. | |
| 12 | Zähler | PKZ01.2 | Todesdatum innerhalb von 30 Tagen = 1 Bitte beachten, dass auch obwohl bei mehreren Pankreasresektionen der PKZ01.2 | |
| | | | das Feld "Todesdatum innerhalb von 30 Tagen" = 1 der Patient immer nur einmal gezählt wird | |
| 13 | Nenner | PKZ01.1 | 'Operativer Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = III* ODER 'UICC' = IV*] | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Summe der Felder 7-12 |
| 13 | Zähler | PKZ01.1 | R (lokal) = 0 | |
| 14 | Nenner | PKZ01.1 | 'Operativer Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = III* ODER 'UICC' = IV*] UND 'Lymphadenektomie' = 1 | |
| 14 | Zähler | PKZ01.1 | 'Anzahl untersuchte LK' >= 10 | |
| 15 | Nenner | PKZ01.1 | 'Operativer Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = III* ODER 'UICC' = IV*] | Automatischer Übertrag aus PKZ07: Summe der Felder 7-12 |
| 15 | Zähler | PKZ01.1 | 'pathologische Aufarbeitung vollständig' = 1 | |

pkz02_fs_rpt_td - PKZ02

| Kennzahl | Parameter | Bezugstabelle | Felder aus Bezugstabelle | Anmerkungen |
|----------|-----------|---------------|---|-------------|
| 16 | Nenner | PKZ01.1 | Anzahl aller pathologische Befundberichte aus folgendem Patientenkollektiv: 'Operativer Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = IIB* ODER 'UICC' = III* ODER 'UICC' = IV*] | |
| 16 | Zähler | PKZ01.1 | Anzahl aller vollständigen pathologischern Befundberichte | |
| 17 | Nenner | PKZ01.1 | 'Operativer Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA* ODER 'UICC' = IB* ODER 'UICC' = IIA* ODER 'UICC' = IIB* ODER 'UICC' = III*] UND 'R' = R0 | |
| 17 | Zähler | PKZ01.1 | 'Adj. Chemotherapie Gemcitabine u./o. 5-FU/Folinsäure' = 1 | |
| 18 | Nenner | PKZ01.1 | 'Primärfall' = 1 UND [['UICC' = III* UND 'palliative Situation' = 1] ODER 'UICC' = IV*] UND ['ECOG' = 0 ODER 'ECOG' = 1 ODER 'ECOG' = 2] | |
| 18 | Zähler | PKZ01.1 | 'palliative Chemotherapie' = 1 | |

pkz02_fs_rpt_td - PKZ02 4/4