

0
 Seja w uma 1-forma diferencial em \mathbb{R}^m e $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ uma função C^1 , com $f(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^m$. Mostre que $d(fw) \equiv 0$ (identicamente zero) se, e somente se, a 1-forma:

$$\beta = w - \frac{1}{f} dx_{m+1}$$

em \mathbb{R}^{m+1} satisfaz a equação $\beta \wedge d\beta = w \wedge dw$. (Considere $\mathbb{R}^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$ definido por $x_{m+1} = 0$).

Como w é 1-forma e $f(x)$ uma função não nula para qualquer ponto do domínio. Queremos mostrar que $d(fw) \equiv 0$.

Para mostrar vamos utilizar o "pull back", então:
 "Seja uma forma de grau r e classe C^1 em M , para toda parametrização $\varphi: M_0 \rightarrow M$ em M , existe uma única forma $d\varphi^*w$, de grau $(r+1)$ em M_0 , tal que $\varphi^*(d\varphi^*w) = d(\varphi^*w)$."

Então: $\beta = w - \frac{1}{f} dx_{m+1} \rightarrow w - \beta = \frac{1}{f} dx_{m+1}$ X

Aplicando o "pull back", temos:

$$\varphi^*(d\varphi^*w) = d(\varphi^*w)$$

$$\varphi^*\left(\frac{1}{f} dx_{m+1}\right) = d(w - \beta) \rightarrow$$

$$\varphi^*(0) = w \wedge dw - \beta \wedge d\beta$$

$$0 = w \wedge dw - \beta \wedge d\beta \rightarrow w \wedge dw = \beta \wedge d\beta.$$

Como isto $d(fw) \equiv 0$.

Agora a volta se $d(fw) \equiv 0$, então $fw \wedge dw = 0$, mas $f(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^m$.

Aplicando a regra da cadeia, temos $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ possui, em cada ponto $x \in \mathbb{R}^m$, uma derivada, que é uma transformação linear:

$$f'(x): T_x \mathbb{R}^m \rightarrow T_{f(x)} \mathbb{R}, \text{ ou}$$

$$[f'(x)]^*: T_m(T_{f(x)} \mathbb{R}) \rightarrow T_m(T_x \mathbb{R}^m)$$

$$(f^*w)(x) = [f'(x)]^* \cdot w(f(x))$$