

- Non si possono consultare libri, note, ed ogni altro materiale o persone durante l'esame ad eccezione delle funzioni Matlab fornite.
- Risolvere i seguenti esercizi con l'ausilio di Matlab.
- La durata del compito è di 90 minuti.
- Questo esame ha 3 domande, per un totale di 30/30 punti.
- Svolgere gli esercizi su fogli protocollo, indicando: nome, cognome, codice persona e data
- Per ciascun esercizio consegnare su webeep un file nominato, ad esempio, "esercizio1.m" con il codice Matlab sviluppato.
- Per utilizzare le funzioni Matlab sviluppate durante il corso, è necessario aggiungere la cartella con il comando `addpath functions2022`.

Esercizio 1 (punti 11)

Si consideri la seguente funzione f definita

$$f(x) = x \sin(2\pi x) e^x \quad \text{per } x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$$

Fissando una tolleranza pari a 10^{-6} risolvere i seguenti punti giustificando tutti i passaggi.

- (a) (4 punti) Rappresentare graficamente la funzione f e una retta di equazione $y = 0$. Valutare approssimativamente il numero e la posizione degli zeri della funzione f . Utilizzando l'algoritmo di bisezione è possibile calcolare tutti gli zeri di f ? Per questi, definire un opportuno intervallo e applicare l'algoritmo di bisezione. Riportare i valori e il numero di iterazioni ottenuti. [T+M]
 - (b) (3 punti) Introdurre il metodo di Newton per la ricerca degli zeri di una funzione. Per ciascuno zero di f selezionare un opportuno valore iniziale (non uguale allo zero stesso) in modo che l'algoritmo converga. Riportare i valori e il numero di iterazioni ottenuti applicando il metodo di Newton. Cosa si osserva? [T+M]
 - (c) (4 punti) Introdurre il metodo di Newton modificato dettagliando in quali casi risulta utile. Calcolare nuovamente gli zeri di f , cosa si osserva? [T+M]
-

Esercizio 2 (punti 10)

Si consideri la seguente funzione f definita

$$f(x) = x^2 \sin^3 x \quad \text{per } x \in [0, 2]$$

Sapendo che l'integrale indefinito di f è dato da

$$I(x) = \frac{1}{108}(-81(-2 + x^2) \cos(x) + (-2 + 9x^2) \cos(3x) - 6x(-27 \sin(x) + \sin(3x))) + c$$

- (a) (4 punti) Introdurre l'algoritmo di quadratura composta del punto medio, specificando l'ordine di accuratezza. Si approssimi l'integrale $I = \int_0^2 f(x)dx$ utilizzando la formula di quadratura composta del punto medio con un numero di sotto-intervalli variabile tra 1 e 10, si valuti analiticamente l'integrale esatto e si riporti il valore dell'errore al variare del numero di sotto-intervalli. Cosa si osserva? [T+M]
- (b) (3 punti) Introdurre l'algoritmo di quadratura composta dei trapezi, specificando l'ordine di accuratezza. Si approssimi l'integrale $I = \int_0^2 f(x)dx$ utilizzando la formula di quadratura composta dei trapezi con un numero di sotto-intervalli variabile tra 1 e 10, si valuti analiticamente l'integrale esatto e si riporti il valore dell'errore al variare del numero di sotto-intervalli. Cosa si osserva? [T+M]
- (c) (3 punti) Introdurre l'algoritmo di quadratura composta di Simpson, specificando l'ordine di accuratezza. Si approssimi l'integrale $I = \int_0^2 f(x)dx$ utilizzando la formula di quadratura composta di Simpson con un numero di sotto-intervalli variabile tra 1 e 10, si valuti analiticamente l'integrale esatto e si riporti il valore dell'errore al variare del numero di sotto-intervalli. Cosa si osserva? [T+M]

Esercizio 3 (punti 9)

Si consideri il seguente problema differenziale di tipo diffusione-reazione

$$\begin{cases} -u''(x) + \pi u(x) = \pi(4\pi + 1) \sin(2\pi x), & 0 < x < 1, \\ u(0) = 0, & u(1) = 0. \end{cases}$$

La cui soluzione esatta è data da

$$u_{ex}(x) = \sin(2\pi x)$$

- (a) (5 punti) Introdurre il metodo degli elementi finiti lineari per un problema ellittico monodimensionale, riportare anche l'ordine di convergenza in L^2 rispetto ad h . [T]
- (b) (4 punti) Calcolare l'errore L^2 commesso utilizzando i seguenti passi di discretizzazione $[0.2, 0.1, 0.05, 0.025]$, tale errore è calcolabile come

$$\text{err} = \text{sqrt}(\text{sum}(h*(u - u_{ex}(x)).^2))$$

Riportare l'ordine di convergenza e discutere il risultato rispetto alla teoria precedentemente esposta. [M]