

## Semana 1

**Nombre:** Alejandro Saavedra San Martín.

**Profesor:** Guillermo Rubilar Alegría.

La métrica de Schwarzschild exterior, en las coordenadas de curvatura  $x^\mu = (ct, r, \theta, \varphi)$ , toma la forma

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2m}{r}\right) c^2 dt^2 - \frac{dr^2}{\left(1 - \frac{2m}{r}\right)} - r^2 [d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2], \quad r > 2m. \quad (1)$$

Buscamos escribir el  $ds^2$  en un sistema coordenado isótropo en el que la sección espacial ( $t = \text{cte}$ ) sea proporcional a la usual distancia euclidea:

$$ds^2 = \tilde{A}(c^2 dt^2) - \tilde{B} d\ell_{R^3}^2, \quad (2)$$

donde  $d\ell_{R^3}^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$  en coordenadas cuasi-cartesianas, o  $d\ell_{R^3}^2 = d\rho^2 + \rho^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$  en coordenadas cuasi-esféricas. Entonces, las coordenadas isotrópicas,  $x^\mu = (ct, \rho, \theta, \varphi)$ , que buscamos deben ser tales que el elemento de línea adopte la forma

$$ds^2 = \tilde{A}(\rho) c^2 dt^2 - \tilde{B}(\rho) [d\rho^2 + \rho^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)]. \quad (3)$$

Como  $ds^2$  es un escalar bajo transformaciones generales de coordenadas (TGC's), comparando (3) con (1), encontramos las siguientes condiciones:

$$\tilde{A}(\rho) = 1 - \frac{2m}{r}, \quad (4)$$

$$\tilde{B}(\rho) d\rho^2 = \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} dr^2, \quad (5)$$

$$\tilde{B}(\rho) \rho^2 = r^2. \quad (6)$$

Note que la condición (6) que debe cumplirse para  $d\theta^2$  es la misma para  $d\varphi^2$ .

Resolvamos el sistema de ecuaciones (4)-(6) considerando como incógnitas las funciones  $\tilde{A}$ ,  $\tilde{B}$  y  $\rho = \rho(r)$ . De la ecuación (6),

$$\tilde{B}(\rho) = \frac{r^2}{\rho^2}. \quad (7)$$

Reemplazando en (5), encontramos una ecuación diferencial para  $\rho(r)$  que resulta ser separable:

$$\frac{r^2}{\rho^2} d\rho^2 = \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} dr^2. \quad (8)$$

Si suponemos que  $d\rho/dr > 0$  y  $r > 2m$ , podemos reescribir (8) como

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dr}{\sqrt{r(r-2m)}}. \quad (9)$$

Integrando a ambos lados de la ecuación (9):

$$\int \frac{d\rho}{\rho} = \ln(\rho) = \int \frac{dr}{\sqrt{r(r-2m)}}. \quad (10)$$

Para resolver la integral en  $r$ , usemos la sustitución trigonométrica

$$r - m = m \sec \theta \Rightarrow dr = m \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad (11)$$

válida para  $0 < \theta < \pi/2$ <sup>1</sup>. Entonces, usando la identidad trigonométrica  $\tan^2 \theta + 1 \equiv \sec^2 \theta$ , encontramos que

$$\begin{aligned} \int \frac{dr}{\sqrt{r(r-2m)}} &= \int \frac{m \sec \theta \tan \theta d\theta}{\sqrt{m^2 \sec^2 \theta - m^2}} \\ &= \int \frac{\sec \theta \tan \theta}{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}} d\theta \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{r-m}{m} + \frac{\sqrt{r^2-2mr}}{m} \right| + C \\ &= \ln \left( r - m + \sqrt{r^2 - 2mr} \right) + D, \end{aligned} \quad (12)$$

donde  $D = C - \ln(m)$  es una constante de integración. Por lo tanto, comparando las ecuaciones (10) y (12), obtenemos

$$\ln(\rho) = \ln \left( r - m + \sqrt{r^2 - 2mr} \right) + D \Rightarrow \rho = e^D \left( r - m + \sqrt{r^2 - 2mr} \right). \quad (13)$$

Despejando la coordenada  $r$  en términos de  $\rho$ :

$$(\rho + e^D m) - e^D r = e^D \sqrt{r^2 - 2mr} \quad (14)$$

$$[(\rho + e^D m) - e^D r]^2 = e^{2D} (\sqrt{r^2 - 2mr})^2 \quad (15)$$

$$(\rho + e^D m)^2 - 2e^D r(\rho + e^D m) + e^{2D} r^2 = e^{2D} (r^2 - 2mr) \quad (16)$$

$$(\rho + e^D m)^2 = 2e^D r(\rho + e^D m) - 2mre^{2D} \quad (17)$$

$$(\rho + e^D m)^2 = 2e^D r\rho \quad (18)$$

$$\frac{(\rho + e^D m)^2}{2e^D \rho} = r \quad (19)$$

$$\left( \frac{1}{2e^D} \right) \rho \left[ 1 + \frac{m}{2\rho} (2e^D) \right]^2 = r. \quad (20)$$

Si denotamos la constante  $\beta = 1/(2e^D)$ , hemos encontrado la transformación de coordenadas entre  $\rho$  y  $r$ :

$$r = \beta \rho \left( 1 + \frac{m}{2\beta \rho} \right)^2. \quad (21)$$

---

<sup>1</sup>De esta forma se recupera el dominio  $r > 2m$ .

La constante  $\beta$  está relacionada con la escala elegida para la coordenadas radial  $\rho$ . Sin perder generalidad, podemos elegir esta constante de modo que asintóticamente se aproxime a la usual coordenada radial esférica en un espacio plano. Esto requiere que  $\beta = 1$ . Así, la transformación de coordenadas queda

$$r = \rho \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2. \quad (22)$$

Considerando  $\rho = \rho(r)$  y derivando implícitamente con respecto a  $r$ , tenemos que

$$1 = \frac{d}{dr} \left[ \rho \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2 \right] \quad (23)$$

$$= \frac{d\rho}{dr} \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2 + 2\rho \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right) \left(-\frac{m}{2\rho^2}\right) \frac{d\rho}{dr} \quad (24)$$

$$= \frac{d\rho}{dr} \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right) \left[ \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right) - \frac{m}{\rho} \right] \quad (25)$$

$$= \frac{d\rho}{dr} \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right) \left(1 - \frac{m}{2\rho}\right) \quad (26)$$

$$= \frac{d\rho}{dr} \left(1 - \frac{m^2}{4\rho^2}\right). \quad (27)$$

Luego,

$$\frac{d\rho}{dr} = \frac{1}{\left(1 - \frac{m^2}{4\rho^2}\right)}. \quad (28)$$

Recordemos que para escribir la ecuación (9) hemos supuesto que  $d\rho/dr > 0$ . Entonces, debe cumplirse que

$$1 - \frac{m^2}{4\rho^2} > 0 \Leftrightarrow \rho > \frac{m}{2}. \quad (29)$$

Por lo tanto, la transformación entre las coordenadas  $\rho$  y  $r$ , con  $r > 2m$ , es

$$r = \rho \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2, \quad \rho > \frac{m}{2}. \quad (30)$$

Si reemplazamos (30) en (7), obtenemos el coeficiente métrico

$$\tilde{B}(\rho) = \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^4. \quad (31)$$

Por último, al reemplazar (30) en (4), obtenemos el coeficiente métrico restante:

$$\tilde{A}(\rho) = 1 - \frac{2m/\rho}{\left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2} \quad (32)$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2 - \frac{2m}{\rho}}{\left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2} \quad (33)$$

$$= \frac{\left(1 - \frac{m}{2\rho}\right)^2}{\left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2}, \quad (34)$$

es decir,

$$\tilde{A}(\rho) = \frac{\left(1 - \frac{m}{2\rho}\right)^2}{\left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2}. \quad (35)$$

Resumiendo, el elemento de línea de la solución de Schwarzschild exterior en coordenadas isotrópicas tiene la forma:

$$ds^2 = \frac{\left(1 - \frac{m}{2\rho}\right)^2}{\left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2} c^2 dt^2 - \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^4 [d\rho^2 + \rho^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)], \quad \rho > \frac{m}{2}. \quad (36)$$

En coordenadas cuasi-cartesianas, bajo la transformación de coordenadas

$$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, \quad (37)$$

$$y = \rho \sin \theta \sin \varphi, \quad (38)$$

$$z = \rho \cos \theta, \quad (39)$$

el elemento de línea también puede ser escrito como

$$ds^2 = \frac{\left(1 - \frac{m}{2\rho}\right)^2}{\left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^2} c^2 dt^2 - \left(1 + \frac{m}{2\rho}\right)^4 [dx^2 + dy^2 + dz^2], \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (40)$$

En efecto, calculando los diferenciales de la transformación de coordenadas (37)-(39):

$$\begin{aligned} dx^2 &= (\sin \theta \cos \varphi d\rho^2 + \rho \cos \theta \cos \varphi d\theta - \rho \sin \theta \sin \varphi d\varphi)^2 \\ &= \sin^2 \theta \cos^2 \varphi d\rho^2 + \rho^2 \cos^2 \theta \cos^2 \varphi d\theta^2 + \rho^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi d\varphi^2 + 2\rho \sin \theta \cos \theta \cos^2 \varphi d\rho d\theta \\ &\quad - 2\rho \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi d\rho d\varphi - 2\rho^2 \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi d\theta d\varphi, \end{aligned} \quad (41)$$

$$\begin{aligned} dy^2 &= (\sin \theta \sin \varphi d\rho^2 + \rho \cos \theta \sin \varphi d\theta + \rho \sin \theta \cos \varphi d\varphi)^2 \\ &= \sin^2 \theta \sin^2 \varphi d\rho^2 + \rho^2 \cos^2 \theta \sin^2 \varphi d\theta^2 + \rho^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi d\varphi^2 + 2\rho \sin \theta \cos \theta \sin^2 \varphi d\rho d\theta \\ &\quad + 2\rho \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi d\rho d\varphi + 2\rho^2 \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi d\theta d\varphi, \end{aligned} \quad (42)$$

$$\begin{aligned} dz^2 &= (\cos \theta d\rho - \rho \sin \theta d\theta)^2 \\ &= \cos^2 \theta d\rho^2 - 2\rho \sin \theta \cos \theta d\rho d\theta + \rho^2 \sin^2 \theta d\theta^2. \end{aligned} \quad (43)$$

Entonces, al calcular el elemento de línea  $d\ell_{R^3}^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ , en coordenadas esféricas, los términos en colores de las ecuaciones (42)-(43) se pueden agrupar, mientras que los términos restantes de cancelan mutuamente. Por lo tanto,

$$d\ell_{R^3}^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2 + \rho^2 \sin^2 \theta d\varphi^2. \quad (44)$$

Al igual que la métrica (1), las métricas (36) y (40) también satisfacen las ecuaciones de Einstein en el vacío. Para mayores detalles puede consultar el Notebook (...).