

SI CONSIDERI PER $\lambda \in \mathbb{R}$ LA FUNZIONE

$$f(x) = (x^2 - 2x + \lambda)e^{-x}$$

E DETERMINARE SE ESISTONO $\lambda \in \mathbb{R}$ PER I QUALI È MONOTONA,
E $\lambda \in \mathbb{R}$ PER CUI È CONVESSA.

DOMINIO: \mathbb{R}

$$f'(x) = (2x - 2) \cdot e^{-x} - (x^2 - 2x + \lambda) \cdot e^{-x}$$

$$= e^{-x} (2x - 2 - x^2 + 2x - \lambda) \geq 0$$

SEMPRE
 > 0

$$-x^2 + 4x + (-2 - \lambda) \geq 0$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 4 \cdot (-2 - \lambda)}}{-2}$$

$$\frac{-4 \pm \sqrt{16 - 8 - 4\lambda}}{-2}$$

6

$$16 - 8 - 4\lambda < 0$$

$$\frac{4\lambda}{4} > \frac{8}{4}$$

$$\boxed{\lambda > 2}$$

PER $\lambda > 2$ IL DISCRIMINANTE < 0

QUINDI LA FUNZIONE È MONOTONA

DECRESCENTE

$$f''(x) = -e^{-x} (-x^2 + 4x - 2 - \lambda) + e^{-x} (-2x + 4) > 0$$

$$e^{-x} (x^2 - 4x + 2 + \lambda - 2x + 4) > 0$$

SEMPRE
 > 0

$$x^2 - 6x + 6 + \lambda > 0$$

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4(6 + \lambda)}}{2}$$

$$36 - 24 - 4\lambda < 0$$

$$\frac{4\lambda}{4} > \frac{12}{4}$$

PER $\lambda > 3$ IL SEGNO DELLA $f''(x) > 0$

SEMPRE, QUINDI È CONVESSA PER $\lambda > 3$