# Basic Python - Review Probability

## Hoàng-Nguyên Vũ

# Phần 1: Lý Thuyết

### Xác Suất Cơ Bản

- 1. Xác suất của một sự kiện là gì?
  - A: 0.5
  - B: 1
  - C: 0
  - D: Giá trị giữa 0 và 1

#### Đáp án: D

- 2. Nếu một con xúc xắc sáu mặt được tung, xác suất để ra số 4 là bao nhiêu?
  - A:  $\frac{1}{6}$
  - B:  $\frac{1}{4}$
  - C:  $\frac{1}{2}$
  - D:  $\frac{1}{3}$

## Đáp án: A

- 3. Xác suất của sự kiện đối lập với sự kiện chắc chắn là bao nhiêu?
  - A: 0
  - B: 1
  - C: 0.5
  - D: Không xác định

#### Đáp án: A

- 4. Một bộ bài tiêu chuẩn có 52 lá, xác suất để rút được một lá bài là quân Át là bao nhiêu?
  - A:  $\frac{1}{13}$
  - B:  $\frac{1}{52}$
  - C:  $\frac{4}{52}$
  - D:  $\frac{1}{26}$

#### Đáp án: A

- 5. Khi tung hai con xúc xắc, xác suất để tổng số điểm là 7 là bao nhiêu?
  - A:  $\frac{1}{6}$
  - B:  $\frac{1}{12}$
  - C:  $\frac{1}{18}$
  - D:  $\frac{1}{36}$

#### Đáp án: A

## Xác Suất Có Điều Kiện

- 1. Xác suất có điều kiện là gì?
  - A: Xác suất của một sự kiện xảy ra dưới điều kiện một sự kiện khác đã xảy ra.
  - B: Xác suất của một sự kiện xảy ra mà không có điều kiện gì.
  - C: Xác suất của một sự kiện đối lập.
  - D: Xác suất của một sự kiện không xảy ra.

#### Đáp án: A

- 2. Cho biết P(A) = 0.5 và P(B|A) = 0.8, tìm  $P(A \cap B)$ .
  - A: 0.4
  - B: 0.3
  - C: 0.8
  - D: 0.1

#### Đáp án: A

- 3. Nếu A và B là hai sự kiện độc lập và  $P(A)=0.3,\ P(B)=0.4,\ \text{xác suất }P(A\cap B)$  là bao nhiêu?
  - A: 0.12
  - B: 0.7
  - C: 0.1
  - D: 0.3

#### Đáp án: A

- 4. Nếu A và B là hai sự kiện độc lập, P(A) = 0.5, P(B|A) = ?
  - A: 0.25
  - B: 0.5

- C: 1
- D: Không xác định

#### Đáp án: B

- 5. Cho biết  $P(A \cap B) = 0.2$  và P(A) = 0.5, tìm P(B|A).
  - A: 0.4
  - B: 0.5
  - C: 0.2
  - D: 0.3

#### Đáp án: A

### Covariance và Correlation

- 1. Covariance là gì?
  - A: Độ đo của sự thay đổi cùng chiều giữa hai biến số.
  - B: Độ đo của sự thay đổi ngược chiều giữa hai biến số.
  - C: Độ đo sự phân tán của một biến số.
  - D: Độ đo của xác suất có điều kiện.

#### Đáp án: A

- 2. Correlation là gì?
  - A: Độ đo của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số.
  - B: Độ đo của sự thay đổi cùng chiều giữa hai biến số.
  - C: Độ đo của xác suất có điều kiện.
  - $\bullet\,$  D: Độ đo của sự phân tán của một biến số.

#### Đáp án: A

- 3. Nếu covariance giữa hai biến là 0, điều này có nghĩa là gì?
  - $\bullet\,$  A: Hai biến độc lập với nhau.
  - B: Không có mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
  - C: Có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo giữa hai biến.
  - $\bullet\,$  D: Một biến là hằng số.

#### Đáp án: B

4. Nếu correlation giữa hai biến là 1, điều này có nghĩa là gì?

- A: Hai biến hoàn toàn độc lập.
- B: Hai biến có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo và cùng chiều.
- C: Hai biến có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo và ngược chiều.
- D: Không có mối quan hệ giữa hai biến.

#### Đáp án: B

- 5. Correlation coefficient có giá trị nằm trong khoảng nào?
  - A: -2 đến 2
  - B: -1 đến 1
  - C: 0 đến 1
  - D: -1 đến 0

#### Đáp án: B

- 6. Nếu correlation giữa hai biến là -0.8, điều này có nghĩa là gì?
  - A: Hai biến có mối quan hệ tuyến tính mạnh và cùng chiều.
  - B: Hai biến có mối quan hệ tuyến tính yếu và cùng chiều.
  - C: Hai biến có mối quan hệ tuyến tính mạnh và ngược chiều.
  - D: Hai biến không có mối quan hệ.

## Đáp án: C

- 7. Cho biết X và Y là hai biến số, công thức tính covariance là gì?
  - A: Cov(X, Y) = E[(X E[X])(Y E[Y])]
  - B: Cov(X, Y) = E[X + Y]
  - C:  $Cov(X, Y) = E[X \times Y]$
  - D: Cov(X, Y) = E[(X E[Y])(Y E[X])]

## Đáp án: A

- 8. Cho biết covariance giữa X và Y là 10 và variances của X và Y lần lượt là 4 và 5, tìm correlation giữa X và Y.
  - A: 0.5
  - B: 1
  - C: 0.75
  - D: 0.6

#### Đáp án: D

- 9. Correlation giữa X và Y là 0.6, và variances của X và Y lần lượt là 9 và 16, tìm covariance giữa X và Y.
  - A: 7.2
  - B: 8.64
  - C: 14.4
  - D: 6.4

#### Đáp án: A

- 10. Nếu covariance giữa X và Y là 0, điều này có nghĩa là gì?
  - A: Hai biến hoàn toàn độc lập.
  - B: Hai biến không có mối quan hệ tuyến tính.
  - C: Hai biến có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo.
  - D: Môt biến là hằng số.

#### Đáp án: B

# Phần 2: Bài Tập Code

## Bài Tập 1: Xác Suất Cơ Bản

Viết một hàm Python để tính xác suất của một sự kiện dựa trên số lần sự kiện xảy ra và tổng số lần thử nghiệm.

```
def calculate_probability(event_occurrences, total_trials):
    """

Tinh xác suất của một sự kiện.

Parameters:
    event_occurrences (int): Số lần sự kiện xảy ra.

total_trials (int): Tổng số lần thử nghiệm.

Returns:
    float: Xác suất của sự kiện.
    """
    # Your code here #

# Ví dụ sử dụng
event_occurrences = 5
total_trials = 20
probability = calculate_probability(event_occurrences, total_trials)
print(f"Xác suất của sự kiện là: {probability}")
```

Listing 1: calculate probability

## Bài Tập 2: Xác Suất Có Điều Kiện

Viết một hàm Python để tính xác suất có điều kiện P(B|A).

```
def calculate_conditional_probability(P_A_and_B, P_A):
    """

Tinh xác suất có điều kiện P(B|A).

Parameters:
P_A_and_B (float): Xác suất của sự kiện A và B xảy ra.

P_A (float): Xác suất của sự kiện A.

Returns:
float: Xác suất có điều kiện P(B|A).
"""
# Your code here #

# Ví dụ sử dụng
P_A_and_B = 0.2
P_A = 0.5
P_B_given_A = calculate_conditional_probability(P_A_and_B, P_A)
print(f"Xác suất có điều kiện P(B|A) là: {P_B_given_A}")
```

Listing 2: calculate conditional probability

### Bài Tập 3: Covariance và Correlation

Viết một hàm Python để tính covariance và correlation giữa hai biến số.

```
1 import numpy as np
3 def calculate_covariance(X, Y):
      0.00
     Tính covariance giữa hai biến X và Y.
     Parameters:
     X (list): Danh sách các giá trị của biến X.
      Y (list): Danh sách các giá trị của biến Y.
9
     Returns:
      float: Covariance giữa X và Y.
      return # Your code here #
14
def calculate_correlation(X, Y):
      Tính correlation giữa hai biến X và Y.
     Parameters:
      X (list): Danh sách các giá trị của biến X.
      Y (list): Danh sách các giá trị của biến Y.
23
      Returns:
```

```
float: Correlation giữa X và Y.
"""

return # Your code here #

Ví dụ sử dụng

X = [2, 4, 6, 8, 10]

Y = [1, 3, 5, 7, 9]

covariance = calculate_covariance(X, Y)

correlation = calculate_correlation(X, Y)

print(f"Covariance giữa X và Y là: {covariance}")

print(f"Correlation giữa X và Y là: {correlation}")
```

Listing 3: calculate\_covariance\_and\_correlation