Lambda Calculus

Definição

Prof. Edson Alves

Faculdade UnB Gama

2020

Sumário

Características do lambda calculus

- O λ calculus (cálculo λ) pode ser chamada "*a menor linguagem de programação do mundo*"
- Ele consiste apenas em uma regra de transformação e um esquema de definição de funções
- Foi proposto do Alonzo Church na década de 1930, como uma maneira de formalizar a noção de computabilidade
- Qualquer função computável pode ser expressa e avaliada através do cálculo λ, de modo que ele é equivalente às máquinas de Turin
- Ao contrário das máquinas de Turin, o foco é o uso das regras de transformações, sendo mais próximo do software do que do hardware

Cálculo λ

Termos-λ

O conjunto Λ dos termos-λ (ou expressões-λ, ou simplesmente lambdas) é definido por meio de um conjunto de variáveis V através das regras de aplicação e abstração, dadas a seguir:

1. $x \in V \Rightarrow x \in \Lambda$ (expressão)
2. $M, N \in V \Rightarrow MN \in \Lambda$ (aplicação)
3. $M \in \Lambda, x \in V \Rightarrow \lambda x.M$ (abstração)

Observação: informalmente, a aplicação equivale ao cálculo da função M com argumento N, isto é $M(N)$; a abstração corresponde a definição da função $f(x) = M$.

Exemplos de termos-λ

1. O termo-λ mais simples possível é composto por uma única variável (por exemplo, x)
2. A função identidade $\lambda x.x$ é um exemplo de abstração
3. Parêntesis podem ser utilizados para clarificar uma expressão, ou para remover ambiguidades
4. O termo $(\lambda x.x)y$ é a aplicação da função identidade ao termo y
5. A aplicação é associativa à esquerda:

$$M_1 M_2 \ldots M_N = (((M_1 M_2) M_3) \ldots M_N)$$

6. O termo $\lambda y.(\lambda x.M)$ equivale a uma função de duas variáveis
7. Uma notação alternativa para o termo anterior é

$$\lambda yx.M = \lambda y.(\lambda x.M)$$

8. A abstração é associativa à direita:

$$\lambda x_1 x_2 \ldots x_N.M = \lambda x_1.(\lambda x_2.(\ldots \lambda x_N.M))$$

Variáveis livres e atadas (*bound*)

- A abstração $\lambda x.M$ une (ata, *to bind*) a variável livre x ao termo (expressão) lambda M
- Uma variável não precedida por um símbolo λ que a une a uma expressão é denominada variável **livre**
- Na expressão
$$\lambda x.xy$$
a variável x é atada e a variável y é livre
- Uma mesma variável pode ser livre e atada em uma mesma expressão. Por exemplo, na expressão
$$(\lambda x.xy)(\lambda y.y)$$
a variável y é livre no termo entre parêntesis à esquerda, e atada no termo da direita

Substituições

Substituição

A **substituição** de todas as ocorrências da variável livre x por N em M, cuja notação é $M[x := N]$, é definida por

i. $x[x := N] \equiv N$

ii. $y[x := N] \equiv y$, se $y \not\equiv x$

iii. $(M_1 M_2)[x := N] \equiv (M_1[x := N])(M_2[x := N])$

iv. $(\lambda y.M_1)[x := N] \equiv \lambda y.(M_1[x := N])$

Exemplos de substituição

1. Exemplo de substituição pela regra 3:

$$((\lambda x.xyz)(\lambda y.xzy))[z := N] \equiv (\lambda x.xyN)(\lambda y.xNy)$$

2. Exemplo de substituição pela regra 4:

$$(\lambda x.xy)[y := N] \equiv \lambda x.xN$$

3. Exemplo de substituição pelas regras 2 e 4:

$$(\lambda x.xy)[z := N] \equiv \lambda x.xy$$

4. $(\lambda x.xy)[x := N]$ não é uma expressão lambda válida, pois as substituições devem ser feitas em termos de variáveis livres, e x é atada na expressão entre parêntesis

Operações de Redução

Axiomas de Redução

1. A conversão-α permite a troca das variáveis atadas de uma expressão:
$$\lambda x.M \equiv \lambda y.(M[x := y])$$
2. A redução-β associa a aplicação com a substituição:
$$(\lambda x.M)N \equiv M[x := N]$$

Observação: a conversão-α é utilizada, primariamente, para evitar colisões de nomes; a redução-β é o axioma fundamental do cálculo λ.

Referências

1. **ROJAS**, Raúl. *A Tutorial Introduction to the Lambda Calculus*, FU Berlin, WS-97/98.
2. **BARENDREGT**, Henk; **BARENDSEN**, Erik. *Introduction to Lambda Calculus*, March 2000.
3. Wikipédia. Lambda calculus, acesso em 03/01/2020.