
EDIÇÃO CONDENSADA EM PORTUGUÊS

Cálculo I

Funções · Limites · Derivadas · Integrais

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \qquad \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$



Baseado em *Calculus Volume 1*, de Gilbert Strang e Edwin "Jed" Herman

Access for free at openstax.org

Créditos e licença

Este livro é uma obra derivada de *Calculus Volume 1*, de Gilbert Strang e Edwin "Jed" Herman, publicado pela OpenStax (Rice University) em 2016 e disponível gratuitamente em `https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1`. A obra original é licenciada sob a Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Alterações feitas nesta versão: tradução para o português; condensação do texto (redução de explicações, exemplos e figuras para cerca de 150 páginas); reorganização de algumas passagens; remoção dos pontos de verificação, dos projetos e da maior parte dos exercícios. Ao fim de cada capítulo há uma seleção de exercícios do original, traduzidos, com soluções e animações novas publicadas no repositório do livro. Várias figuras foram redesenhadas em português; as demais são as do original, e algumas mantêm rótulos internos em inglês. No texto, os decimais usam vírgula, no padrão brasileiro.

Esta versão não é endossada pela OpenStax nem pela Rice University. Os nomes e logotipos OpenStax e Rice University são marcas registradas e não fazem parte da licença. Esta adaptação é distribuída sob a mesma licença CC BY-NC-SA 4.0, apenas para uso não comercial.

Sumário

1 Funções e gráficos **1**

1.1 Revisão de funções . . . 1

Funções . . . 1

Representações de uma função . . . 2

Combinação e composição de funções . . . 3

Simetria . . . 4

1.2 Classes básicas de funções . . . 5

Funções afins e inclinação . . . 5

Polinômios . . . 5

Funções algébricas e transcendentes . . . 6

Funções definidas por partes . . . 6

Transformações de funções . . . 7

1.3 Funções trigonométricas . . . 7

Radianos . . . 8

As seis funções trigonométricas . . . 8

Identidades trigonométricas . . . 9

Gráficos e períodos . . . 9

1.4 Funções inversas . . . 11

Existência da inversa . . . 11

Funções trigonométricas inversas . . . 12

1.5 Funções exponenciais e logarítmicas . . . 13

Funções exponenciais . . . 13

O número e . . . 14

Funções logarítmicas . . . 14

Funções hiperbólicas . . . 15

Resumo do capítulo . . . 16

Exercícios . . . 17

2 Limites **22**

2.1 Uma prévia do Cálculo . . . 22

O problema da tangente . . . 22

O problema da área . . . 23
2.2 O limite de uma função . . . 23
Definição intuitiva . . . 23
Quando o limite não existe . . . 24
Limites laterais . . . 25
Limites infinitos . . . 26
2.3 As propriedades dos limites . . . 27
Calculando limites com as propriedades . . . 27
A forma indeterminada $0/0$ . . . 27
O Teorema do Confronto . . . 28
2.4 Continuidade . . . 29
Continuidade em um ponto . . . 29
Tipos de descontinuidade . . . 30
Continuidade em um intervalo . . . 31
O Teorema do Valor Intermediário . . . 31
2.5 A definição precisa de limite . . . 32
Quantificando a proximidade . . . 32
Provando as propriedades dos limites . . . 33
Limites laterais e infinitos . . . 33
Resumo do capítulo . . . 33
Exercícios . . . 34

CAPÍTULO 1

Funções e gráficos

O Cálculo é a matemática que descreve como as funções variam. Neste capítulo revisamos todas as funções necessárias ao estudo do Cálculo: polinomiais, racionais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas. Vemos como avaliá-las, as propriedades dos seus gráficos e as técnicas algébricas para resolver equações que as envolvem. É a base de tudo o que vem depois; convém dominá-la antes da introdução formal do Cálculo, no próximo capítulo.

1.1 Revisão de funções

Funções

Dados dois conjuntos A e B, um conjunto de pares ordenados (x, y) com $x \in A$ e $y \in B$ é uma *relação* de A em B. Uma função é um tipo especial de relação, em que cada elemento do primeiro conjunto está associado a *exatamente um* elemento do segundo. O elemento do primeiro conjunto é a *entrada*; o do segundo, a *saída*. Quando conhecemos a entrada, a saída fica determinada; por isso dizemos que a saída é função da entrada. A área de um quadrado, por exemplo, é função do comprimento do lado.

Definição

Uma **função** f consiste em um conjunto de entradas, um conjunto de saídas e uma regra que associa cada entrada a exatamente uma saída. O conjunto de entradas é o **domínio** da função; o conjunto de saídas é a **imagem**.

Para uma função f com domínio D, costumamos usar x para a entrada e y para a saída, e escrevemos $y = f(x)$ (lê-se "y é igual a f de x"). Chamamos x de *variável independente* e y de *variável dependente*. Uma entrada só pode ser enviada a uma saída, mas duas entradas diferentes podem ser enviadas à mesma saída (Figura 1.1).




Figura 1.1 Uma função associa cada elemento do domínio a exatamente um elemento da imagem. Entradas diferentes (aqui, 3 e 4) podem ter a mesma saída.

O **gráfico** de f é o conjunto dos pontos $(x, f(x))$ do plano, com x no domínio. Quando uma função é dada apenas por uma fórmula, sem domínio explícito, o domínio é o conjunto de todos os reais x para os quais $f(x)$ é um número real; é o chamado *domínio natural*. Assim, o domínio de $f(x) = x^2$ é $\mathbb{R}$, e o de $f(x) = \sqrt{x}$ é o conjunto dos reais não negativos.

Notação. Usamos a notação de conjuntos, como $\{\, x \mid 1 < x < 5 \,\}$, e a de intervalos:

$$(1,5) = \{\, x \mid 1 < x < 5 \,\}, \quad [1,5] = \{\, x \mid 1 \le x \le 5 \,\}, \quad [0,\infty) = \{\, x \mid x \ge 0 \,\}, \quad (-\infty,\infty) = \mathbb{R}.$$

O símbolo ∞ não é um número real; indica apenas que o conjunto não tem limitação naquela direção.

Algumas funções são **definidas por partes**, com fórmulas diferentes em diferentes partes do domínio. Por exemplo,

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & x \ge 2 \\ x^2, & x < 2 \end{cases}$$

dá $f(5) = 3(5) + 1 = 16$ e $f(-1) = (-1)^2 = 1$.

Exemplo 1.1 — Determinando domínio e imagem

Determine o domínio e a imagem de (a) $f(x) = (x-4)^2 + 5$; (b) $f(x) = \sqrt{3x+2} - 1$; (c) $f(x) = \dfrac{3}{x-2}$.

Solução

(a) $f(x)$ é real para todo x, logo o domínio é $(-\infty,\infty)$. Como $(x-4)^2 \ge 0$, temos $f(x) \ge 5$. Para todo $y \ge 5$, a equação $(x-4)^2 + 5 = y$ tem solução $x = 4 \pm \sqrt{y-5}$; logo a imagem é $\{\, y \mid y \ge 5 \,\}$.

(b) Precisamos de $3x + 2 \ge 0$, ou seja, domínio $\{\, x \mid x \ge -2/3 \,\}$. Como $\sqrt{3x+2} \ge 0$, temos $f(x) \ge -1$. Dado $y \ge -1$, de $\sqrt{3x+2} = y + 1$ vem $x = \frac{1}{3}(y+1)^2 - \frac{2}{3} \ge -\frac{2}{3}$, que está no domínio. A imagem é $\{\, y \mid y \ge -1 \,\}$.

(c) O denominador não pode se anular: domínio $\{\, x \mid x \ne 2 \,\}$. De $3/(x-2) = y$ vem $x = 3/y + 2$, possível sempre que $y \ne 0$. A imagem é $\{\, y \mid y \ne 0 \,\}$.

Representações de uma função

Uma função pode ser representada por uma *tabela*, um *gráfico* ou uma *fórmula*, e muitas vezes usamos as três juntas: marcamos no gráfico os valores de uma tabela, ou construímos uma tabela a partir de uma fórmula.

Os valores de x com $f(x) = 0$ são os **zeros** da função; eles indicam onde o gráfico corta o eixo x. O **intercepto** y, se existir, é o ponto $(0, f(0))$. Como cada entrada tem uma única saída, cada reta vertical $x = c$ corta o gráfico no máximo uma vez.

Regra: teste da reta vertical

Dada uma função f, toda reta vertical corta o gráfico de f no máximo uma vez. Se alguma reta vertical corta um conjunto de pontos mais de uma vez, esse conjunto não é gráfico de uma função.




Figura 1.2 (a) Gráfico de uma função: toda reta vertical o corta no máximo uma vez. (b) Não é gráfico de função: algumas retas verticais o cortam mais de uma vez.

Dizemos que f é **crescente** em um intervalo I se $f(x_1) \le f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$ em I, e **estritamente crescente** se $f(x_1) < f(x_2)$. Analogamente, f é **decrescente** se $f(x_1) \ge f(x_2)$ e **estritamente decrescente** se $f(x_1) > f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$. Por exemplo, $f(x) = 3x$ é crescente em $\mathbb{R}$, e $f(x) = -x^3$ é estritamente decrescente em $\mathbb{R}$.

Combinação e composição de funções

Dadas f e g, definimos a soma, a diferença, o produto e o quociente:

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \qquad (f \cdot g)(x) = f(x)\,g(x), \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ se } g(x) \neq 0.$$

Por exemplo, com $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = x^2 - 1$, temos $(f/g)(x) = \dfrac{2x-3}{x^2-1}$, com domínio $\{\, x \mid x \neq \pm 1 \,\}$.

Também podemos aplicar uma função ao resultado de outra. Se o custo C de aquecer um prédio depende da temperatura T, e a temperatura depende da hora t, então o custo como função do tempo é $C(T(t))$.

Definição

Sejam f uma função com domínio A e imagem B, e g uma função com domínio D e imagem E. Se $B \subseteq D$, a **função composta** $g \circ f$ é a função com domínio A dada por

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big).$$

Exemplo 1.2 — Composição de funções dadas por fórmulas

Sejam $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = 1/x$. Encontre $g \circ f$ e $f \circ g$, com domínio e imagem.

Solução

$(g \circ f)(x) = g(x^2+1) = \dfrac{1}{x^2+1}$. Como $x^2 + 1 \neq 0$ para todo x, o domínio é $\mathbb{R}$. Como $0 < 1/(x^2+1) \le 1$, e para cada $y \in (0, 1]$ a equação tem solução $x = \pm\sqrt{1/y - 1}$, a imagem é


$(0, 1]$.
$(f \circ g)(x) = f(1/x) = \dfrac{1}{x^2} + 1$, com domínio $\{\, x \mid x \neq 0 \,\}$. Resolvendo $(1/x)^2 + 1 = y$, obtemos $x = \pm 1/\sqrt{y-1}$, real se e somente se $y > 1$. A imagem é $\{\, y \mid y > 1 \,\}$.
Note que $f \circ g \neq g \circ f$: a ordem da composição importa.

Simetria

Se $f(-x) = f(x)$, o ponto $(-x, y)$ está no gráfico sempre que (x, y) está, e o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Se $f(-x) = -f(x)$, o gráfico é simétrico em relação à origem: girá-lo 180° em torno da origem não o altera.

Definição

Se $f(-x) = f(x)$ para todo x do domínio, f é uma **função par** (simétrica em relação ao eixo y). Se $f(-x) = -f(x)$ para todo x do domínio, f é uma **função ímpar** (simétrica em relação à origem).



(a) Symmetry about the *y*-axis (b) Symmetry about the origin

Figura 1.3 (a) $f(x) = x^4 - 2x^2 - 3$ é par: simetria em relação ao eixo y. (b) $f(x) = x^3 - 4x$ é ímpar: simetria em relação à origem.

Exemplo 1.3 — Funções pares e ímpares

Classifique: (a) $f(x) = -5x^4 + 7x^2 - 2$; (b) $f(x) = 2x^5 - 4x + 5$; (c) $f(x) = \dfrac{3x}{x^2+1}$.

Solução
Calculamos $f(-x)$ e comparamos com $f(x)$ e $-f(x)$. (a) $f(-x) = -5x^4 + 7x^2 - 2 = f(x)$: par. (b) $f(-x) = -2x^5 + 4x + 5$, que não é $f(x)$ nem $-f(x) = -2x^5 + 4x - 5$: nem par nem ímpar. (c) $f(-x) = \dfrac{-3x}{x^2+1} = -f(x)$: ímpar.

A **função valor absoluto** é

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Sua imagem é $\{\, y \mid y \geq 0 \,\}$, e ela é par. Por exemplo, $f(x) = 2|x-3| + 4$ tem domínio $\mathbb{R}$ e, como $|x-3| \geq 0$, imagem $\{\, y \mid y \geq 4 \,\}$.

1.2 Classes básicas de funções

Funções afins e inclinação

Uma **função afim** (ou linear) tem a forma $f(x) = mx + b$, e seu gráfico é uma reta. Para quaisquer dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) dessa reta, a razão entre a variação de y e a de x é sempre a mesma.

Definição

A **inclinação** da reta que passa por (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

A reta que passa por (x_1, y_1) com inclinação m tem **equação ponto-inclinação** $y - y_1 = m(x - x_1)$. A reta com inclinação m e intercepto $(0, b)$ tem equação $y = mx + b$ (forma **reduzida**). A **forma geral** $ax + by = c$, com a e b não ambos nulos, inclui também as retas verticais $x = k$.

Exemplo 1.4 — Inclinação e equação de uma reta

Encontre a reta que passa por $(11, -4)$ e $(-4, 5)$.

Solução

$m = \dfrac{5 - (-4)}{-4 - 11} = -\dfrac{9}{15} = -\dfrac{3}{5}$. Pelo ponto $(11, -4)$: $y + 4 = -\frac{3}{5}(x - 11)$, ou seja, $y = -\frac{3}{5}x + \frac{13}{5}$.

Polinômios

Um **polinômio** é uma função da forma $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, com n inteiro não negativo e $a_n \neq 0$; n é o *grau*. Polinômios de grau 0, 1, 2 e 3 são chamados constantes, afins, quadráticos e cúbicos. As **funções potência** $f(x) = ax^b$ incluem x^n, que é par para n par e ímpar para n ímpar.




Figura 1.4 (a) Para n par, ax^n é par. (b) Para n ímpar, ax^n é ímpar.

Comportamento no infinito. Para $|x|$ grande, o termo de maior grau domina. Se $a_n > 0$ e n é par, $f(x) \to \infty$ quando $x \to \pm\infty$; se n é ímpar, $f(x) \to \infty$ quando $x \to \infty$ e $f(x) \to -\infty$ quando $x \to -\infty$. Se $a_n < 0$, os sinais se invertem.

Zeros. Os zeros de polinômios de grau 1 e 2 se encontram diretamente; para grau maior, fatoramos quando possível.

Regra: fórmula quadrática

As soluções de $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$, são

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Se o discriminante $b^2 - 4ac$ é positivo, há duas soluções reais; se é nulo, uma; se é negativo, nenhuma.

Funções algébricas e transcendentes

Uma **função racional** é um quociente de polinômios, $f(x) = p(x)/q(x)$, definida onde $q(x) \neq 0$. As **funções algébricas** são as obtidas de polinômios por soma, subtração, multiplicação, divisão e extração de raízes; por exemplo, $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ e $g(x) = \sqrt[3]{x}/(1 - x^2)$. Para $f(x) = \sqrt[n]{x}$, o domínio é $[0, \infty)$ se n é par e $\mathbb{R}$ se n é ímpar. As funções que não são algébricas são as **transcendentes**: trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas.

Funções definidas por partes

Exemplo 1.5 — Gráfico de uma função definida por partes

Esboce $f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < 1 \\ (x-2)^2, & x \geq 1. \end{cases}$

Solução

Desenhamos a reta $y = x + 3$ em $(-\infty, 1)$ e a parábola $y = (x-2)^2$ em $[1, \infty)$. Como $f(1) = (1-2)^2 = 1$, marcamos uma bola cheia em $(1, 1)$. A reta se aproxima de $(1, 4)$ sem atingi-lo: marcamos ali uma bola vazia.




Figura 1.5 Função afim para $x < 1$ e quadrática para $x \geq 1$.

Transformações de funções

A partir do gráfico de $y = f(x)$ obtemos outros sem novos cálculos. Para $c > 0$:

Função	Efeito sobre o gráfico de f
$f(x) + c$ / $f(x) - c$	translação vertical de c para cima / para baixo
$f(x + c)$ / $f(x - c)$	translação horizontal de c para a esquerda / para a direita
$c\,f(x)$	alongamento vertical se $c > 1$; compressão vertical se $0 < c < 1$
$f(cx)$	compressão horizontal se $c > 1$; alongamento horizontal se $0 < c < 1$
$-f(x)$	reflexão em relação ao eixo x
$f(-x)$	reflexão em relação ao eixo y




Figura 1.6 Translações dos gráficos de x^2 e $|x|$ (tracejados). À esquerda, verticais: $x^2 \pm 4$. À direita, horizontais: $|x + 3|$ desloca para a esquerda e $|x - 3|$, para a direita.

Exemplo 1.6 — Transformando uma função

Esboce (a) $f(x) = -|x + 2| - 3$ e (b) $f(x) = 3\sqrt{-x} + 1$.

Solução

(a) Partindo de $y = |x|$: translação de 2 unidades para a esquerda, reflexão em relação ao eixo x e translação de 3 unidades para baixo. (b) Partindo de $y = \sqrt{x}$: reflexão em relação ao eixo y, alongamento vertical por um fator 3 e translação de 1 unidade para cima.



Figura 1.7 As funções (a) e (b) como sequências de três transformações de $|x|$ e de $\sqrt{x}$.

1.3 Funções trigonométricas

Access for free at openstax.org

Radianos

No Cálculo, os ângulos são medidos em **radianos**. A medida em radianos de um ângulo θ é o comprimento s do arco que ele determina no círculo unitário. Como a circunferência unitária mede 2π, temos 2π rad $= 360°$, ou seja,

$$1 \text{ rad} = \frac{180°}{\pi} \approx 57{,}3°, \qquad 1° = \frac{\pi}{180} \text{ rad}.$$

Assim, $225° = 225 \cdot \pi/180 = 5\pi/4$ rad, e $5\pi/3$ rad $= 300°$.

As seis funções trigonométricas

Definição

Seja $P = (x, y)$ um ponto do círculo unitário centrado na origem O, e θ o ângulo com lado inicial no semieixo x positivo e lado final OP. Então

$$\sin\theta = y, \quad \cos\theta = x, \quad \tan\theta = \frac{y}{x}, \quad \csc\theta = \frac{1}{y}, \quad \sec\theta = \frac{1}{x}, \quad \cot\theta = \frac{x}{y}.$$

Se $x = 0$, $\sec\theta$ e $\tan\theta$ não estão definidas; se $y = 0$, $\cot\theta$ e $\csc\theta$ não estão definidas.




Figura 1.8 O ângulo θ na posição padrão. Os valores das funções trigonométricas são dados pelas coordenadas x e y de P.

Em um círculo de raio r, as coordenadas de um ponto satisfazem $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$. Em um triângulo retângulo com ângulo agudo θ, isso dá as razões conhecidas: $\sin\theta$ = cateto oposto/hipotenusa, $\cos\theta$ = cateto adjacente/hipotenusa e $\tan\theta$ = oposto/adjacente.

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin\theta$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan\theta$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	não definida

Identidades trigonométricas

Regra: identidades trigonométricas

Recíprocas: $\cot\theta = \dfrac{1}{\tan\theta}$, $\csc\theta = \dfrac{1}{\sin\theta}$, $\sec\theta = \dfrac{1}{\cos\theta}$.
De razão: $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$, $\cot\theta = \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}$.
Pitagóricas: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$, $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$.
Adição e subtração: $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$, $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$.
Ângulo duplo: $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$, $\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$.

Exemplo 1.7 — Resolvendo equações trigonométricas

Encontre todas as soluções de (a) $1 + \cos(2\theta) = \cos\theta$ e (b) $\sin(2\theta) = \tan\theta$.

Solução

(a) Pela fórmula do ângulo duplo, a equação equivale a $2\cos^2\theta - \cos\theta = 0$. Devemos *fatorar*, e não dividir por $\cos\theta$, que pode ser zero: $\cos\theta\,(2\cos\theta - 1) = 0$. Logo $\cos\theta = 0$ ou $\cos\theta = 1/2$, e as soluções são

$$\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi, \qquad \theta = \pm\frac{\pi}{3} + 2n\pi, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

(b) Escrevendo $2\sin\theta\cos\theta = \sin\theta/\cos\theta$ e multiplicando por $\cos\theta$, obtemos $\sin\theta\,(2\cos^2\theta - 1) = 0$. Como multiplicamos por $\cos\theta$, que poderia ser nulo, é preciso descartar soluções estranhas no fim. Temos $\sin\theta = 0$ ou $\cos^2\theta = 1/2$, e as soluções são $\theta = n\pi$ e $\theta = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{n\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

Gráficos e períodos

Uma função f é **periódica** se existe $P > 0$ tal que $f(x + P) = f(x)$ para todo x; o menor desses P é o **período**. Seno, cosseno, secante e cossecante têm período 2π; tangente e cotangente têm período π.




Figura 1.9 As seis funções trigonométricas. Seno, cosseno, secante e cossecante têm período 2π; tangente e cotangente, período π. Tracejado: assíntotas verticais.

Para $f(x) = A\sin\big(B(x-\alpha)\big) + C$ (ou com cosseno), $|A|$ é a **amplitude**, o período é $2\pi/|B|$, α é a translação horizontal (*defasagem*) e C é a translação vertical.

Exemplo 1.8 — Esboçando uma senoide transformada

Esboce $f(x) = 3\sin\big(2(x - \frac{\pi}{4})\big) + 1$.

Solução

Compressão horizontal por fator 2, defasagem de $\pi/4$ para a direita, alongamento vertical por fator 3 e translação de 1 unidade para cima. Amplitude 3, período π.




Figura 1.10 Gráfico de $f(x) = 3\sin(2(x - \pi/4)) + 1$.

1.4 Funções inversas

Existência da inversa

Uma função "desfaz" a outra se, ao aplicarmos uma e depois a outra, voltamos à entrada.

Definição

Dada f com domínio D e imagem R, sua **função inversa** (se existir) é a função f^{-1} com domínio R e imagem D tal que $f^{-1}(y) = x$ se $f(x) = y$. Ou seja,

$$f^{-1}\big(f(x)\big) = x \text{ para todo } x \in D, \qquad f\big(f^{-1}(y)\big) = y \text{ para todo } y \in R.$$

Atenção

$f^{-1}(x)$ não significa $1/f(x)$. A notação indica a função inversa.

Para que f^{-1} seja função, cada saída de f deve vir de uma única entrada.

Definição

f é **injetora** se $f(x_1) \neq f(x_2)$ sempre que $x_1 \neq x_2$. Uma função tem inversa se, e somente se, é injetora.

Regra: teste da reta horizontal

Uma função f é injetora se, e somente se, toda reta horizontal corta o gráfico de f no máximo uma vez.




Figura 1.11 (a) x^2 não é injetora: falha no teste da reta horizontal. (b) x^3 é injetora.

Estratégia: encontrando a inversa

1. Resolva $y = f(x)$ para x, em função de y.
2. Troque as variáveis e escreva $y = f^{-1}(x)$.

Exemplo 1.9 — Encontrando uma inversa

Encontre a inversa de $f(x) = 3x - 4$.

Solução

De $y = 3x - 4$ vem $x = \frac{1}{3}y + \frac{4}{3}$; logo $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$, com domínio e imagem $\mathbb{R}$. Verificação: $f^{-1}(f(x)) = \frac{1}{3}(3x - 4) + \frac{4}{3} = x$.

Gráfico da inversa. Se (a, b) está no gráfico de f, então (b, a) está no de f^{-1}. Portanto o gráfico de f^{-1} é a reflexão do gráfico de f em relação à reta $y = x$.




Figura 1.12 (a) O ponto (a, b) no gráfico de f. (b) O ponto (b, a) no gráfico de f^{-1}: os gráficos são simétricos em relação a $y = x$.

Restrição de domínio. Uma função que não é injetora pode ter inversa em um domínio menor. Assim, x^2 restrita a $[0, \infty)$ tem inversa $\sqrt{x}$.

Exemplo 1.10 — Restringindo o domínio

$f(x) = (x + 1)^2$ não é injetora (é x^2 transladada 1 unidade para a esquerda). Em $[-1, \infty)$ ela é injetora, com imagem $[0, \infty)$. Resolvendo $y = (x + 1)^2$, vem $x = -1 \pm \sqrt{y}$; como $x \geq -1$, escolhemos o sinal $+$. Logo $f^{-1}(x) = -1 + \sqrt{x}$, com domínio $[0, \infty)$ e imagem $[-1, \infty)$.

Funções trigonométricas inversas

As funções trigonométricas não são injetoras, pois são periódicas. Restringindo o domínio, obtemos as inversas.

Definição

Para $-1 \leq x \leq 1$:

$$\operatorname{sin}^{-1} x = y \iff \operatorname{sin} y = x \text{ e } -\tfrac{\pi}{2} \leq y \leq \tfrac{\pi}{2}; \qquad \operatorname{cos}^{-1} x = y \iff \operatorname{cos} y = x \text{ e } 0 \leq y \leq \pi.$$

Para todo x real:

$$\operatorname{tan}^{-1} x = y \iff \operatorname{tan} y = x \text{ e } -\tfrac{\pi}{2} < y < \tfrac{\pi}{2}; \qquad \operatorname{cot}^{-1} x = y \iff \operatorname{cot} y = x \text{ e } 0 < y < \pi.$$

Para $|x| \geq 1$, definem-se de modo análogo $\operatorname{csc}^{-1} x$ (com $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $y \neq 0$) e $\operatorname{sec}^{-1} x$ (com $0 \leq y \leq \pi$, $y \neq \frac{\pi}{2}$). Também se escreve arcsin, arccos, arctan etc.




Figura 1.13 Cada inversa trigonométrica (em azul) é a reflexão, em relação à reta $y = x$ (pontilhada), da função trigonométrica restrita (em laranja): sin em $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, cos em $[0, \pi]$ e tan em $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. As demais inversas são obtidas do mesmo modo.

Exemplo 1.11 — Avaliando inversas trigonométricas

(a) $\sin^{-1}(-\sqrt{3}/2)$: o ângulo em $[-\pi/2, \pi/2]$ com seno $-\sqrt{3}/2$ é $-\pi/3$.
(b) $\cos^{-1}(\cos(5\pi/4)) = \cos^{-1}(-\sqrt{2}/2) = 3\pi/4$, e *não* $5\pi/4$, pois $\cos^{-1}$ toma valores em $[0, \pi]$.
(c) $\sin^{-1}(\cos(2\pi/3)) = \sin^{-1}(-1/2) = -\pi/6$.

1.5 Funções exponenciais e logarítmicas

Funções exponenciais

Se uma população começa com P_0 indivíduos e cresce à taxa anual r, após t anos ela tem $P(t) = P_0(1 + r)^t$ indivíduos. Esse é um exemplo de **função exponencial**: uma função da forma $f(x) = b^x$, com $b > 0$ e $b \neq 1$. Seu domínio é $\mathbb{R}$ e sua imagem é $(0, \infty)$. Se $b > 1$, b^x é crescente; se $0 < b < 1$, é decrescente. A exponencial cresce muito mais rapidamente que qualquer potência: 2^x supera x^2 para x grande.




Figura 1.14 b^x é crescente se $b > 1$ e decrescente se $0 < b < 1$.

Regra: leis dos expoentes

Para $a > 0$, $b > 0$ e quaisquer x, y:

$$b^x b^y = b^{x+y}, \quad \frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}, \quad (b^x)^y = b^{xy}, \quad (ab)^x = a^x b^x, \quad \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x.$$

O número e

Se investimos P reais a juros anuais r capitalizados n vezes por ano, após t anos temos $P(1+r/n)^{nt}$. Quando n cresce (capitalização cada vez mais frequente), a quantidade $(1+1/m)^m$ se aproxima de um número fixo,

$$e \approx 2{,}718282,$$

e o montante tende a Pe^{rt} (*capitalização contínua*). O número e é irracional. A função $f(x) = e^x$ é a **exponencial natural**. Ela é a única exponencial cujo gráfico tem reta tangente de inclinação exatamente 1 em $x = 0$, fato que tornará as derivadas e integrais de e^x especialmente simples.

Funções logarítmicas

Como b^x é injetora, ela tem inversa: o **logaritmo na base** b,

$$\log_b x = y \iff b^y = x, \qquad x > 0.$$

Seu domínio é $(0,\infty)$ e sua imagem é $\mathbb{R}$. Escrevemos $\ln x = \log_e x$ (**logaritmo natural**). Como inversas, $b^{\log_b x} = x$ para $x > 0$ e $\log_b(b^x) = x$ para todo x; em particular, $e^{\ln x} = x$ e $\ln(e^x) = x$.




Figura 1.15 $y = e^x$ e $y = \ln x$ são inversas: seus gráficos são simétricos em relação a $y = x$.

Regra: propriedades dos logaritmos

Se $a, b, c > 0$, $b \neq 1$ e $r \in \mathbb{R}$:

$$\log_b(ac) = \log_b a + \log_b c, \qquad \log_b\left(\frac{a}{c}\right) = \log_b a - \log_b c, \qquad \log_b(a^r) = r\log_b a.$$

Exemplo 1.12 — Equações exponenciais e logarítmicas

(a) $5^x = 2$. Aplicando ln: $x\ln 5 = \ln 2$, logo $x = \ln 2/\ln 5$.
(b) $e^x + 6e^{-x} = 5$. Multiplicando por e^x: $(e^x)^2 - 5e^x + 6 = 0$, isto é, $(e^x-3)(e^x-2) = 0$. Logo $x = \ln 3$ ou $x = \ln 2$.
(c) $\log_{10}\sqrt{x} + \log_{10} x = 2$. O lado esquerdo é $\log_{10} x^{3/2} = \frac{3}{2}\log_{10} x$; logo $\log_{10} x = 4/3$ e $x = 10^{4/3} = 10\sqrt[3]{10}$.

Regra: mudança de base

Para $a, b > 0$ com $a, b \neq 1$:

$$a^x = b^{x \log_b a} \ \text{(em particular } a^x = e^{x \ln a}\text{)}, \qquad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \ \text{(em particular } \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}\text{)}.$$

Graças a essas fórmulas, basta saber derivar e integrar e^x e $\ln x$ para lidar com qualquer base.

Exemplo 1.13 — A escala Richter

Na escala Richter, de base 10, dois terremotos de magnitudes R_1 e R_2 e amplitudes A_1 e A_2 satisfazem

$$R_1 - R_2 = \log_{10}\left(\frac{A_1}{A_2}\right).$$

Assim, um terremoto de magnitude 8 é 10 vezes mais intenso que um de magnitude 7, e 100 vezes mais intenso que um de magnitude 6. Comparemos o terremoto do Japão (2011, magnitude 9) com o do Haiti (2010, magnitude 7,3).

Solução

$9 - 7{,}3 = \log_{10}(A_1/A_2)$, logo $A_1/A_2 = 10^{1{,}7} \approx 50$. O terremoto do Japão foi cerca de 50 vezes mais intenso.

Funções hiperbólicas

Certas combinações de e^x e e^{-x} aparecem com frequência. A forma de um cabo ou corrente suspensa pelas extremidades, sob o próprio peso (a *catenária*), é descrita por uma delas.

Definição

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}, \qquad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \qquad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}.$$

O nome vem da identidade $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$: o ponto $(\cosh t, \sinh t)$ percorre a hipérbole $x^2 - y^2 = 1$, assim como $(\cos t, \sin t)$ percorre o círculo $x^2 + y^2 = 1$.




Figura 1.16 As funções hiperbólicas. Em cinza tracejado, $\pm\frac{1}{2}e^{\pm x}$: para $|x|$ grande, $\cosh x$ e $\sinh x$ se comportam como $\frac{1}{2}e^{|x|}$. Em laranja, as assíntotas $y = \pm 1$ de tanh e coth.

Regra: identidades hiperbólicas

$\cosh(-x) = \cosh x$, $\sinh(-x) = -\sinh x$ $\cosh x + \sinh x = e^x$, $\cosh x - \sinh x = e^{-x}$
$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$, $\coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$
$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$, $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$

Exemplo 1.14 — Avaliando funções hiperbólicas

Se $\sinh x = 3/4$, então $\cosh^2 x = 1 + (3/4)^2 = 25/16$; como $\cosh x \geq 1$, temos $\cosh x = 5/4$. Daí $\tanh x = 3/5$, $\operatorname{csch} x = 4/3$, $\operatorname{sech} x = 4/5$ e $\coth x = 5/3$.

Inversas hiperbólicas. Como as hiperbólicas são combinações de exponenciais, suas inversas se escrevem com logaritmos:

$$\sinh^{-1} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right), \qquad \cosh^{-1} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)\ (x \geq 1),$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\ (|x| < 1).$$

Resumo do capítulo

- Uma função associa a cada entrada exatamente uma saída. Sem domínio explícito, o domínio é o conjunto dos x em que a fórmula define um número real.
- Teste da reta vertical: um gráfico de função é cortado no máximo uma vez por cada reta vertical. Uma função tem quantos zeros quiser, mas no máximo um intercepto y.
- Para definir $g \circ f$, a imagem de f deve estar contida no domínio de g; em geral $f \circ g \neq g \circ f$.
- Funções pares são simétricas em relação ao eixo y; ímpares, em relação à origem.
- A inclinação $m = \Delta y/\Delta x$ é a taxa de variação constante de uma função afim.

- Translações, alongamentos, compressões e reflexões transformam gráficos conhecidos.
- Ângulos em radianos: π rad $= 180°$. Seno e cosseno têm período 2π; tangente, período π.
- Uma função tem inversa se, e somente se, é injetora; o gráfico de f^{-1} é o reflexo do de f em $y = x$. Restringindo o domínio, obtêm-se as inversas trigonométricas.
- b^x e $\log_b x$ são inversas; $\ln x = \log_e x$. Qualquer base se reduz à base e.
- $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$, $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$ e $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap1/README.md. As respostas estão no fim do capítulo.

- **1.1** Esboce o gráfico de $f(x) = |x - 2| - 1$, indicando o vértice, os zeros e o intercepto y.
- **1.2** Determine domínio, imagem, zeros e intercepto y de $f(x) = \sqrt{x + 3} - 1$ e esboce o gráfico a partir de $y = \sqrt{x}$.
- **1.3** Determine o domínio de $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$ por estudo de sinais.
- **1.4** Determine o domínio e a imagem de $f(x) = \ln(4 - x^2)$.
- **1.5** Esboce $f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x^2, & 0 \le x \le 2 \\ 6 - x, & x > 2 \end{cases}$. Qual é a imagem? Quantas soluções tem $f(x) = 3$?
- **1.6** Encontre os zeros de $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$, faça o estudo de sinais e esboce o gráfico.
- **1.7** Encontre a reta que passa por $(-1, 4)$ e é perpendicular a $2x - 3y = 6$.
- **1.8** Complete o quadrado em $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$, dê o vértice e os zeros e esboce a parábola.
- **1.9** Classifique como par, ímpar ou nenhuma: (a) $x^2 \cos x$; (b) $x \sin x$; (c) $\dfrac{x}{x^2 + 1}$; (d) $e^x - e^{-x}$; (e) $x^2 + x$.
- **1.10** Sejam $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = \sqrt{x - 1}$. Encontre $f \circ g$ e $g \circ f$ com os domínios. Por que as fórmulas são "quase" inversas?
- **1.11** Escreva $h(x) = \sqrt{1 + \cos^2 x}$ como composição de três funções mais simples.
- **1.12** Resolva $|2x - 3| \le 5$ e $|x + 1| > 2$, escrevendo as soluções em notação de intervalos.
- **1.13** Encontre todos os $\theta \in [0, 2\pi)$ com $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ e todos com $\tan\theta = \sqrt{3}$.
- **1.14** Esboce um período de $y = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, marcando amplitude, período, zeros e máximos.
- **1.15** Encontre a inversa de $f(x) = \dfrac{x + 1}{x - 2}$, com domínio e imagem, e confira que $f(f^{-1}(x)) = x$.

- **1.16** Calcule, desenhando um triângulo retângulo: $\sin\big(\cos^{-1}\frac{3}{5}\big)$, $\tan\big(\sin^{-1}(-\frac{1}{2})\big)$ e $\cos(\tan^{-1}2)$.
- **1.17** Simplifique (a) $\ln\big(e^2\sqrt{e}\big)$; (b) $\log_2\dfrac{8}{\sqrt{2}}$; (c) $e^{2\ln 3-\ln 2}$.
- **1.18** Resolva (a) $3^{2x-1}=27$; (b) $\log_3(x+1)=2$; (c) $5^x=2\cdot 3^x$.
- **1.19** Esboce $y=2^{-x}+1$ a partir de $y=2^x$, indicando a assíntota, o intercepto y e a imagem.
- **1.20** Esboce $y=-\ln(x-1)$ a partir de $y=\ln x$, indicando domínio, assíntota e zero.

•• **1.21** ★ **Composição e domínio.** Sejam $f(x)=\dfrac{3}{2x+1}$ e $g(x)=\dfrac{2}{x}$. Encontre $(f\circ g)(x)$ e $(g\circ f)(x)$ e determine o domínio de cada composta.

•• **1.22** Sejam $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$ e $g(x)=\dfrac{x+1}{x}$. Encontre $f\circ g$ e seu domínio. O resultado surpreende?

•• **1.23** Esboce $f(x)=x|x|$. Mostre que f é ímpar e injetora e encontre f^{-1}.

•• **1.24** Descreva as transformações que levam $y=x^2$ em $y=-(x+1)^2+3$ e dê o vértice da parábola.

•• **1.25** Determine o domínio e a imagem de $f(x)=\sqrt{4-x^2}$ e descreva seu gráfico.

•• **1.26** ★ **Custo e ponto de equilíbrio.** Uma confeitaria vende cupcakes em festivais. Montar a barraca custa R$ 125,00 e cada cupcake custa R$ 0,75 para ser produzido. (a) Escreva o custo total C em função do número x de cupcakes. (b) Quanto custa produzir 160 cupcakes? (c) Vendendo cada cupcake a R$ 1,50, quantos ela precisa vender para começar a ter lucro?

•• **1.27** Resolva $2\sin^2\theta-\sin\theta-1=0$ para $\theta\in[0,2\pi)$.

•• **1.28** ★ **Identidade trigonométrica.** Verifique a identidade $\dfrac{1}{1-\sin\alpha}+\dfrac{1}{1+\sin\alpha}=2\sec^2\alpha$.

•• **1.29** Verifique a identidade $\dfrac{\tan\theta-\cot\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\sec^2\theta-\csc^2\theta$.

•• **1.30** Escreva $3\cos t+4\sin t$ na forma $A\cos(t-\varphi)$, com $A>0$.

•• **1.31** Mostre que $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$ é injetora e encontre f^{-1}, com domínio e imagem.

•• **1.32** Restrinja o domínio de $f(x)=(x-2)^2$ para torná-la injetora e encontre a inversa.

•• **1.33** Calcule $\cos^{-1}\big(\cos\frac{5\pi}{3}\big)$, $\sin^{-1}\big(\sin\frac{3\pi}{4}\big)$ e $\tan\big(\cos^{-1}\frac{3}{5}\big)$.

•• **1.34** Resolva $\log_2 x+\log_2(x-2)=3$.

•• **1.35** Resolva $\ln(x+1)-\ln x=1$.

•• **1.36** Mostre que $f(x)=x^3+x$ é estritamente crescente (logo injetora) e calcule $f^{-1}(2)$ e $f^{-1}(10)$ sem achar a fórmula da inversa.

•• **1.37** ★ **Expressões hiperbólicas.** Reescreva em termos de exponenciais e simplifique: (a) $2\cosh(\ln x)$; (b) $\cosh 4x+\sinh 4x$; (c) $\cosh 2x-\sinh 2x$; (d) $\ln(\cosh x+\sinh x)+\ln(\cosh x-\sinh x)$.

•• **1.38** ★ **Decaimento do iodo-131.** O iodo-131 decai segundo $Q(t) = Q_0 e^{-0{,}08664t}$, com t em dias. Quanto tempo leva (arredondando para o dia mais próximo) para 95% de uma amostra decair?

•• **1.39** ★ **Escala Richter.** O terremoto de 1906 em São Francisco teve magnitude 8,3 na escala Richter. No mesmo período, um terremoto de magnitude 4,9 no Japão causou poucos danos. Quantas vezes o de São Francisco foi mais intenso?

•• **1.40** Resolva $2^{x+1} = 3^x$ e $\log_2 x + \log_4 x = 6$.

••• **1.41** ★ **Horas de luz do dia.** O número de horas de luz do dia em uma cidade é modelado por $N(t) = 12 + 3\sin\left[\frac{2\pi}{365}(t - 79)\right]$, em que t é o número de dias após 1º de janeiro. (a) Encontre a amplitude e o período. (b) Quantas horas de luz há no dia mais longo do ano? E no mais curto? (c) Quantas horas de luz há 90 dias após 1º de janeiro?

••• **1.42** ★ **Custo de remoção de uma toxina.** O custo (em milhares de reais) para remover p partes por bilhão (ppb) de uma toxina de um lago é $C(p) = \dfrac{75p}{85 - p}$, válido para $0 \le p < 85$. (a) Calcule o custo para remover 25, 40 e 50 ppb. (b) Encontre a função inversa $p = C^{-1}(C)$. (c) Quanto da toxina se remove com R$ 50 mil?

••• **1.43** ★ **Profundidade da maré.** A profundidade (em pés) da água em um cais é $D(t) = 5\sin\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{7\pi}{6}\right) + 8$, em que t é o número de horas após a meia-noite. Determine o primeiro instante após a meia-noite em que a profundidade é 11,75 pés.

••• **1.44** ★ **Crescimento de bactérias.** Uma colônia de bactérias dobra a cada 12 horas e começa com 1000 bactérias. (a) Usando $Q = Q_0 e^{kt}$, determine k (quatro casas decimais). (b) Aproximadamente quanto tempo leva para haver 200 000 bactérias?

••• **1.45** ★ **População sazonal.** A população de uma cidade litorânea, em milhares, é modelada por $P(t) = 82{,}5 - 67{,}5\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$, com t em meses ($t = 0$ é 1º de janeiro). Em que intervalos do ano a população é menor que 20 mil? E maior que 140 mil?

••• **1.46** Mostre que toda $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é a soma de uma função par e uma ímpar. Aplique a $f(x) = e^x$.

••• **1.47** Encontre todas as soluções de $\sin(2\theta) = \cos\theta$.

••• **1.48** Encontre a inversa de $f(x) = x^2 - 4x + 5$ restrita a $x \ge 2$, com domínio e imagem.

••• **1.49** Resolva $y = \sinh x$ para x e mostre que $\sinh^{-1} y = \ln\left(y + \sqrt{y^2 + 1}\right)$.

••• **1.50** Determine o domínio de $f(x) = \dfrac{\ln(x^2 - 4)}{\sqrt{5 - x}}$.

••• **1.51** Um carro comprado por R$ 26 000 perde R$ 1 500 por ano. (a) Escreva o valor $V(t)$. (b) Calcule $V(2)$. (c) Em quanto tempo o valor zera?

••• **1.52** A função $C(F) = \frac{5}{9}(F - 32)$ converte Fahrenheit em Celsius. Encontre a inversa e a temperatura em que as duas escalas coincidem.

••• **1.53** Uma roda-gigante tem raio 20 m, centro a 22 m do solo, e dá uma volta a cada 4 min, partindo do ponto mais baixo. Escreva a altura $h(t)$ e encontre o primeiro instante em que $h = 32$ m.

••• **1.54** R$ 1000 rendem 4% ao ano: $A(t) = 1000(1{,}04)^t$. Calcule $A(5)$ e $A(10)$ e o tempo para o capital dobrar.

●●● **1.55** O pH é $-\log_{10}[\mathrm{H}^+]$. (a) Quantas vezes uma solução de pH 3 é mais ácida que uma de pH 5? (b) Qual é $[\mathrm{H}^+]$ para pH 2,5?

●●● **1.56** Uma população de coelhos dobra a cada 6 meses e começa com 120. Escreva $P(t) = 120\,a^t$ (t em meses) e estime quando chega a 1000.

●●● **1.57** O ângulo de Mach é $\mu = 2\sin^{-1}(1/M)$. Calcule μ para $M = 2$ e $M = 1{,}5$, e o número de Mach para $\mu = \pi/6$.

●●● **1.58** O ângulo de visão de um quadro é $\theta = \tan^{-1}\frac{5{,}5}{x} - \tan^{-1}\frac{2{,}5}{x}$, com x em pés. Calcule θ para $x = 5$.

●●● **1.59** Resolva $\cosh x = 2$.

●●● **1.60** Mostre que $\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x$ e deduza que $\cosh^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cosh 2x)$.

●●●● **1.61** Encontre todas as funções afins $f(x) = ax + b$ tais que $f(f(x)) = 4x + 3$ para todo x.

●●●● **1.62** Mostre que $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) é a própria inversa se, e somente se, $a = -d$. Interprete geometricamente.

●●●● **1.63** Resolva $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$.

●●●● **1.64** Prove que $\log_2 3$ é irracional.

●●●● **1.65** Quantas soluções reais tem a equação $\sin x = \dfrac{x}{10}$? Justifique com um esboço.

Respostas

1.1 Vértice $(2, -1)$; zeros $x = 1$ e $x = 3$; intercepto $(0, 1)$.

1.2 Domínio $[-3, \infty)$; imagem $[-1, \infty)$; zero $x = -2$; intercepto $(0, \sqrt{3} - 1)$; translação de 3 para a esquerda e 1 para baixo.

1.3 $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$.

1.4 Domínio $(-2, 2)$; imagem $(-\infty, \ln 4]$.

1.5 Imagem $\mathbb{R}$; três soluções: $x = -3$, $\sqrt{3}$ e 3.

1.6 Zeros 0, 2, 3; $f > 0$ em $(0, 2) \cup (3, \infty)$ e $f < 0$ em $(-\infty, 0) \cup (2, 3)$.

1.7 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$.

1.8 $f(x) = 2(x-2)^2 - 3$; vértice $(2, -3)$; zeros $2 \pm \sqrt{3/2}$.

1.9 (a) par; (b) par; (c) ímpar; (d) ímpar; (e) nenhuma.

1.10 $(f \circ g)(x) = x$, $x \geq 1$; $(g \circ f)(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$.

1.11 $h = f \circ g \circ k$, com $k(x) = \cos x$, $g(u) = 1 + u^2$, $f(v) = \sqrt{v}$ (há outras).

1.12 $[-1, 4]$; $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$.

1.13 $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$; $\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$.

1.14 Amplitude 2, período 2π; zeros $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}$; máximo em $x = \frac{3\pi}{4}$.

1.15 $f^{-1}(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$; $\mathrm{Dom}\, f^{-1} = \{x \neq 1\}$, $\mathrm{Im}\, f^{-1} = \{y \neq 2\}$.

1.16 $\frac{4}{5}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ e $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

1.17 (a) $\frac{5}{2}$; (b) $\frac{5}{2}$; (c) $\frac{9}{2}$.

1.18 (a) $x = 2$; (b) $x = 8$; (c) $x = \dfrac{\ln 2}{\ln 5 - \ln 3} \approx 1{,}357$.

1.19 Reflexão no eixo y e translação de 1 para cima; assíntota $y = 1$; intercepto $(0, 2)$; imagem $(1, \infty)$.

1.20 Domínio $(1, \infty)$; assíntota $x = 1$; zero $x = 2$; é decrescente.

1.21 $(f \circ g)(x) = \dfrac{3x}{x+4}$, com $x \neq 0, -4$; $(g \circ f)(x) = \dfrac{2(2x+1)}{3}$, com $x \neq -\frac{1}{2}$.

1.22 $(f \circ g)(x) = x$, com domínio $x \neq 0$ (a fórmula simplificada esconde a restrição).

1.23 $f(x) = x^2$ para $x \geq 0$ e $-x^2$ para $x < 0$; $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ se $x \geq 0$ e $-\sqrt{-x}$ se $x < 0$.

1.24 Translação de 1 para a esquerda, reflexão no eixo x, translação de 3 para cima; vértice $(-1, 3)$.

1.25 Domínio $[-2,2]$; imagem $[0,2]$; semicircunferência superior de raio 2.

1.26 (a) $C(x) = 0{,}75x + 125$; (b) R$ 245,00; (c) 167 cupcakes.

1.27 $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\frac{7\pi}{6}$ e $\frac{11\pi}{6}$.

1.28 Some as frações: o denominador comum é $1 - \sin^2\alpha = \cos^2\alpha$.

1.29 Escreva tan e cot em senos e cossenos e separe a fração.

1.30 $A = 5$, $\varphi = \tan^{-1}\frac{4}{3} \approx 0{,}927$.

1.31 $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$; domínio $x \neq 2$, imagem $y \neq 3$.

1.32 Em $[2,\infty)$: $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x}$, $x \geq 0$.

1.33 $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{4}{3}$.

1.34 $x = 4$ ($x = -2$ é solução estranha).

1.35 $x = \dfrac{1}{e-1} \approx 0{,}582$.

1.36 $f^{-1}(2) = 1$ e $f^{-1}(10) = 2$.

1.37 (a) $x + \frac{1}{x}$ $(x > 0)$; (b) e^{4x}; (c) e^{-2x}; (d) 0.

1.38 $t = \dfrac{\ln 20}{0{,}08664} \approx 35$ dias.

1.39 $10^{3{,}4} \approx 2512$ vezes.

1.40 $x = \dfrac{\ln 2}{\ln 3 - \ln 2} \approx 1{,}7095$; $x = 16$.

1.41 (a) Amplitude 3, período 365 dias; (b) 15 h e 9 h; (c) $\approx 12{,}56$ h.

1.42 (a) $\approx$ R$ 31,25 mil, R$ 66,67 mil e R$ 107,14 mil; (b) $p = \dfrac{85C}{C+75}$; (c) 34 ppb.

1.43 $t = 7 + \frac{6}{\pi}\sin^{-1}(0{,}75) \approx 8{,}62$ h, por volta de 8h37.

1.44 (a) $k = \frac{\ln 2}{12} \approx 0{,}0578$ por hora; (b) ≈ 92 horas.

1.45 $P < 20$ para $t \in [0;\, 0{,}74) \cup (11{,}26;\, 12]$ (início de dez. a fim de jan.); $P > 140$ para $t \in (4{,}95;\, 7{,}05)$ (fim de maio ao início de ago.).

1.46 $f = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$; $e^x = \cosh x + \sinh x$.

1.47 $\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$, $\frac{\pi}{6} + 2n\pi$ ou $\frac{5\pi}{6} + 2n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$.

1.48 $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$; domínio $[1,\infty)$, imagem $[2,\infty)$.

1.49 Com $u = e^x$: $u^2 - 2yu - 1 = 0$, logo $u = y + \sqrt{y^2+1}$ (a raiz positiva).

1.50 $(-\infty,-2) \cup (2,5)$.

1.51 (a) $V(t) = 26000 - 1500t$; (b) R$ 23 000; (c) $\approx 17{,}3$ anos.

1.52 $F = \frac{9}{5}C + 32$; coincidem em -40°.

1.53 $h(t) = 22 - 20\cos\frac{\pi t}{2}$; $t = \frac{4}{3}$ min (80 s).

1.54 R$ 1216,65; R$ 1480,24; $\approx 17{,}7$ anos.

1.55 (a) 100 vezes; (b) $10^{-2{,}5} \approx 3{,}16 \times 10^{-3}$ mol/L.

1.56 $a = 2^{1/6} \approx 1{,}1225$; $t \approx 18{,}4$ meses.

1.57 60°; $\approx 83{,}6^\circ$; $M = 1/\sin\frac{\pi}{12} \approx 3{,}86$.

1.58 $\approx 0{,}369$ rad $\approx 21{,}2^\circ$.

1.59 $x = \pm\ln(2+\sqrt{3}) \approx \pm 1{,}317$.

1.60 Use a fórmula de adição e $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

1.61 $f(x) = 2x + 1$ ou $f(x) = -2x - 3$.

1.62 $f = f^{-1}$ equivale a $(a+d)(cx^2 + (d-a)x - b) \equiv 0$; o gráfico é simétrico em relação a $y = x$.

1.63 $x = 1$ ou $x = 2$.

1.64 Se $\log_2 3 = p/q$, então $3^q = 2^p$: ímpar = par, absurdo.

1.65 7 soluções (todas em $[-10,10]$; uma é $x = 0$, e as demais são simétricas).

CAPÍTULO 2

Limites

O conceito de limite está na base de todo o Cálculo: a derivada e a integral são, ambas, definidas por limites. Neste capítulo construímos a ideia de limite, primeiro de modo intuitivo, com tabelas e gráficos, depois com regras de cálculo e, por fim, com uma definição precisa. Também estudamos a continuidade, uma propriedade que depende diretamente do limite.

2.1 Uma prévia do Cálculo

O Cálculo nasceu de dois problemas geométricos: encontrar a reta tangente a uma curva (o *problema da tangente*, que leva ao Cálculo Diferencial) e calcular a área sob uma curva (o *problema da área*, que leva ao Cálculo Integral). Os dois envolvem uma mesma ideia: aproximar uma quantidade cada vez melhor e observar para onde as aproximações tendem.

O problema da tangente

Para uma reta, a taxa de variação é a inclinação. Para uma curva qualquer, aproximamos a taxa de variação em um ponto $(a, f(a))$ por *retas secantes*, que passam por $(a, f(a))$ e por um ponto próximo $(x, f(x))$.

Definição

A **reta secante** ao gráfico de f pelos pontos $(a, f(a))$ e $(x, f(x))$ é a reta que passa por esses pontos. Sua inclinação é

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

À medida que x se aproxima de a, as secantes se aproximam de uma reta, a **reta tangente** ao gráfico em $(a, f(a))$, e m_{sec} se aproxima da inclinação da tangente, que é a *taxa de variação instantânea* de f em a.




Figura 2.1 Quando x se aproxima de a, as secantes se aproximam da reta tangente (*tangent line*).

Exemplo 2.1 — Inclinações de secantes

Estime a inclinação da tangente a $f(x) = x^2$ em $x = 1$ usando as secantes por $(1, 1)$ e (a) $(2, 4)$; (b) $(3/2, 9/4)$.

Solução

(a) $m_{\text{sec}} = \dfrac{4-1}{2-1} = 3$. (b) $m_{\text{sec}} = \dfrac{9/4-1}{3/2-1} = \dfrac{5}{2} = 2{,}5$. O ponto de (b) está mais perto de $(1, 1)$, então 2,5 é uma estimativa melhor. Com pontos cada vez mais próximos, veremos que a inclinação da tangente é exatamente 2.

O mesmo raciocínio se aplica ao movimento. Se $s(t)$ é a posição de um objeto no instante t, a **velocidade média** no intervalo $[a, t]$ é

$$v_{\text{méd}} = \frac{s(t) - s(a)}{t - a},$$

e a **velocidade instantânea** em $t = a$ é o valor do qual as velocidades médias se aproximam quando t se aproxima de a, se esse valor existir.

O problema da área

Para estimar a área sob o gráfico de uma função positiva entre $x = a$ e $x = b$, dividimos o intervalo em partes e somamos as áreas de retângulos. Quanto mais retângulos, melhor a aproximação; a área exata é o valor para o qual essas somas tendem. Esse é o ponto de partida do Cálculo Integral (capítulo 5).




Figura 2.2 A área sob a curva aproximada por retângulos.

2.2 O limite de uma função

Definição intuitiva

Definição

Seja f definida em todos os pontos de um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a, e seja L um número real. Se os valores $f(x)$ se aproximam de L quando x ($\neq a$) se aproxima de a, dizemos que o **limite** de $f(x)$ quando x tende a a é L, e escrevemos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Em outras palavras: à medida que x fica perto de a, $f(x)$ fica perto de L e permanece perto.

Atenção

O limite não depende do valor $f(a)$; f nem precisa estar definida em a. Importa apenas o comportamento de f *perto* de a.

Estratégia: estimar um limite com uma tabela

1. Monte duas colunas de valores de x que se aproximam de a: uma pela esquerda ($a - 0{,}1$, $a - 0{,}01$, $a - 0{,}001, \ldots$) e outra pela direita ($a + 0{,}1$, $a + 0{,}01, \ldots$), com os respectivos $f(x)$.
2. Se as duas colunas de $f(x)$ se aproximam de um mesmo valor L, a estimativa é $\lim_{x \to a} f(x) = L$.
3. Confirme com o gráfico de f perto de $x = a$.

Exemplo 2.2 — Estimando $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$

Calculando $(\sin x)/x$ para $x = \pm 0{,}1;\ \pm 0{,}01;\ \pm 0{,}001$, obtemos $0{,}99833\ldots$, $0{,}99998\ldots$ e $0{,}9999998\ldots$ (a função é par, então os valores pela esquerda e pela direita coincidem). Os valores se aproximam de 1, e o gráfico confirma:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Provaremos esse resultado na seção 2.3.




Figura 2.3 Gráfico de $f(x) = (\sin x)/x$ perto de $x = 0$.

Dois limites básicos, intuitivamente evidentes, servem de ponto de partida:

Teorema 2.1: Dois limites importantes

Para todo número real a e toda constante c: $\lim_{x \to a} x = a$ e $\lim_{x \to a} c = c$.

Quando o limite não existe

Um limite pode não existir por diferentes motivos: a função pode se aproximar de valores diferentes pela esquerda e pela direita, crescer sem limitação, ou oscilar.

Exemplo 2.3 — Um limite que não existe

Considere $\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$. Para a sequência $x = \frac{2}{\pi}, \frac{2}{3\pi}, \frac{2}{5\pi}, \ldots$, que tende a 0, os valores de $\sin(1/x)$ são $1, -1, 1, -1, \ldots$. Eles não se aproximam de nenhum número, logo o limite não existe. O gráfico oscila cada vez mais rapidamente entre -1 e 1 perto de $x = 0$.




Figura 2.4 $\sin(1/x)$ oscila entre -1 e 1 quando $x \to 0$.

Limites laterais

Definição

Limite à esquerda: se f está definida em um intervalo (c, a) e $f(x)$ se aproxima de L quando x se aproxima de a com $x < a$, escrevemos $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$.

Limite à direita: se f está definida em um intervalo (a, c) e $f(x)$ se aproxima de L quando x se aproxima de a com $x > a$, escrevemos $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$.

Exemplo 2.4 — Limites laterais

Para $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 2 \\ x^2 - 4, & x \geq 2, \end{cases}$ temos $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 2 + 1 = 3$ e $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 2^2 - 4 = 0$. Como os limites laterais são diferentes, $\lim_{x\to 2} f(x)$ não existe.




Figura 2.5 Limites laterais diferentes em $x = 2$.

Access for free at openstax.org

Teorema 2.2: Limites laterais e bilaterais

Seja f definida em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a. Então

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a^-} f(x) = L \text{ e } \lim_{x\to a^+} f(x) = L.$$

Limites infinitos

Quando $f(x)$ cresce sem limitação à medida que x se aproxima de a (pela esquerda, pela direita ou pelos dois lados), escrevemos, respectivamente,

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to a} f(x) = +\infty;$$

analogamente para $-\infty$, quando $f(x)$ decresce sem limitação. Atenção: dizer que o limite é ∞ é uma forma de descrever *como* o limite deixa de existir, pois ∞ não é um número real. Por exemplo, para $f(x) = 1/x$: $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ e $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.




Figura 2.6 O gráfico de $1/x$ perto de $x = 0$.

Teorema 2.3: Limites infinitos de potências inteiras

Se n é um inteiro positivo par, $\lim_{x\to a} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty$. Se n é um inteiro positivo ímpar, $\lim_{x\to a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty$ e $\lim_{x\to a^-} \frac{1}{(x-a)^n} = -\infty$.

Definição

A reta $x = a$ é uma **assíntota vertical** de f se pelo menos um dos limites $\lim_{x\to a^-} f(x)$, $\lim_{x\to a^+} f(x)$ ou $\lim_{x\to a} f(x)$ for $+\infty$ ou $-\infty$.

Por exemplo, $f(x) = \frac{1}{(x-3)^4}$ tem assíntota vertical $x = 3$, pois $\lim_{x\to 3} f(x) = +\infty$ pelo Teorema 2.3.

2.3 As propriedades dos limites

Calculando limites com as propriedades

Estimar limites com tabelas e gráficos é útil, mas trabalhoso e às vezes enganoso. As propriedades a seguir permitem calcular limites diretamente.

Teorema 2.4: Propriedades dos limites

Sejam f e g definidas para $x \neq a$ em um intervalo aberto contendo a, com $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$ reais, e seja c uma constante. Então:

- **Soma e diferença:** $\lim_{x\to a} \big(f(x) \pm g(x)\big) = L \pm M$.
- **Múltiplo constante:** $\lim_{x\to a} c\, f(x) = cL$.
- **Produto:** $\lim_{x\to a} f(x)\, g(x) = L \cdot M$.
- **Quociente:** $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M}$, se $M \neq 0$.
- **Potência:** $\lim_{x\to a} \big(f(x)\big)^n = L^n$, para todo inteiro positivo n.
- **Raiz:** $\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, para todo L se n é ímpar, e para $L \geq 0$ se n é par e $f(x) \geq 0$.

Exemplo 2.5 — Usando as propriedades

$$\lim_{x\to 2} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^3 + 4} = \frac{2\lim x^2 - 3\lim x + \lim 1}{\lim x^3 + \lim 4} = \frac{2(4) - 3(2) + 1}{8 + 4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

Aplicando as propriedades repetidamente, obtemos o resultado geral para polinômios e funções racionais.

Teorema 2.5: Limites de polinômios e funções racionais

Se p e q são polinômios e a é real, então $\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$ e $\lim_{x\to a} \dfrac{p(x)}{q(x)} = \dfrac{p(a)}{q(a)}$ quando $q(a) \neq 0$.

A forma indeterminada $0/0$

Quando $q(a) = 0$, a propriedade do quociente não se aplica diretamente. Se também $p(a) = 0$, temos a **forma indeterminada** $0/0$: o limite pode existir ou não, e é preciso manipular a expressão. A ideia central é que *se $f(x) = g(x)$ para todo $x \neq a$ perto de a, então as duas funções têm o mesmo limite em a*. Por exemplo, $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ para $x \neq 1$, logo $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x\to 1}(x + 1) = 2$.

Estratégia: limites da forma $0/0$

1. Verifique que as propriedades não se aplicam diretamente (forma $0/0$).
2. Encontre uma função igual a $f(x)/g(x)$ para $x \neq a$: (a) se forem polinômios, fatore e cancele os fatores comuns; (b) se houver diferença com raiz quadrada, multiplique pelo conjugado; (c) se houver fração composta, simplifique-a.
3. Aplique as propriedades dos limites.

Exemplo 2.6 — Fatorando e cancelando

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-3x}{2x^2-5x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{x(x-3)}{(x-3)(2x+1)}=\lim_{x\to 3}\frac{x}{2x+1}=\frac{3}{7}.$$

Exemplo 2.7 — Multiplicando pelo conjugado

Calcule $\lim_{x\to -1}\dfrac{\sqrt{x+2}-1}{x+1}$.

Solução

A expressão tem a forma $0/0$ em $x=-1$. Multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $\sqrt{x+2}+1$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1}&=\lim_{x\to -1}\frac{(\sqrt{x+2}-1)(\sqrt{x+2}+1)}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}=\lim_{x\to -1}\frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}\\&=\lim_{x\to -1}\frac{1}{\sqrt{x+2}+1}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Exemplo 2.8 — Simplificando uma fração composta

$$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{2-(x+1)}{2(x+1)(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{-(x-1)}{2(x+1)(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{-1}{2(x+1)}=-\frac{1}{4}.$$

Forma $K/0$ com $K\neq 0$. Se o numerador tende a $K\neq 0$ e o denominador tende a 0, o limite não é finito. Estudamos os limites laterais pelo sinal: por exemplo, em $\lim_{x\to 2}\frac{x-3}{x^2-2x}$, o numerador tende a -1 e o denominador $x(x-2)$ tende a 0^- pela esquerda e a 0^+ pela direita. Logo o limite é $+\infty$ pela esquerda e $-\infty$ pela direita.

O Teorema do Confronto

Teorema 2.6: Teorema do Confronto

Sejam f, g e h definidas para $x\neq a$ em um intervalo aberto contendo a. Se $f(x)\le g(x)\le h(x)$ nesse intervalo, para $x\neq a$, e $\lim_{x\to a}f(x)=L=\lim_{x\to a}h(x)$, então $\lim_{x\to a}g(x)=L$.




Figura 2.7 O Teorema do Confronto: g fica "espremida" entre f e h.

Access for free at openstax.org

Exemplo 2.9 — Aplicando o Teorema do Confronto

Como $-1 \leq \cos x \leq 1$, temos $-|x| \leq x\cos x \leq |x|$. Como $\lim_{x\to 0}(-|x|) = 0 = \lim_{x\to 0}|x|$, concluímos que $\lim_{x\to 0} x\cos x = 0$.

Dois limites trigonométricos fundamentais. Pelo círculo unitário, para $0 < \theta < \pi/2$, valem $0 < \sin\theta < \theta < \tan\theta$ (o arco de comprimento θ fica entre o segmento vertical de comprimento $\sin\theta$ e o segmento tangente de comprimento $\tan\theta$). Pelo confronto, isso dá $\lim_{\theta\to 0}\sin\theta = 0$ e, daí, $\lim_{\theta\to 0}\cos\theta = 1$.




Figura 2.8 Para $0 < \theta < \pi/2$: $\sin\theta < \theta < \tan\theta$.

Dividindo $\sin\theta < \theta < \tan\theta$ por $\sin\theta > 0$ e invertendo, obtemos $\cos\theta < \dfrac{\sin\theta}{\theta} < 1$. Essa desigualdade vale também para $-\pi/2 < \theta < 0$, porque as três funções são pares. Pelo Teorema do Confronto:

Teorema 2.7: Limites trigonométricos especiais

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1 \qquad \text{e} \qquad \lim_{\theta\to 0}\frac{1-\cos\theta}{\theta} = 0.$$

O segundo limite sai do primeiro multiplicando pelo conjugado:

$$\frac{1-\cos\theta}{\theta} = \frac{1-\cos^2\theta}{\theta(1+\cos\theta)} = \frac{\sin\theta}{\theta}\cdot\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} \longrightarrow 1\cdot\frac{0}{2} = 0.$$

Esses dois limites serão essenciais para derivar seno e cosseno no capítulo 3.

2.4 Continuidade

Continuidade em um ponto

Intuitivamente, uma função é contínua quando seu gráfico pode ser traçado sem tirar o lápis do papel. A definição precisa exige três condições.

Definição

Uma função f é **contínua no ponto** a se, e somente se:

(i) $f(a)$ está definida;

(ii) $\lim_{x\to a} f(x)$ existe;

(iii) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Se alguma condição falha, f é **descontínua** em a.

Para verificar a continuidade em a, testamos as condições na ordem: se uma falha, paramos. Por exemplo, $f(x) = (x^2-4)/(x-2)$ não é contínua em $x=2$, pois $f(2)$ não está definida. Já

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

está definida em 1 e tem $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$, mas $1 \neq f(1) = 0$: falha a condição (iii).

Teorema 2.8: Continuidade de polinômios e funções racionais

Polinômios e funções racionais são contínuos em todos os pontos de seus domínios.

Isso decorre do Teorema 2.5: para $q(a) \neq 0$, $\lim_{x\to a} p(x)/q(x) = p(a)/q(a)$.

Tipos de descontinuidade

Definição

Se f é descontínua em a, então f tem:

1. uma **descontinuidade removível** se $\lim_{x\to a} f(x)$ existe (é um número real);
2. uma **descontinuidade de salto** se os limites laterais existem, mas são diferentes;
3. uma **descontinuidade infinita** se pelo menos um limite lateral é $\pm\infty$.




Figura 2.9 Tipos de descontinuidade em $x = a$: (a) removível, com o limite existindo, mas diferente de $f(a)$ ou com $f(a)$ indefinido; (b) de salto, com limites laterais finitos e diferentes; (c) infinita, com limite lateral $\pm\infty$.

Exemplo 2.10 — Classificando descontinuidades

(a) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$ em $x=2$: $\lim_{x\to 2} f(x) = \lim(x+2) = 4$ existe; descontinuidade *removível*.

(b) $f(x) = \begin{cases} -x^2+4, & x \leq 3 \\ 4x-8, & x > 3 \end{cases}$ em $x=3$: os limites laterais são -5 e 4; descontinuidade *de salto*.

(c) $f(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$ em $x=-1$: pela esquerda o limite é $-\infty$ e pela direita $+\infty$; descontinuidade *infinita*.

Continuidade em um intervalo

Continuidade lateral

f é **contínua à direita** em a se $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$, e **contínua à esquerda** em a se $\lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$.

Uma função é contínua em um intervalo aberto se é contínua em cada ponto dele. É contínua em $[a,b]$ se é contínua em (a,b), contínua à direita em a e contínua à esquerda em b. Por exemplo, $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ é contínua em $[-2,2]$.

Teorema 2.9: Função composta

Se f é contínua em L e $\lim_{x\to a} g(x) = L$, então

$$\lim_{x\to a} f\big(g(x)\big) = f\Big(\lim_{x\to a} g(x)\Big) = f(L).$$

Por exemplo, $\lim_{x\to \pi/2} \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos 0 = 1$. Em particular, a composta de funções contínuas é contínua.

Teorema 2.10: Continuidade das funções trigonométricas

As funções trigonométricas são contínuas em todo o seu domínio.

Mais geralmente, exponenciais, logaritmos, raízes e todas as funções construídas a partir delas e de polinômios por operações algébricas e composição são contínuas onde estão definidas.

O Teorema do Valor Intermediário

Teorema 2.11: Teorema do Valor Intermediário

Seja f contínua em um intervalo fechado e limitado $[a,b]$. Se z é qualquer número real entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe $c \in [a,b]$ tal que $f(c) = z$.




Figura 2.10 Existe $c \in [a,b]$ com $f(c) = z$.

Exemplo 2.11 — Garantindo um zero

Mostre que $f(x) = x - \cos x$ tem pelo menos um zero.

Solução

f é contínua em $\mathbb{R}$. Como $f(0) = -1 < 0$ e $f(\pi/2) = \pi/2 > 0$, o Teorema do Valor Intermediário garante que existe $c \in [0, \pi/2]$ com $f(c) = 0$.

Atenção

A continuidade é essencial. Para $f(x) = 1/x$, temos $f(-1) = -1 < 0$ e $f(1) = 1 > 0$, mas f não tem zero em $[-1, 1]$, pois não é contínua em $x = 0$.

2.5 A definição precisa de limite

Quantificando a proximidade

A definição intuitiva fala em $f(x)$ "se aproximar" de L. Para torná-la precisa, medimos distâncias: $|f(x) - L|$ é a distância entre $f(x)$ e L, e $|x - a|$ é a distância entre x e a. Dizer que $f(x)$ fica tão perto de L quanto quisermos significa: para qualquer tolerância $\varepsilon > 0$, conseguimos garantir $|f(x) - L| < \varepsilon$ tomando x suficientemente perto de a, a uma distância menor que algum $\delta > 0$.

Definição ε-δ de limite

Seja f definida para $x \neq a$ em um intervalo aberto contendo a, e seja L real. Então $\lim_{x \to a} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$




Figura 2.11 A definição ε-δ: para cada faixa horizontal $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ existe uma faixa vertical $(a - \delta, a + \delta)$ na qual o gráfico, exceto possivelmente em $x = a$, fica dentro da faixa horizontal.

Estratégia: provar que $\lim_{x \to a} f(x) = L$

1. Comece com: "Seja $\varepsilon > 0$."
2. Encontre δ (geralmente trabalhando "de trás para a frente" a partir de $|f(x) - L| < \varepsilon$) e escreva: "Escolha $\delta = \ldots$".
3. Escreva: "Suponha $0 < |x - a| < \delta$."
4. Usando essa hipótese, mostre que $|f(x) - L| < \varepsilon$.
5. Conclua: "Portanto, $\lim_{x \to a} f(x) = L$."

Exemplo 2.12 — Uma prova ε-δ com função afim

Prove que $\lim_{x\to -1}(4x+1) = -3$.

Solução

Rascunho: queremos $|(4x+1)-(-3)| = |4x+4| = 4|x+1| < \varepsilon$, ou seja, $|x+1| < \varepsilon/4$. Isso sugere $\delta = \varepsilon/4$.
Prova: seja $\varepsilon > 0$. Escolha $\delta = \varepsilon/4$. Suponha $0 < |x+1| < \delta$. Então $|(4x+1)-(-3)| = 4|x+1| < 4\delta = \varepsilon$. Portanto, $\lim_{x\to -1}(4x+1) = -3$.

Exemplo 2.13 — Uma prova ε-δ com função quadrática

Prove que $\lim_{x\to -1}(x^2 - 2x + 3) = 6$.

Solução

Rascunho: $|(x^2-2x+3)-6| = |x+1|\cdot|x-3|$. O fator $|x-3|$ depende de x, então primeiro o limitamos: se $|x+1| < 1$, então $-1 < x+1 < 1$, isto é, $-5 < x-3 < -3$, e logo $|x-3| < 5$. Basta então ter também $|x+1| < \varepsilon/5$.
Prova: seja $\varepsilon > 0$. Escolha $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$. Suponha $0 < |x+1| < \delta$. Então $|x+1| < 1$, donde $|x-3| < 5$, e $|x+1| < \varepsilon/5$. Logo $|(x^2-2x+3)-6| = |x+1|\,|x-3| < \frac{\varepsilon}{5}\cdot 5 = \varepsilon$.

Provando as propriedades dos limites

A definição precisa permite demonstrar as propriedades da seção 2.3. Como exemplo, provemos a da soma. Uma ferramenta recorrente é a **desigualdade triangular**: $|a+b| \le |a| + |b|$ para quaisquer reais a e b.

Prova da propriedade da soma. Suponha $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$. Seja $\varepsilon > 0$. Existe $\delta_1 > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta_1$ implica $|f(x) - L| < \varepsilon/2$, e existe $\delta_2 > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta_2$ implica $|g(x) - M| < \varepsilon/2$. Escolha $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Se $0 < |x-a| < \delta$, então

$$|(f(x)+g(x)) - (L+M)| \le |f(x)-L| + |g(x)-M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \square$$

Para mostrar que um limite *não* existe, basta exibir um $\varepsilon > 0$ para o qual nenhum δ funciona. Por exemplo, se $f(x) = -1$ para $x < 0$ e $f(x) = 1$ para $x \ge 0$, com $\varepsilon = 1/2$ não há δ que sirva para nenhum candidato L: perto de 0 há valores de f iguais a -1 e a 1, que distam 2 entre si.

Limites laterais e infinitos

As outras formas de limite têm definições análogas:

- $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$;
- $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $-\delta < x - a < 0 \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$;
- $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ se, para todo $M > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta \Rightarrow f(x) > M$ (e $-\infty$ com $f(x) < -M$).

Resumo do capítulo

- A inclinação da tangente e a velocidade instantânea são limites de inclinações de secantes e de velocidades médias; a área sob uma curva é o limite de somas de áreas de retângulos.

- $\lim_{x\to a} f(x) = L$ quando $f(x)$ fica arbitrariamente perto de L para x suficientemente perto de a ($x \neq a$); o valor $f(a)$ é irrelevante.
- O limite bilateral existe se, e somente se, os laterais existem e são iguais.
- Um limite infinito descreve uma assíntota vertical; ∞ não é um número.
- Para polinômios e racionais (com denominador não nulo), basta substituir. Na forma $0/0$, fatore, use o conjugado ou simplifique antes.
- Teorema do Confronto; $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ e $\lim_{\theta\to 0} \frac{1-\cos\theta}{\theta} = 0$.
- Contínua em a: $f(a)$ definida, o limite existe e é igual a $f(a)$. Descontinuidades: removível, de salto, infinita.
- Teorema do Valor Intermediário: uma função contínua em $[a, b]$ assume todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$.
- Definição precisa: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap2/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **2.1** Calcule $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$.
- **2.2** Calcule $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3 + 1}{x + 1}$.
- **2.3** Calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4 - 1}{x - 1}$.
- **2.4** Calcule $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$.
- **2.5** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$.
- **2.6** Calcule $\lim_{x\to 8} \dfrac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8}$.
- **2.7** Calcule $\lim_{h\to 0} \dfrac{(3+h)^2 - 9}{h}$ e interprete como inclinação de uma tangente.
- **2.8** Calcule $\lim_{x\to 1} \left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{2}{x^2-1} \right)$.
- **2.9** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 7x}{3x}$.
- **2.10** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{x}{\tan 2x}$.

- **2.11** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin^2(3x)}{x^2}$.
- **2.12** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{\sin x}$.
- **2.13** Calcule $\lim_{x\to \pi} \dfrac{\sin x}{x-\pi}$. (Dica: $u = x - \pi$.)
- **2.14** Calcule os limites laterais de $\dfrac{|x-3|}{x-3}$ em $x = 3$ e esboce o gráfico. O limite existe?
- **2.15** Calcule $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{x^2+3x}{|x|}$ e $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{x^2+3x}{|x|}$.
- **2.16** Calcule $\lim_{x\to 2^-} \dfrac{x+1}{x-2}$ e $\lim_{x\to 2^+} \dfrac{x+1}{x-2}$ e indique a assíntota vertical.
- **2.17** Encontre as descontinuidades de $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$ e classifique cada uma.
- **2.18** Encontre k para que $f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \le 2 \\ 2x + k, & x > 2 \end{cases}$ seja contínua.
- **2.19** Use o Teorema do Confronto para calcular $\lim_{x\to 0} x^4 \cos \dfrac{2}{x}$.
- **2.20** Classifique as descontinuidades de $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2-1}$ e esboce o gráfico perto delas.

•• **2.21** ★ **Conjugado com raiz.** Mostre que a substituição direta leva a uma forma indeterminada e calcule $\lim_{t\to 9} \dfrac{t-9}{\sqrt{t}-3}$.

•• **2.22** ★ **Fatorando cubos.** Calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x^2-1}$.

•• **2.23** Calcule $\lim_{x\to -3} \dfrac{\sqrt{x+4}-1}{x+3}$.

•• **2.24** Calcule $\lim_{x\to 1/2} \dfrac{2x^2+3x-2}{2x-1}$.

•• **2.25** Calcule $\lim_{x\to 2} \dfrac{1-\frac{2}{x}}{x^2-4}$.

•• **2.26** ★ **Limites laterais infinitos.** Calcule $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$ e $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$.

•• **2.27** ★ **O limite de** $\sin(ax)/x$**.** (a) Use tabelas com $x = \pm 0{,}1;\ \pm 0{,}01;\ \pm 0{,}001$ para estimar $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{x}$ e $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x}$. (b) Conjecture o valor de $\lim_{x\to 0} \frac{\sin ax}{x}$ para $a > 0$ e prove-o com o Teorema 2.7.

•• **2.28** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{\sin 5x}$.

•• **2.29** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

•• **2.30** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

•• **2.31** ★ **Teorema do Confronto.** Calcule $\lim_{\theta\to 0} \theta^2 \cos\left(\dfrac{1}{\theta}\right)$.

•• **2.32** ★ **Escolhendo k para a continuidade (I).** Encontre k para que $f(x) = \begin{cases} 3x+2, & x < k \\ 2x-3, & k \le x \le 8 \end{cases}$ seja contínua em todo o seu domínio.

•• **2.33** ★ **Escolhendo k para a continuidade (II).** Encontre k para que $f(x) = \begin{cases} e^{kx}, & 0 \le x < 4 \\ x+3, & 4 \le x \le 8 \end{cases}$ seja contínua em $[0,8]$.

•• **2.34** Classifique as descontinuidades de $f(x) = \dfrac{x^2-x-6}{x^2-9}$.

•• **2.35** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}$.

•• **2.36** $f(x) = \begin{cases} x^2-e^x, & x < 0 \\ x-1, & x \ge 0 \end{cases}$ é contínua em $x = 0$?

•• **2.37** ★ **TVI: duas partículas.** Uma partícula se move numa reta com posição $s(t)$ contínua, e $s(2) = 5$, $s(5) = 2$. Outra partícula tem posição $h(t) = s(t) - t$. Explique por que existe um instante $t \in [2,5]$ em que $h(t) = 0$. O que isso significa para a primeira partícula?

•• **2.38** ★ **TVI: localizando uma raiz.** Use o TVI para decidir se $2^x = x^3$ tem solução em [1,25; 1,375] ou em [1,375; 1,5]. Justifique para cada intervalo.

•• **2.39** Calcule $\lim_{x\to -2^-} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$ e $\lim_{x\to -2^+} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$.

•• **2.40** ★ **Da secante à tangente.** Calcule $\lim_{h\to 0} \dfrac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h}$, em que $a \neq 0$ é constante. Interprete o resultado em termos de retas secantes ao gráfico de $f(x) = 1/x$.

••• **2.41** ★ **Prova ε-δ.** Use a definição precisa de limite para provar que $\lim_{x\to 2}(x^2+2x) = 8$.

••• **2.42** ★ **Provando que um limite não existe.** Use a definição precisa para provar que $\lim_{x\to 1} \dfrac{|x-1|}{x-1}$ não existe.

••• **2.43** Prove pela definição ε-δ que $\lim_{x\to 2}(5x+8) = 18$.

••• **2.44** Prove pela definição ε-δ que $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3} = 6$.

••• **2.45** Para $f(x) = \begin{cases} 8x-3, & x < 0 \\ 4x-2, & x \ge 0 \end{cases}$, prove que $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -2$.

••• **2.46** Prove que $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$ pela definição.

••• **2.47** Use o Teorema do Confronto para calcular $\lim_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x}$.

••• **2.48** Encontre a e b para que $f(x) = \begin{cases} ax+2b, & x<1 \\ 5, & x=1 \\ bx^2-a, & x>1 \end{cases}$ seja contínua em $x=1$.

••• **2.49** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$.

••• **2.50** Calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$. (Dica: $a^3-1=(a-1)(a^2+a+1)$.)

••• **2.51** Calcule $\lim_{h\to 0} \dfrac{(2+h)^3-8}{h}$ e interprete como inclinação de uma tangente.

••• **2.52** Calcule $\lim_{x\to \pi/2} \dfrac{\cos x}{x-\pi/2}$. (Dica: faça $u = x - \frac{\pi}{2}$.)

••• **2.53** Mostre que $x^3+x-1=0$ tem uma raiz em $(0,1)$ e localize-a num intervalo de comprimento 0,125 por bissecção.

••• **2.54** Mostre que a equação $\cos x = x$ tem pelo menos uma solução.

••• **2.55** O volume de um objeto de massa m é $V = m/\rho$. Calcule $\lim_{\rho\to 0^+} V$ e interprete.

••• **2.56** Prove pela definição que, se $\lim_{x\to a} f(x) = L$, então $\lim_{x\to a} c\,f(x) = cL$.

••• **2.57** Seja $f(x)=x$ se x é racional e $f(x)=0$ se x é irracional. Determine $\lim_{x\to 0} f(x)$ e prove.

••• **2.58** Mostre que $\lim_{x\to 0} \sin\dfrac{\pi}{x}$ não existe, usando duas sequências que tendem a 0.

••• **2.59** Encontre as assíntotas verticais e as descontinuidades removíveis de $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^3-x^2-2x}$, com os limites laterais.

••• **2.60** Onde a função maior inteiro $f(x) = \lfloor x \rfloor$ é descontínua? Classifique e diga de que lado ela é contínua.

•••• **2.61** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x \sin x}$.

•••• **2.62** Prove pela definição que $\lim_{x\to a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$ para $a>0$.

•••• **2.63** Mostre que todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real.

•••• **2.64** Calcule $\lim_{x\to 0^+} x\left\lfloor \dfrac{1}{x} \right\rfloor$.

•••• **2.65** Seja $f:[0,1]\to[0,1]$ contínua. Prove que existe $c\in[0,1]$ com $f(c)=c$ (ponto fixo).

Respostas

2.1 $-\frac{1}{4}$.

2.2 3.

2.3 4.

2.4 $\frac{1}{4}$.

2.5 $\frac{1}{6}$.

2.6 $\frac{1}{12}$.

2.7 6: inclinação da tangente a $y = x^2$ em $x = 3$.

2.8 $\frac{1}{2}$.

2.9 $\frac{7}{3}$.

2.10 $\frac{1}{2}$.

2.11 9.

2.12 0.

2.13 -1.

2.14 -1 e 1; não existe.

2.15 3 e -3.

2.16 $-\infty$ e $+\infty$; $x = 2$.

2.17 Removível em $x = -2$ (limite $-\frac{1}{4}$); infinita em $x = 2$.

2.18 $k = \frac{4}{3}$.

2.19 0, pois $-x^4 \le x^4 \cos\frac{2}{x} \le x^4$.

2.20 Removível em $x = 1$ (limite $\frac{1}{2}$); infinita em $x = -1$.

2.21 $0/0$; o limite é 6.

2.22 $\dfrac{3}{2}$.

2.23 $\frac{1}{2}$.

2.24 $\frac{5}{2}$.

2.25 $\frac{1}{8}$.

2.26 $-\infty$ pela esquerda e $+\infty$ pela direita.

2.27 (a) 2 e 3; (b) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax}{x} = a$.

2.28 $\frac{3}{5}$.

2.29 $\frac{1}{2}$.

2.30 $\frac{1}{2}$.

2.31 0, pelo Teorema do Confronto.

2.32 $k = -5$.

2.33 $k = \dfrac{\ln 7}{4} \approx 0{,}4865$.

2.34 Removível em $x = 3$ (limite $\frac{5}{6}$); infinita em $x = -3$.

2.35 $\frac{1}{6}$.

2.36 Sim: os dois limites laterais e $f(0)$ valem -1.

2.37 $h(2) = 3 > 0$ e $h(5) = -3 < 0$; pelo TVI, $h(c) = 0$ para algum $c \in [2, 5]$, ou seja, $s(c) = c$.

2.38 Com $g(x) = 2^x - x^3$: $g(1{,}25) > 0$ e $g(1{,}375) < 0$, logo há raiz no 1º intervalo; no 2º, g não muda de sinal e o TVI nada garante.

2.39 $-\infty$ e $+\infty$.

2.40 $-\dfrac{1}{a^2}$: é a inclinação da reta tangente a $y = 1/x$ em $x = a$.

2.41 Escolha $\delta = \min\{1, \varepsilon/7\}$.

2.42 Tome $\varepsilon = \frac{1}{2}$: perto de 1 a função vale -1 e 1, que não cabem juntos em nenhuma faixa de largura 1.

2.43 $\delta = \varepsilon/5$.

2.44 $\delta = \varepsilon$ (para $x \neq 3$ a expressão é $x + 3$).

2.45 $\delta = \varepsilon/4$.

2.46 Dado $M > 0$, tome $\delta = 1/\sqrt{M}$.

2.47 0, pois $-|x| \le x \sin\frac{1}{x} \le |x|$.

2.48 $a = -\frac{5}{3}$, $b = \frac{10}{3}$.

2.49 1.

2.50 $\frac{1}{3}$.

2.51 12: inclinação da tangente a $y = x^3$ em $x = 2$.

2.52 -1.

2.53 Raiz em $(0{,}625;\ 0{,}75)$; de fato $x \approx 0{,}6823$.

2.54 $g(x) = \cos x - x$: $g(0) = 1 > 0$, $g(\pi/2) < 0$; TVI.

2.55 $+\infty$: densidade tendendo a zero exige volume ilimitado.

2.56 Para $c \neq 0$, use $\varepsilon/|c|$ na hipótese; $c = 0$ é imediato.

2.57 0; em ambos os casos $|f(x)| \le |x|$, então $\delta = \varepsilon$.

2.58 $x_n = \frac{1}{n}$ dá 0; $x_n = \frac{2}{4n+1}$ dá 1.

2.59 Removível em $x = -1$ (limite $-\frac{2}{3}$); assíntotas $x = 0$ ($-\infty$ à esq., $+\infty$ à dir.) e $x = 2$ ($-\infty$ à esq., $+\infty$ à dir.).

2.60 Em cada inteiro: salto de 1; contínua à direita.

2.61 $\frac{1}{2}$.

2.62 $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}} \le \frac{|x-a|}{\sqrt{a}}$; tome $\delta = \min\{a, \varepsilon\sqrt{a}\}$.

2.63 O termo dominante força sinais opostos para x grande e x muito negativo; TVI.

2.64 1, pois $1 - x < x\lfloor 1/x \rfloor \le 1$.

2.65 Aplique o TVI a $g(x) = f(x) - x$: $g(0) \ge 0 \ge g(1)$.