

# Apuntes de clase

José Antonio de la Rosa Cubero

## G-conjuntos y p-grupos

**Definición 1** (Acción). Sea  $G$  un grupo y  $X$  un conjunto distinto del vacío. Una acción de  $G$  sobre  $X$  por la izquierda es una aplicación  $G \times X \longrightarrow X$  tal que  $(g, x) \mapsto {}^g x$ , que verifica que  ${}^1 x = x$  y que  ${}^{(gh)} x = {}^g ({}^h x)$ .

Diremos que  $G$  actúa sobre  $X$  por la izquierda o que  $X$  es un  $G$ -conjunto. Diremos que  $X$  es el dominio de operadores y a la acción y a la acción la aplicación de  $G$ -estructura.

De modo análogo se define por la derecha, pero no vamos a usarla. Cuando hablemos de acción siempre nos referiremos a una aplicación por la derecha.

**Definición 2.** Para cada  $g \in G$  podemos definir la siguiente aplicación:

$$\phi(g)(x) := {}^g x$$

*Observación 1.* La primera condición nos dice que  $\phi(1) = \text{id}_X$  y la segunda que  $\phi(gh) = \phi(g) \circ \phi(h)$ . En particular es una aplicación biyectiva tal que  $\phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$ . Entonces hemos definido un homomorfismo de grupos  $\phi$  entre  $G$  y  $S(X)$ , el conjunto de permutaciones sobre  $X$ .

Llamaremos a  $\phi$  representación de  $G$  por permutaciones asociada a la acción.

**Proposición 1.** Sea  $G$  un grupo y  $X$  un conjunto no vacío. Supongamos dado un homomorfismo  $f : G \longrightarrow S(X)$ . Entonces podemos definir una acción de  $G$  sobre  $X$  como sigue:  $(g, x) \mapsto {}^g x := f(g)(x)$ .

Entonces las condiciones de la definición de  $G$ -conjunto se satisfacen, cuya representación es  $f$ .

**Definición 3.** Una acción de  $G$  sobre un conjunto  $X$  diremos que es fiel si el núcleo de  $\phi : G \longrightarrow S(X)$  es trivial.

$$\ker(\phi) = \{g \in G : \phi(g) = {}^g x = \text{id}\} = \{1\}$$

Algunos ejemplos:

1. Dado  $G$  un grupo y  $X \neq \emptyset$  la aplicación  $G \times X \longrightarrow X$  tal que  $(g, x) \mapsto {}^g x := x$ , la llamaremos la acción trivial.  $\phi(g) = \text{id}$  para todo  $g \in G$ , el homomorfismo trivial, es su representación asociada.
2. Supongamos  $X$  un  $G$ -conjunto y  $H \leq G$ , entonces  $X$  también es un  $H$ -conjunto con la acción dada por la restricción de la acción a  $H$ .
3.  $G = S_n$  y  $X = \{1, \dots, n\}$ , tenemos que la aplicación  $(\sigma, i) \mapsto \sigma(i)$ . Su representación asociada es la identidad en  $S_n$ .
4. Tomamos como grupo  $G = D_4$  y como  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ . Sea  $\phi : D_4 \longrightarrow S_4$  y  $\phi(r^i) := (1 \ 2 \ 3 \ 4)^i$  y  $\phi(r^i s) = (1 \ 2 \ 3 \ 4)^i (2 \ 4)$  es un homomorfismo de grupos. Tenemos entonces una acción de  $D_4$  sobre el conjunto  $X$ . Esto permite numerar los vértices del cuadrado sobre el que hemos definido  $D_4$ . Esta acción cumple  $\ker(\phi) = \{1\}$ , luego es fiel.
5.  $G = S_n$ , Consideramos  $X^n = X \times \dots \times X$ . Definimos una acción de  $S_n$  sobre  $X^n$  como sigue:

$$(\sigma, (x_1, \dots, x_n)) \mapsto (x_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, x_{\sigma^{-1}(n)})$$