

# EXAMEN DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA

## CURSO INTRODUCTORIO A LA PROFESIÓN

Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_ Grupo: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**1. ¿Cuál es la función principal del riñón y qué producto de desecho nitrogenado elimina mayoritariamente? (4p)**

El riñón filtra la sangre para eliminar sustancias de desecho y regular el equilibrio hídrico y electrolítico del organismo. El principal producto de desecho nitrogenado que elimina es la urea.

**2. ¿Qué es una úlcera por presión y cuál es la zona más frecuente en pacientes encamados? (5p)**

Una úlcera por presión es una lesión en la piel y tejidos subyacentes causada por la presión sostenida sobre una zona, que impide la correcta circulación sanguínea. La zona más frecuente en pacientes encamados es el sacro.

**3. ¿Cuáles son los 5 momentos del lavado de manos según la OMS? (6p)**

1. Antes de tocar al paciente; 2. Antes de realizar una técnica aséptica 3. Después del riesgo de exposición a fluidos corporales; 4. Después de tocar al paciente 5. Después de tocar el entorno del paciente

**4. ¿Qué diferencia hay entre la vía de administración subcutánea e intramuscular? (5p)**

La vía subcutánea administra el medicamento en el tejido graso bajo la piel, con absorción lenta y gradual (ej. insulina, heparina). La vía intramuscular inyecta el fármaco directamente en el músculo, con absorción más rápida y mayor volumen posible (ej. vacunas, analgésicos).

**5. ¿En qué situación se aplica la maniobra de Heimlich y en qué consiste? (6p)**

Se aplica cuando una persona sufre una obstrucción total de la vía aérea por un cuerpo extraño (atragantamiento) y no puede hablar, toser ni respirar. Consiste en colocarse detrás del paciente, rodearle el abdomen con los brazos y realizar compresiones bruscas hacia arriba y hacia adentro por encima del ombligo para expulsar el objeto.

**6. ¿Qué es el balance hídrico y cómo se calcula? (5p)**

El balance hídrico es el registro de todos los líquidos que entran y salen del organismo en un período determinado (habitualmente 24 horas). Se calcula restando las pérdidas (orina, heces, vómitos, sudor, respiración) a los ingresos (líquidos ingeridos, sueros, medicación intravenosa). Un balance positivo indica retención de líquidos; uno negativo, déficit.

**7. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial en un adulto sano? (4p)**

La presión arterial normal en un adulto sano es de 120/80 mmHg (sistólica/diastólica). Se considera normal-alta hasta 129/84 mmHg e hipertensión a partir de 140/90 mmHg.

**8. ¿Qué diferencia hay entre esterilización y desinfección? (5p)**

La esterilización elimina todos los microorganismos, incluidas esporas, de un objeto o superficie (ej. autoclave). La desinfección elimina la mayoría de microorganismos patógenos pero no necesariamente las esporas (ej. alcohol, hipoclorito). La esterilización se aplica a material que contacta con tejidos estériles; la desinfección, a superficies y material semicrítico.

**9. ¿Qué precaución debe tomarse antes de administrar un medicamento oral a un paciente con disfagia? (6p)**

Antes de administrar medicación oral a un paciente con disfagia debe valorarse si puede tragar con seguridad. Si hay riesgo de aspiración, se debe consultar con el médico para cambiar la vía de administración (parenteral, transdérmica) o triturar el medicamento si está autorizado. Nunca se deben triturar comprimidos de liberación prolongada, entéricos o sublinguales sin indicación médica.

**10. ¿Cuál es la relación compresión-ventilación en la RCP básica en adultos? (6p)**

La relación es de 30 compresiones por 2 ventilaciones (30:2). Las compresiones deben realizarse en el centro del pecho, con una profundidad de 5-6 cm y una frecuencia de 100-120 por minuto.

**11. ¿Qué es una sonda nasogástrica y para qué se usa? (4p)**

La sonda nasogástrica es un tubo flexible que se introduce por la nariz hasta el estómago a través del esófago. Se usa para nutrición enteral en pacientes que no pueden alimentarse por vía oral, administración de medicamentos, aspiración del contenido gástrico y lavado gástrico.

**12. Enumera los signos vitales y sus valores normales en un adulto. (5p)**

Temperatura: 36–37 °C; Frecuencia cardíaca: 60–100 lpm; Frecuencia respiratoria: 12–20 rpm  
Presión arterial: 120/80 mmHg; Saturación de oxígeno: ≥95%

**13. ¿Qué precauciones se establecen ante un paciente con tuberculosis pulmonar activa? (5p)**

Se deben aplicar precauciones de transmisión aérea: habitación con presión negativa o ventilación adecuada, uso de mascarilla FFP2 o FFP3 por parte del personal, puerta cerrada, y mascarilla quirúrgica para el paciente al salir de la habitación. Además, se notificará a salud pública y se realizará seguimiento de contactos.

**14. ¿Qué es la escala de Glasgow y para qué se utiliza? (5p)**

La escala de Glasgow es una herramienta de valoración neurológica que mide el nivel de consciencia. Evalúa tres parámetros: apertura ocular (1–4), respuesta verbal (1–5) y respuesta motora (1–6), con una puntuación total de 3 a 15. Se usa para monitorizar pacientes con traumatismo craneoencefálico, alteraciones de consciencia o cualquier situación neurológica crítica.

**15. ¿Qué diferencia hay entre efecto adverso y efecto secundario de un fármaco? (4p)**

El efecto secundario es un efecto conocido y predecible del fármaco que ocurre a dosis terapéuticas pero no es el efecto buscado (ej. somnolencia con antihistamínicos). El efecto adverso es una reacción nociva e inesperada que se produce a dosis normales y puede ser impredecible (ej. reacción alérgica grave).

**16. ¿Cómo se actúa ante una herida con hemorragia externa abundante? (6p)**

Se aplica compresión directa y firme sobre la herida con un apósito limpio o estéril. Si el apósito se empapa, se añade otro encima sin retirar el primero. Se eleva el miembro si es posible. Si la hemorragia no cede, se valora la compresión de la arteria proximal. Se activa el sistema de emergencias y se controlan los signos vitales hasta la llegada de ayuda.

**17. ¿Qué es la movilización pasiva y en qué pacientes está indicada? (4p)**

La movilización pasiva consiste en mover las articulaciones del paciente sin que este realice ningún esfuerzo muscular, siendo el profesional quien ejecuta el movimiento. Está indicada en pacientes

**18. ¿Qué función tiene la insulina y qué ocurre cuando hay déficit? (4p)**

La insulina es una hormona producida por el páncreas que facilita la entrada de glucosa en las células para su uso energético y regula los niveles de glucosa en sangre. Cuando hay déficit de insulina, la glucosa no puede entrar en las células, provocando hiperglucemia, y el organismo recurre a las grasas como fuente de energía, lo que puede derivar en cetoacidosis diabética.

**19. ¿Cuándo se usan guantes estériles y cuándo guantes de uso general? (4p)**

Los guantes estériles se usan en procedimientos que requieren asepsia estricta: cirugía, inserción de catéteres, curas de heridas profundas. Los guantes de uso general (no estériles) se usan para proteger al profesional del contacto con fluidos, sangre o superficies contaminadas, sin necesidad de asepsia: toma de muestras, higiene del paciente, manejo de material usado.

**20. ¿Cuáles son los síntomas de una hipoglucemia y cuál es la primera actuación? (7p)**

Los síntomas de hipoglucemia incluyen sudoración fría, temblor, palpitaciones, sensación de hambre, confusión, visión borrosa y, en casos graves, pérdida de consciencia. La primera actuación en un paciente consciente es administrar 15-20 g de hidratos de carbono de absorción rápida (un vaso de zumo, tres sobres de azúcar, o glucosa en gel). Si el paciente está inconsciente, no se administra nada por vía oral y se activa el sistema de emergencias.