

Ecuaciones diferenciales

LISTA 3

2ºM/3ºDG, CURSO 2018-19

1. Sean $y_1, y_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos soluciones de $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$.

a) Probar que su wronskiano $W = W(y_1, y_2)$ cumple $W' + P(x)W = 0$.

b) Deducir que o bien W es idénticamente nulo o bien no se anula en ningún punto.

2. Comprobar que $y(x) = x^2 \sin x$ e $y(x) = 0$ son soluciones de

$$\begin{cases} x^2 y'' - 4xy' + (x^2 + 6)y = 0 \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$$

Explicar por qué esto no contradice el teorema de unicidad de soluciones para ecuaciones lineales.

3.(*) Resolver

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 3y = 0 \\ y(0) = 6, y'(0) = 10 \end{cases}$$

4.(*) Considerar la ecuación con coeficientes constantes

$$y'' + ay' + by = 0.$$

Demostrar que la solución general tiende a 0 cuando $t \rightarrow +\infty$ si y sólo si a y b son ambos positivos.

5.(*) Hallar una solución particular de $y'' + y = \cos(x + \alpha)$ donde α es una constante.

6. Dada la ecuación homogénea $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, hacer el cambio de variables

$$\begin{aligned} s &= \phi(t) \\ z(s) &= y(t). \end{aligned}$$

Demostrar que la ecuación se transforma en una ecuación de coeficientes constantes si y sólo si $(Q' + 2PQ)/Q^{3/2}$ es constante. Determinar el cambio de variable independiente en este caso (la función $\phi(t)$), y aplicar este método (cuando sea posible) para resolver

a) $xy'' + (x^2 - 1)y' + x^3y = 0$.

b) $y'' + 3xy' + x^2y = 0$.

c) $x^2y'' + 2xy' - 12y = 0$.

d) $x^2y'' + 2xy' - 2y = 0$.

7.(*) Sabiendo que la función identidad es solución de $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$, hallar la solución general.

8.(*) Sabiendo que $x_1(t) = t^2$ es solución de

$$t^2 x'' + t x' - 4x = 0,$$

hallar una segunda solución $x_2(t)$ linealmente independiente y la solución que verifica $x(1) = 2$, $x'(1) = 0$.

9.(*) Hállese la solución general de la ecuación lineal no homogénea

$$y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

10.(*) Pruébese que el método de variación de las constantes aplicado a la ecuación

$$y'' + y = f(x),$$

conduce a la solución particular

$$y(x) = \int_0^x f(s) \operatorname{sen}(x - s) ds.$$

11.(*) Sean $x_1(t)$ y $x_2(t)$ soluciones de $x'' + P(t)x' + Q(t)x = 0$

a) Probar que si tienen un cero común entonces una de ellas es múltiplo constante de la otra.
Indicación: Encontrar una combinación lineal que satisfaga las mismas condiciones iniciales que la función nula.

b) Demostrar que la misma conclusión se obtiene cuando ambas funciones tienen máximos o mínimos relativos en un mismo punto.

12.(*) Si no hubiera rozamiento, una partícula de masa $m = 1$, se movería libremente en movimiento armónico simple alrededor del origen con frecuencia $\sqrt{2}/(2\pi)$ oscilaciones por segundo. Pero se ve afectada por una fuerza de rozamiento igual al doble de su velocidad. Hallar la ecuación de movimiento en términos de la posición x_0 y velocidad v_0 en el tiempo $t = 0$.

13.(*) La amplitud de cierto péndulo sometido a oscilaciones forzadas responde a la ecuación

$$x'' + \epsilon x' + 4x = \operatorname{sen}(\omega t)$$

donde $\epsilon > 0$ es muy pequeño. Hallar la solución estacionaria (esto es, sin términos que tiendan a cero cuando $t \rightarrow +\infty$) para $\omega = 1$ y $\omega = 2$. Explicar en qué se manifiesta el fenómeno de la resonancia.

14.(*) Sea y_1 una solución no trivial de $y'' + q(x)y = 0$ e y_2 una solución no trivial de $y'' + r(x)y = 0$, donde $q(x) > r(x) > 0$.

a) Probar que si y_1, y_2 son positivas en cierto intervalo I , entonces el wronskiano $W = W(y_1, y_2)$ es estrictamente creciente en dicho intervalo.

b) Probar que si una función $f \in C^1$ es positiva para $a < x < b$ y $f(a) = f(b) = 0$, entonces $f'(a) \geq 0 \geq f'(b)$.

c) Deducir el teorema de comparación de Sturm: Si y_1, y_2 son como en el enunciado, entonces y_1 se anula al menos una vez entre cada par de ceros consecutivos de y_2 .

15.a) Sea $y_1(x) = R(x)y_2(x)$, donde

$$2R' + P(x)R = 0.$$

Comprobar que

$$y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1 = 0$$

si y sólo si

$$y_2'' + V(x)y_2 = 0,$$

para alguna función particular $V(x)$. Calcular $R(x)$, $V(x)$ (en función de P y Q), y comprobar que $y_1(x)$, $y_2(x)$ tienen exactamente los mismos ceros.

b) Utilizar el método anterior para calcular la solución general de

$$y'' + 2xy' + (1 + x^2)y = 0.$$

16. (*) Resolver

$$\begin{cases} y''' - 3y'' + 3y' - y = 0 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 2, \quad y''(0) = 3 \end{cases}$$

17. Sabiendo que $i - 1$ es raíz del polinomio característico, calcular la solución general de

$$y^{(iv)} + 4y''' + 8y'' + 8y' + 4y = 0.$$

18. Demostrar que si $a_0 \neq 0$ entonces la ecuación $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = x^k$ tiene una única solución polinómica y ésta es de grado k .

19. (*) Hallar la solución general de $y''' - 2y'' + y' = x^2$.