

1.

$$\rho(X_1, X_2) = \frac{\text{cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{V(X_1)V(X_2)}} = \frac{V_{12}}{\sqrt{V_{11}V_{22}}}$$

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} V_{11} & V_{12} \\ V_{21} & V_{22} \end{pmatrix}$$

Sabemos (tema 1):

$$\tilde{V} = V_{11} - V_{12} V_{22}^{-1} V_{21} \xleftarrow{\text{hipótesis}} = \frac{1}{10} V_{11} \xleftarrow{V \text{ simétrica}} \Rightarrow V_{11} - \frac{V_{12}^2}{V_{22}} = \frac{1}{10} V_{11}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{10} V_{11} = \frac{V_{12}^2}{V_{22}} \Rightarrow \frac{9}{10} = \frac{V_{12}^2}{V_{11} V_{22}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\pm \sqrt{9/10}}{\sqrt{V_{11}V_{22}}} = \frac{V_{12}}{\sqrt{V_{11}V_{22}}} = \rho(X_1, X_2)}$$

V. def. positiva  
 $V_{11}, V_{22} > 0$

2.

Información traza:  $\text{traza} = 2 \Rightarrow a + c + d = 2$

Como es idempotente  $\rightarrow A^2 = A$

$\rightarrow$  todos los autovalores son 1 ó 0.  
(dos autoval=1, uno igual a 0)

$$\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & c & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & c & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & ab+bc & 0 \\ ab+bc & b^2+c^2 & 0 \\ 0 & 0 & d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & c & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$$

1º observar:  $d = d^2 \Rightarrow d = 1, 0 \rightarrow \boxed{d=1}$

2º observar:  $b = ab+bc \Rightarrow b = b(a+c) \xRightarrow{b \neq 0} a+c = 1 \rightarrow \text{A no diagonal} \quad (*)$

$$3^\circ = \begin{cases} a^2+b^2 = a \\ b^2+c^2 = c \end{cases} \quad [2]$$

Información autovector:  $(2301, 2301, 2301) \Rightarrow (1,1,1)$  también es autovector  
empezamos probando  $\lambda=1$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a+b \\ b+c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad [1]$$

$$[1] + (*) \Rightarrow \begin{cases} a+b=1 \rightarrow a=1-b \\ b+c=1 \\ a+c=1 \end{cases} \rightarrow 1-b+c=1 \Rightarrow c=b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b+c=1 \\ c=b \end{cases} \Rightarrow \boxed{b=c=\frac{1}{2}} \quad \text{Como } a=1-b=\frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{a=\frac{1}{2}}$$

Estos resultados son congruentes con [2].

Observar que para  $\lambda=0$ :  $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a+b \\ b+c \\ d \end{pmatrix} = \vec{0} \Rightarrow d=0$   
INCONGRUENTE con  $(*)$

$$\Rightarrow \begin{matrix} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{2} \\ d = 1 \end{matrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### 3. Comentarios y procedimiento:

- Primero colocamos los datos en Excel
- Añadimos una columna desde 0 a 5, que nos será útil
- Calculamos en una columna los valores de  $\chi_n^2(t)$  para  $t=0, \dots, 5$ . Escogemos temporalmente  $n=1$  (lo variaremos más adelante)
- Ahora calculamos la distr. en los rangos del enunciado restando los valores calculados en el punto anterior.
- Estimamos los valores esperados multiplicando los valores del último punto por  $m=277$ .
- Calculamos discrepancias y  $b_n = \sum_{i=1}^6 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
- Calculamos el estadístico de Pearson del enunciado:  
$$\hat{b}_n = \text{INV.CHICUAD}\left(1 - \underbrace{0.074172}_{p\text{-valor}}; \underbrace{5}_{k-1=5}\right)$$

en el teorema de Pearson ya que tenemos  $k=6$  clases
- Variamos  $n$  hasta que se ajusten  $b_n$  y  $\hat{b}_n$ .  
 $n=3$  da una muy buena aprox.



4.

$$S_n = \max \left\{ \begin{array}{l} \max \left\{ \overset{=0'01}{|U(0'01)|}, \overset{=0'01}{|U(0'01) - 1/3|} \right\} \\ \max \left\{ \overset{=0'02}{|U(0'02) - 1/3|}, \overset{=0'02}{|U(0'02) - 2/3|} \right\} \\ \max \left\{ \overset{=z}{|U(z) - 2/3|}, \overset{=z}{|U(z) - 1|} \right\} \end{array} \right\} =$$

$$= \max \left\{ \begin{array}{l} \max \{ 0'01, 0'323 \} \\ \max \{ 0'313, 0'6447 \} \\ \max \{ |z - 2/3|, |z - 1| \} \end{array} \right\}$$

Observamos ahora en la tabla de los percentiles de K-S el percentil  $n=3$ ,  $\alpha=0'05$ : sacamos el valor  $0'70760$ .

Buscamos  $S_n > 0'70760$  para rechazar. (\*)

Discernimos entre  $|z - 2/3|$  y  $|z - 1|$ . Como  $z \in [0,1] \Rightarrow$

$|z - 2/3| \leq 2/3 = 0'6 \Rightarrow$  no podemos rechazar con este

$$\Rightarrow S_n = |z - 1| = |1 - z| \overset{z \in [0,1]}{=} 1 - z$$

$$\text{Buscamos } 1 - z > 0'70760 \Rightarrow \boxed{z < 0'2924}$$

Además, como la muestra ya está ordenada:

$$\boxed{z \in [0'02, 0'2924]}$$