

HOJA 2 - ENTEROS BASE B

1.

i) $212_{(3)}$

$$\begin{array}{r} 212_{(3)} \\ 122_{(3)} \\ \hline 1201 \\ 1201 \\ 212 \\ \hline 110111_{(3)} \end{array}$$

iii) $101101_{(2)}$

$$\begin{array}{r} 101101_{(2)} \\ 11001_{(2)} \\ \hline 101101 \\ 10110100 \\ 101101 \\ \hline 10001100101 \end{array}$$

ii) $40122_{(7)} \mid 126_{(7)}$

$$\begin{array}{r} 40122_{(7)} \\ 255 \\ \hline 1132 \\ 1131 \\ \hline 00012 \end{array}$$

iv) $40011001_{(2)} \mid 1011_{(2)}$

$$\begin{array}{r} 40011001_{(2)} \\ 1011 \\ \hline 010000 \\ 1011 \\ \hline 0010101 \\ 1011 \\ \hline 01010 \end{array}$$

2.

a) base 10

$$\begin{aligned} i) m &= (a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0)_{10} = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_2 10^2 + a_1 10 + a_0 = \\ &= (a_n a_{n-1} \dots a_4 a_3) \cdot 10^3 + a_2 10^2 + a_1 10 + a_0 \end{aligned}$$

$$10^3 \equiv 0 \pmod{8} \Rightarrow (a_n a_{n-1} \dots a_4 a_3) 10^3 \equiv 0 \pmod{8}$$

Por lo tanto, m es múltiplo de 8 $\Leftrightarrow a_2 10^2 + a_1 10 + a_0$ lo es

$$\Leftrightarrow (a_2 a_1 a_0)_{10} \text{ lo es.}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad m &= (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10} = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_2 10^2 + a_1 10 + a_0 = \\
 &= a_n (10^n - 1) + 1 + a_{n-1} (10^{n-1} - 1) + 1 + \dots + a_2 (99 + 1) + \\
 &\quad + a_1 (9 + 1) + a_0 = \\
 &= (10^n - 1)a_n + a_n + a_{n-1} (10^{n-1} - 1) + a_{n-1} + \dots + a_2 \cdot 99 + \\
 &\quad + a_1 \cdot 9 + a_1 + a_0 = \\
 &= \left[\underbrace{(10^n - 1)a_n}_{\substack{n^\circ \text{ donde} \\ \text{sus } n \text{ cifras} \\ \text{son } 9\text{'s}}} + \underbrace{(10^{n-1} - 1)a_{n-1}}_{\substack{n^\circ \text{ donde} \\ \text{sus } (n-1) \\ \text{cifras son } 9\text{'s}}} + \dots + 999 \cdot a_3 + 99a_2 + 9a_1 + a_0 \right] + \\
 &\quad + \left[a_n + a_{n-1} + \dots + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 \right] = \\
 &= 9 \left[\underbrace{\gamma_n a_n + \gamma_{n-1} a_{n-1} + \dots + 111 \cdot a_3 + 11a_2 + 1a_1 + a_0}_{\substack{n^\circ \text{ donde sus } n \text{ cifras son } 1\text{'s} \quad n^\circ \text{ donde sus } (n-1) \text{ cifras} \\ \text{son } 1\text{'s}}} \right] + \\
 &\quad + \underbrace{\left[a_n + a_{n-1} + \dots + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 \right]}_{\substack{III \\ T_2}}
 \end{aligned}$$

Como T_1 es múltiplo de 9, m será múltiplo de 9 \Leftrightarrow
 $\Leftrightarrow T_2$ lo es, e.d., si la suma de sus coeficientes
 lo es.

iii) Nos fijamos en que:

$$10 \equiv -1 \pmod{11} ; \quad 100 = 10^2 \equiv 1 \pmod{11} ; \\ 1000 = 10^3 \equiv -1 \pmod{11} ; \quad 10^4 \equiv 1 \pmod{11}$$

En general: $10^n \equiv \begin{cases} 1 \pmod{11} & \text{si } n \text{ par} \\ -1 \pmod{11} & \text{si } n \text{ impar.} \end{cases}$

$$\Rightarrow a_n 10^n \equiv \begin{cases} a_n \pmod{11} & \text{si } n \text{ par} \\ -a_n \pmod{11} & \text{si } n \text{ impar} \end{cases}$$

$$\Rightarrow m = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_4 10^4 + a_3 10^3 + a_2 10^2 + a_1 10^1 + a_0 \equiv$$

$$\equiv a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 + \dots \pm a_n \pmod{11}$$

$\Rightarrow m$ será múltiplo de 11 \Leftrightarrow la suma alternada de sus coef's lo es.

b) base 21

$$\text{i) } m = b_n 21^n + b_{n-1} 21^{n-1} + \dots + b_3 21^3 + b_2 21^2 + b_1 21 + b_0 = \\ = (b_n b_{n-1} \dots b_3 b_2) \cdot 21^2 + b_1 21 + b_0$$

Como $21^2 = (7 \cdot 3)^2 = 7^2 \cdot 3^2 = 49 \cdot 9 \Rightarrow (b_n b_{n-1} \dots b_3 b_2) \cdot 21^2$ es múltiplo de 49 $\Rightarrow m$ múltiplo de 49 $\Leftrightarrow (b_n b_0)_{21}$ lo es.

ii)

$$m = b_n 21^n + b_{n-1} 21^{n-1} + \dots + b_2 21^2 + b_1 21 + b_0 =$$

$$= b_n ((21^n - 1) + 1) + b_{n-1} ((21^{n-1} - 1) + 1) + \dots + b_2 ((21^2 - 1) + 1) +$$

$$+ b_1 (20 + 1) + b_0 =$$

$$= (21^n - 1)b_n + b_n + (21^{n-1} - 1)b_{n-1} + b_{n-1} + (21^2 - 1)b_2 + b_2 +$$

$$+ 20b_1 + b_1 + b_0 =$$

$$= \underbrace{[(21^n - 1)b_n + (21^{n-1} - 1)b_{n-1} + \dots + (21^2 - 1)b_2 + 20b_1]}_{\frac{III}{I}} +$$

$$+ \underbrace{[b_n + b_{n-1} + \dots + b_2 + b_1 + b_0]}_{\frac{III}{I_2}}$$

Caso T_1 es múltiplo de 20 $\Rightarrow m$ múltiplo de 20 \Leftrightarrow
 $\Leftrightarrow T_2$ lo es \Leftrightarrow la suma de sus coef's lo es.

iii) $21 \equiv -1 \pmod{22}$; $21^2 \equiv 1 \pmod{22}$; ...

En general: $21^n \equiv \begin{cases} 1 \pmod{22} & \text{si } n \text{ par} \\ -1 \pmod{22} & \text{si } n \text{ impar} \end{cases}$

$\Rightarrow b_n 21^n \equiv \begin{cases} 1 \pmod{22} & \text{si } n \text{ par} \\ -1 \pmod{22} & \text{si } n \text{ impar} \end{cases}$

$$m = b_n 21^n + b_{n-1} 21^{n-1} + \dots + b_2 21^2 + b_1 21 + b_0 \equiv$$

$$b_0 - b_1 + b_2 - b_3 + \dots \pm b_n \pmod{22}$$

$\Rightarrow m$ será múltiplo de 22 \Leftrightarrow la suma alternada de sus coef's lo es.

c) $(1222)_3 = 1 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 2 = 53_{(10)}$

$$53 = 5 \cdot 9 + 8 \Rightarrow (1222)_3 = (58)_9$$

3.

$$i) b^k - 1 = (b-1)b^{k-1} + (b-1)b^{k-2} + \dots + (b-1)b + (b-1) = \\ = (b-1, b-1, b-1, \dots, b-1)_b \quad (k \text{ coordenadas})$$

$$ii) \Rightarrow m \text{ tiene longitud } k \Leftrightarrow (a_{k-1} \neq 0) \wedge (a_j = 0 \quad \forall j \geq k)$$

Como $(b-1)b^{k-1} + \dots + (b-1)b + (b-1)$ es el mayor número menor que b^k en base b (apartado i) \Rightarrow

$$\Rightarrow m \leq b^k$$

Análogo para m con longitud $l < k$.

\Leftarrow

Si $m < b^k$, m es como mucho:

$$m = (b-1)b^{k-1} + \dots + (b-1)b + (b-1) \text{ por el apartado i}$$

Como $a_{k-1} \neq 0$ y $a_j = 0 \quad \forall j \geq k \Rightarrow m$ tiene longitud $\leq k$

iii) $\Rightarrow m$ tiene longitud k . Ya sabemos que $m < b^k$ por el apartado ii). Ahora, por def. de longitud en base b , m tiene longitud $k \Leftrightarrow [(a_{k-1} \neq 0) \wedge (a_j = 0 \quad \forall j \geq k)]$, por lo que m es, como mínimo, $1 \cdot b^{k-1} \Rightarrow m \geq b^{k-1}$.

$$\Leftarrow b^{k-1} \leq m < b^k \Rightarrow a_{k-1} \neq 0 \text{ y } 0 = a_k = a_{k+1} = a_{k+2} = \dots$$

\Rightarrow por def. de longitud en base b , m tiene longitud k .

4.

$$n = a_{k-1}b^{k-1} + a_{k-2}b^{k-2} + \dots + a_1b + a_0 \quad (0 \leq a_i \leq b-1)$$

longitud k ($a_{k-1} \neq 0$)

$$i) \text{ Como } b^{k-1} - 1 = (b-1)b^{k-2} + (b-1)b^{k-3} + \dots + (b-1)b + (b-1)$$

$$\Rightarrow (b-1)b^{k-2} + (b-1)b^{k-3} + \dots + (b-1)b + (b-1) < b^{k-1}$$

Esto último más el apartado i) del ejercicio 3 nos permite asegurar que no hay múltiplos de b^{k-1} entre sus coeficientes anteriores, por lo tanto, el número máximo de múltiplos de b^{k-1} es a_{k-1} (de otra forma se podría formar otro grupo de b^{k-1} y a_{k-1} se incrementaría).

$$ii) n = a_{k-1}b^{k-1} + a_{k-2}b^{k-2} + \dots + a_1b + a_0 =$$

$$= a_{k-1}b^{k-2} \cdot b + a_{k-2}b^{k-2} + \dots + a_1b + a_0 =$$

$$= (a_{k-1}b + a_{k-2})b^{k-2} + \dots + a_1b + a_0$$

Por el apartado i) de este ejercicio podemos asegurar que el número máximo de múltiplos de b^{k-2} es

$$a_{k-1}b + a_{k-2}$$

$$iii) \frac{n}{b^{k-2}} = \frac{a_{k-1}b^{k-1}}{b^{k-2}} + \frac{a_{k-2}b^{k-2}}{b^{k-2}} + \frac{a_{k-3}b^{k-3}}{b^{k-2}} + \dots + \frac{a_1b}{b^{k-2}} + \frac{a_0}{b^{k-2}} =$$

$$= a_{k-1}b + a_{k-2} + a_{k-3} \underbrace{\frac{1}{b}}_{< 1} + a_{k-4} \underbrace{\frac{1}{b^2}}_{< 1} + \dots + a_1 \underbrace{\frac{1}{b^{k-3}}}_{< 1} + a_0 \underbrace{\frac{1}{b^{k-2}}}_{< 1}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{n}{b^{k-2}} \right] = a_{k-1}b + a_{k-2}$$

$$iv) \quad n = \left[\frac{n}{b_i} \right] b_i + r \quad \text{apartado iii (en general)}$$

$$\left[\frac{n}{b_i} \right] = a_{k-1} b^{k-1-i} + a_{k-2} b^{k-2-i} + \dots + a_{i+1} b + a_i$$

$$r = a_0 + a_1 b + a_2 b^2 + \dots + a_{i-1} b^{i-1}$$

5. Como $n!$ es el producto de todos los enteros desde 1 a n , tenemos al menos un factor de p en $n!$ por cada múltiplo de p en $\{1, 2, \dots, n\}$, que hay un total de $\left[\frac{n}{p} \right]$ por el ej. 4 apart. i). Adicionalmente, cada múltiplo de p^2 contribuye con otro factor de p , cada múltiplo de p^3 contribuye con otro, etc.

Sumando todo obtenemos $\alpha = \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \dots + \left[\frac{n}{p^s} \right] + \dots$

A partir de $s = k+1$ los sumandos son nulos.

Por lo tanto, hemos contado todas las apariciones de p como factor en $n!$ y entonces la potencia máxima de p que divide a $n!$ es p^α . ■