

# Caschool Parte 2

Joel Alejandro Zavala Prieto

## Contents

Informacion de contacto	2
Descripción del problema	3
Modelo	3
Visualización de los datos	4
Modelo ajustado	5
Inferencias respecto a los parámetros estimados	6
Intervalo de confianza para los parametros estimados	9
Creación de variables Dummy	10
Regrsión con variables dummy . . . . .	11

## Informacion de contacto

Mail: [alejandro.zavala1001@gmail.com](mailto:alejandro.zavala1001@gmail.com)

Facebook: <https://www.facebook.com/AlejandroZavala1001>

Git: <https://github.com/AlejandroZavala98>

## Descripción del problema

La base de datos caschool.RData contiene informacion de las calificaciones de estudiantes de puntaje de prueba de California

Una pequeña descripción de las variables de la base de datos se da a continuación

```
## Loading required package: zoo
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'zoo'
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      as.Date, as.Date.numeric
```

dist_code:	district Code;
Read_scr:	avg Reading Score;
Math_scr:	avg Math Score;
County :	county;
District:	District;
gr_span:	grade span of district;
enrl_tot :	total enrollment;
teachers:	number of teachers;
computer:	number of computers;
testscr:	avg test score (= (read_scr+math_scr)/2 );
comp_stu:	computers per student ( = computer/enrl_tot);
expn_stu:	expenditures per student (\$'s);
str:	NA
el_pct:	percent of English Learners;
Meal_pct:	Percent qualifying for reduced-price lunch;
cAlw_pct:	Percent qualifying for CalWorks;
avGinc:	district average income (in \$1000's);

## Modelo

Se propone el modelo

$$\begin{aligned} testscr_i &= \beta_0 + \beta_1 str_i + u_i \\ i &= 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

El nombre de columnas de la base de datos se muestra a continuación

```
## [1] "Observation Number" "dist_cod"      "county"
## [4] "district"            "gr_span"      "enrl_tot"
## [7] "teachers"            "calw_pct"     "meal_pct"
## [10] "computer"            "testscr"      "comp_stu"
## [13] "expn_stu"            "str"          "avginc"
## [16] "el_pct"              "read_scr"     "math_scr"
```

Mostrando las primeras observaciones de la tabla para las variables requeridas


dist_cod	testscr	str
75119	690.80	17.88991
61499	661.20	21.52466
61549	643.60	18.69723
61457	647.70	17.35714
61523	640.85	18.67133
62042	605.55	21.40625

El modelo ajustado es

$$\begin{aligned} \text{testscr}_i &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \text{str}_i \\ i &= 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

## Visualización de los datos

Una visualización previa de los datos



La regresión del modelo es


```
##  
## Call:  
## lm(formula = testscr ~ str, data = caschool)  
##  
## Coefficients:  
## (Intercept)          str  
##      698.93         -2.28
```

## Modelo ajustado

El modelo ajustado es

$$\begin{aligned} \text{testscr}_i &= 698.93 - 2.28\text{str}_i \\ i &= 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

De tal forma



## Inferencias respecto a los parámetros estimados

El tamaño de la muestra es:

## [1] 420

Recordemos que para hacer inferencias a los parámetros estimados se tiene la prueba de hipótesis

$$\begin{aligned}V[\hat{\beta}_0] &= c_{00}\sigma^2 \\c_{00} &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{nS_{xx}} \\V[\hat{\beta}_1] &= c_{11}\sigma^2 \\c_{11} &= \frac{1}{S_{xx}}\end{aligned}$$

Para la prueba de hipótesis

$$H_0 : \beta_i = \beta_{i0}$$

Se usa el estadístico de prueba

$$Z = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_{i0}}{\sigma\sqrt{c_{ii}}}$$

Que a su vez

$$\begin{aligned}T &= \frac{\hat{\beta}_i - \beta_{i0}}{S\sqrt{c_{ii}}} \\S &= \sqrt{\frac{SRC}{n-2}}\end{aligned}$$

Ahora queremos probar

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{contra} \quad H_a : \beta_1 \neq 0$$

Que tiene una distribución t de Student con n-2 grados de libertad

Recordemos que un estimador insesgado para  $\sigma^2$  es  $S^2$

$$S^2 = \frac{SRC}{n-2}$$

Recordemos que la Suma Total de Cuadrados “STC”

$$STC = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

## [1] 152109.6

Recordemos que la Suma explicada de cuadrados “SEC”

$$SEC = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

## [1] 7794.11

Recordemos que la Suma de residuales cuadrados “SRC”

$$SRC = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

## [1] 144315.5

De tal modo nuestro estimador  $S$

## [1] 18.58097

Calculando  $S_{xx}$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

## [1] 1499.581

Ahora para  $c_{00}$

## [1] 0.259617

Ahora para  $c_{11}$

## [1] 0.000666853

Volviendo a la prueba de hipótesis

Para el estimador  $\beta_1$  el estadístico T es:

```
##          str
## -4.751327
```

Notemos ademas que el valor p:

$$p = 2P(t > t_{estimado})$$
$$p = 2P(t > -4.75) \text{ es una t con } 420-2=118 \text{ grados de libertad}$$

Cuyo valor p es:

```
##          str
## 2.020858e-06
```

Si probamos

$$H_0 : \beta_0 = 0 \text{ contra } H_a : \beta_0 \neq 0$$

Nuestro estadístico t seria:

```
## (Intercept)
##      73.82451
```

Cuyo valor p es:

```
## (Intercept)
##           0
```

Por linea de comando

```
##
## Call:
## lm(formula = testscr ~ str, data = caschool)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -47.727 -14.251   0.483  12.822  48.540
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  698.9330     9.4675   73.825 < 2e-16 ***
## str          -2.2798     0.4798  -4.751 2.78e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 18.58 on 418 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.05124,    Adjusted R-squared:  0.04897
## F-statistic: 22.58 on 1 and 418 DF,  p-value: 2.783e-06
```



## Intervalo de confianza para los parametros estimados

Un intervalo de confianza  $100(1 - \alpha)$  para  $\beta_i$

$$\beta_i \pm t_{\alpha/2} S \sqrt{c_{ii}}$$

Para  $\beta_0$

```
##               inf      sup
## (Intercept) 680.3767 717.4892
```

Para  $\beta_1$

```
##               inf      sup
## str -3.220266 -1.33935
```

Por linea de comando

```
##               2.5 %    97.5 %
## (Intercept) 680.32313 717.542779
## str        -3.22298  -1.336637
```

## Creación de variables Dummy

Una variable binaria (que toma o transforma información en una o mas categorías) se denomina asimismo variable indicador o a veces variable ficticia o variable dummy.

Veamos las primeras 30 observaciones haciendo:

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{Si str del distrito i-ésimo es menor a 20} \\ 0 & \text{Si str del distrito i-ésimo es mayor o igual a 20} \end{cases}$$

testscr	str	dummy
690.80	17.88991	1
661.20	21.52466	0
643.60	18.69723	1
647.70	17.35714	1
640.85	18.67133	1
605.55	21.40625	0
606.75	19.50000	1
609.00	20.89412	0
612.50	19.94737	1
612.65	20.80556	0
615.75	21.23809	0
616.30	21.00000	0
616.30	20.60000	0
616.30	20.00822	0
616.45	18.02778	1
617.35	20.25196	0
618.05	16.97787	1
618.30	16.50980	1
619.80	22.70402	0
620.30	19.91111	1

El modelo de regresión poblacional con  $D_i$

$$\begin{aligned} testscr_i &= \beta_0 + \beta_1 D_i \\ i &= 1, 2, 3, \dots, n \end{aligned}$$

Si la variable str es alta, entonces  $D_i = 0$ . De tal forma la ecuación se reduce a

$$testscr_i = \beta_0 + \epsilon_i$$

Pero si la variable str es baja, entonces  $D_i = 1$ . De tal forma la ecuación se reduce a

$$testscr_i = \beta_0 + \beta_1 + \epsilon_i$$

## Regrsión con variables dummy

Si realizamos una regresión al modelo, se obtiene

```
##
## Call:
## lm(formula = testscr ~ dummy, data = df_dummy)
##
## Coefficients:
## (Intercept)      dummy
##      649.979      7.372
```

El modelo ajustado es:

$$\hat{testscr}_i = 649.979 + 7.372D_i$$

Y un resumen general

```
##
## Call:
## lm(formula = testscr ~ dummy, data = df_dummy)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -50.601 -14.047  -0.451  12.841  49.399
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   649.979      1.388  468.380 < 2e-16 ***
## dummy          7.372      1.843   3.999 7.52e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 18.72 on 418 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.03685,    Adjusted R-squared:  0.03455
## F-statistic: 15.99 on 1 and 418 DF,  p-value: 7.515e-05
```

Y un intervalo de confianza para los estimadores

```
##              2.5 %    97.5 %
## (Intercept) 647.251075 652.70662
## dummy       3.748774  10.99605
```