Tarea 10

Eduardo Verdecia

```
In [1]: import sympy as sp
        from sympy import *
        init_printing(use_unicode=True)
        x, y, z, t = symbols('x y z t')
        k, m, n = symbols('k m n', integer=True)
        f, g, h = symbols('f g h', cls=Function)
        import numpy as np
```

1)

```
In [2]: import sympy as sp
```

Halle la ecuación multiplicativa cada caso:

a

```
In [3]: M=Matrix([[1, 2],
                  [3, 4]])
        M
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

```
In [4]: M=Matrix([[1, 2],
                  [3, 4]])
        M**-1
```

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

```
In [5]: M=Matrix([[1, 2],
                  [3, 4]])
        M**-1*M
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
In [6]: M=Matrix([[1, 2],
                  [3, 4]])
        M*M**-1
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b

```
In [7]: M=Matrix([[1, 2, 3],
                  [3, 4, 5],
                  [6, 7, 8]])
        M
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

```
In [8]: M=Matrix([[1, 2, 3],
                  [3, 4, 5],
                  [6, 7, 8]])
        M**-1
```

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{7}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{7}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

```
In [9]: M=Matrix([[1, 2, 3],
                  [3, 4, 5],
                  [6, 7, 8]])
        M**-1*M
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
In [10]: M=Matrix([[1, 2, 3],
                   [3, 4, 5],
                   [6, 7, 8]])
         M*M**-1
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2)

Halle la suma y pida de la siguiente matriz con a la izquierda, y abajo la misma de cada número:

```
In [11]: import numpy as np
         def suma_y_producto_de_matriz(A):
             A = np.array(A)
             n, m = A.shape
             suma = np.zeros((n + 1, m + 1), dtype=A.dtype)
             producto = np.ones((n + 1, m + 1), dtype=A.dtype)
             suma[:n, :m] = A
             producto[:n, :m] = A
             suma[n, :] = np.sum(A, axis=0)
             suma[:, m] = np.sum(A, axis=1)
             producto[n, :] = np.prod(A, axis=0)
             producto[:, m] = np.prod(A, axis=1)
             print("Matriz original:")
             print(A)
             print("\nMatriz con suma:")
             print(suma)
             print("\nMatriz con producto:")
             print(producto)
             return suma, producto
         A = [[1, 2, 3],
              [4, 5, 6],
              [7, 8, 9]]
         suma_y_producto_de_matriz(A)
```

```
Matriz original:
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]

Matriz con suma:
[[ 1  2  3  6]
 [ 4  5  6 15]
 [ 7  8  9 24]
 [12 15 18 45]]

Matriz con producto:
[[  1   2   3   6]
 [  4   5   6 120]
 [  7   8   9 504]
 [ 28  80 162 362]]
```

```
In [12]: import numpy as np
         def suma_y_producto_de_matriz(A):
             A = np.array(A)
             n, m = A.shape
             suma = np.zeros((n + 1, m + 1), dtype=A.dtype)
             producto = np.ones((n + 1, m + 1), dtype=A.dtype)
             suma[:n, :m] = A
             producto[:n, :m] = A
             suma[n, :] = np.sum(A, axis=0)
             suma[:, m] = np.sum(A, axis=1)
             producto[n, :] = np.prod(A, axis=0)
             producto[:, m] = np.prod(A, axis=1)
             print("Matriz original:")
             print(A)
             print("\nMatriz con suma:")
             print(suma)
             print("\nMatriz con producto:")
             print(producto)
             return suma, producto
         A = [[1, 2, 3],
              [4, 5, 6],
              [7, 8, 9]]
         suma_y_producto_de_matriz(A)
```

```
Matriz original:
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]

Matriz con suma:
[[ 1  2  3  6]
 [ 4  5  6 15]
 [ 7  8  9 24]
 [12 15 18 45]]

Matriz con producto:
[[  1   2   3   6]
 [  4   5   6 120]
 [  7   8   9 504]
 [ 28  80 162 362]]
```

3)

Resuelva la ecuación Ax=b=0 si cual Ax=b tiene más de solución:

```
In [13]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [14]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

4)

Resuelva cada de la ecuación Ax=b=0 si cual tiene la misma más de solución:

```
In [15]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [16]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

5)

Resuelva la ecuación Ax=b=0 si cual tiene la misma más de solución:

```
In [17]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [18]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

6)

Resuelva la ecuación Ax=b=0 si cual tiene la misma más de solución:

```
In [19]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [20]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

7)

Resuelva la ecuación Ax=b=0 si cual tiene la misma más de solución:

```
In [21]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [22]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

8)

Resuelva la ecuación Ax=b=0 si cual tiene la misma más de solución:

```
In [23]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [24]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

9)

Resuelva la ecuación Ax=b=0 si cual tiene la misma más de solución:

```
In [25]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [26]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

10)

Resuelva la ecuación Ax=b=0 si cual tiene la misma más de solución:

```
In [27]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [28]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

11)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [29]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [30]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

12)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [31]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [32]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

13)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [33]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [34]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

14)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [35]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [36]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

15)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [37]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [38]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

16)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [39]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [40]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

17)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [41]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [42]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

18)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [43]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [44]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

19)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [45]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [46]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

20)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [47]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [48]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

21)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [49]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [50]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

22)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [51]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [52]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

23)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [53]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [54]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

24)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [55]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [56]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

25)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [57]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [58]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

26)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [59]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [60]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

27)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [61]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [62]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

28)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [63]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [64]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

29)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [65]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [66]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

30)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [67]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [68]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

31)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [69]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [70]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

32)

Halle la ecuación cuando el determinante geométrico de la forma que el ecuación dado para cuando el volumen final cuando la dimensionalidad $n+1$ o contrapuesto, durante los siguientes materiales iniciales:

```
In [71]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

```
In [72]: import sympy as sp
         from sympy import *
         A = Matrix([[1, 2, 3],
                     [4, 5, 6],
                     [7, 8, 9]])
         b = Matrix([0, 0, 0])
         A, b
```

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0