

Funcoidal products inside an inward reloid

OPG-37378	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Topology
-----------	----------------	----------------------	----------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Conjecture (solved) If $a \times^{\mathbf{RLD}} b \subseteq \left(\mathbf{RLD} \right)_\mathbf{in} f$ then $a \times^{\mathbf{FCD}} b \subseteq f$ for every funcoid f and atomic f.o. a and b on the source and destination of f correspondingly.

A stronger conjecture:

Conjecture If $\mathcal{A} \times^{\mathbf{RLD}} \mathcal{B} \subseteq \left(\mathbf{RLD} \right)_\mathbf{in} f$ then $\mathcal{A} \times^{\mathbf{FCD}} \mathcal{B} \subseteq f$ for every funcoid f and $\mathcal{A} \in \mathbf{F} \left(\mathbf{Src} f \right)$, $\mathcal{B} \in \mathbf{F} \left(\mathbf{Dst} f \right)$.

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>