

```

[>
[> with(plots) :
> #Найти свертку функций  $f(x)$  и  $g(x)$ , если функция  $f(x)$  принимает значение,
    равное нулю при  $x \notin [x_1, x_4]$ , а при  $x \in [x_1,$ 
     $x_4]$  ее график состоит из звеньев ломаной  $ABCD$ 
[> x1 := -1 :
    x2 := 2 :
    x3 := 3 :
    x4 := 5 :
    a := 1 :
    b := -2 :
[> A(x1, a);
    B(x2, a);
    C(x3, b);
    D1(x4, 0);
                                A(-1, 1)
                                B(2, 1)
                                C(3, -2)
                                D1(5, 0)
(1)
[> g(x) := piecewise(x < 0, 0, `and`(x ≥ 0, x < 1), 1, x ≥ 1, 0) :
g(x)


```

$$\left\{ \begin{array}{ll} 0 & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x < 1 \\ 0 & 1 \leq x \end{array} \right. \quad (2)$$

```

[> plot(g(x), x=-1..2)

```



#Найдем функцию $f(x)$ как уравнение прямой по двум точкам: две точки (x_1, y_1) , (x_2, y_2)

тогда уравнение прямой имеет вид $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

Первые две точки $A(-1, 1)$ и $B(2, 1)$,

тогда уравнение прямой имеет вид $\frac{y - 1}{1 - 1} = \frac{x - (-1)}{2 - (-1)} \Rightarrow y = 1$ на $-1 < x \leq 2$

Следующие две точки $B(2, 1)$ и $C(3, -2)$,

тогда уравнение прямой имеет вид $\frac{y - 2}{-2 - 1} = \frac{x - 2}{3 - 2} \Rightarrow y = -3 \cdot x + 7$ на $2 < x \leq 3$

Следующие две точки $C(3, -2)$ и $D(5, 0)$,

тогда уравнение прямой имеет вид $\frac{y - (-2)}{0 - (-2)} = \frac{x - 3}{5 - 3} \Rightarrow y = x - 5$ на $3 < x \leq 5$

#Получаем функцию $f(x)$:


$\left[\begin{array}{l} \text{> } f(x) := \text{piecewise}(x \leq -1, 0, \text{`and`}(x > -1, x \leq 2), 1, \text{`and`}(x > 2, x \leq 3), -3 \cdot x + 7, \text{`and`}(x \\ > 3, x \leq 5), x - 5, x > 5, 0) : \end{array} \right.$

$f(x)$

$$\begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ 1 & -1 < x \leq 2 \\ -3x + 7 & 2 < x \leq 3 \\ -5 + x & 3 < x \leq 5 \\ 0 & 5 < x \end{cases}$$

(3)

> `plot(f(x), x=-2..6)`



> #Найдем свертку функций $f(x)$ и $g(x)$ по формуле $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi)g(x-\xi) d\xi$

> #Запишем функции $f(\xi)$ и $g(x-\xi)$:

> $f(\xi) := \text{piecewise}(\xi \leq -1, 0, \text{'and'}(\xi > -1, \xi \leq 2), 1, \text{'and'}(\xi > 2, \xi \leq 3), -3 \cdot \xi + 7, \text{'and'}(\xi > 3, \xi \leq 5), \xi - 5, \xi > 5, 0)$:

$f(\xi)$

$$\left\{ \begin{array}{ll} 0 & \xi \leq -1 \\ 1 & -1 < \xi \leq 2 \\ -3\xi + 7 & 2 < \xi \leq 3 \\ -5 + \xi & 3 < \xi \leq 5 \\ 0 & 5 < \xi \end{array} \right. \quad (4)$$

$$\begin{aligned} & \text{> } g(x-\xi) := \text{piecewise}(x-\xi < 0, 0, \text{'and'}(x-\xi \geq 0, x-\xi < 1), 1, x-\xi \geq 1, 0); \\ & \quad g(x-\xi) := \left\{ \begin{array}{ll} 0 & x-\xi < 0 \\ 1 & 0 \leq x-\xi < 1 \\ 0 & 1 \leq x-\xi \end{array} \right. \quad (5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{> } g(x-\xi) := \text{piecewise}(\xi \leq x-1, 0, \text{'and'}(\xi > x-1, \xi \leq x), 1, \xi > x, 0); \\ & \quad g(x-\xi) := \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \xi \leq -1+x \\ 1 & -1+x < \xi \leq x \\ 0 & x < \xi \end{array} \right. \quad (6) \end{aligned}$$

Подставим в интервалы функции $g(x)$ значения $-1, 2, 3, 5$

при $\xi = -1$:

$x < -1$

$-1 \leq x < 0$

$x \geq 0$

при $\xi = 2$:

$x < 2$

$2 \leq x < 3$

$x \geq 3$

при $\xi = 3$:

$x < 3$

$3 \leq x < 4$

$x \geq 4$


при $\xi = 5$:

$x < 5$


$5 \leq x < 6$

$x \geq 6$


a) $x < -1$




б) $-1 \leq x < 0$




в) $0 \leq x \leq 2$




г) $2 \leq x < 3$




д) $3 \leq x < 4$




е) $4 \leq x < 5$



ж) $5 \leq x < 6$



з) $x \geq 6$



#В зависимости от того, какие значения принимает переменная x , приходим к следующим возможным случаям(рассмотрим рисунок)

- [> a)
- [> $x < -1$
- [> $(f * g)(x) = 0$:

$$\begin{aligned}
 &> 5) \\
 &> -1 \leq x < 0 \\
 &> (f * g)(x) := \int_{-1}^x 1 \cdot 1 \, d\xi \\
 &> \int_{-1}^x 1 \cdot 1 \, d\xi \\
 & \qquad \qquad \qquad x + 1
 \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
 &> 6) \\
 &> 0 \leq x < 2 \\
 &> (f * g)(x) = \int_{x-1}^x 1 \cdot 1 \, d\xi \\
 &> \int_{x-1}^x 1 \cdot 1 \, d\xi \\
 & \qquad \qquad \qquad 1
 \end{aligned} \tag{8}$$

$$\begin{aligned}
 &> 7) \\
 &> 2 \leq x < 3 \\
 &> (f * g)(x) = \int_{x-1}^2 1 \cdot 1 \, d\xi + \int_2^x (-3 \cdot \xi + 7) \cdot 1 \, d\xi \\
 &> \int_{x-1}^2 1 \cdot 1 \, d\xi + \int_2^x (-3 \cdot \xi + 7) \cdot 1 \, d\xi \\
 & \qquad \qquad \qquad -5 + 6x - \frac{3}{2} x^2
 \end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned}
 &> 8) \\
 &> 3 \leq x < 4 \\
 &> (f * g)(x) = \int_{x-1}^3 (-3 \cdot \xi + 7) \cdot 1 \, d\xi + \int_3^x (\xi - 5) \cdot 1 \, d\xi \\
 &> \int_{x-1}^3 (-3 \cdot \xi + 7) \cdot 1 \, d\xi + \int_3^x (\xi - 5) \cdot 1 \, d\xi \\
 & \qquad \qquad \qquad 25 + \frac{3(x-1)^2}{2} - 12x + \frac{x^2}{2}
 \end{aligned} \tag{10}$$

$$\begin{aligned}
 &> 9) \\
 &> 4 \leq x < 5 \\
 &> (f * g)(x) = \int_{x-1}^x (\xi - 5) \cdot 1 \, d\xi \\
 &> \int_{x-1}^x (\xi - 5) \cdot 1 \, d\xi \\
 & \qquad \qquad \qquad -5 + \frac{x^2}{2} - \frac{(x-1)^2}{2}
 \end{aligned} \tag{11}$$


$$\begin{aligned}
& \text{> } \mathcal{H}) \\
& \text{> } 5 \leq x < 6 \\
& \text{> } (f * g)(x) = \int_{x-1}^5 (\xi - 5) \cdot 1 \, d\xi \\
& \text{> } \int_{x-1}^5 (\xi - 5) \cdot 1 \, d\xi \\
& \qquad \qquad \qquad -\frac{35}{2} + 5x - \frac{(x-1)^2}{2}
\end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
& \text{> } 3) \\
& \text{> } x \geq 6 \\
& \text{> } (f * g)(x) = 0 :
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{> } \# \text{В итоге получаем функцию} \\
& \text{> } f_g(x) = (f * g)(x) : \\
& \text{> } f_g(x) := \text{piecewise} \left(x < -1, 0, -1 \leq x < 0, x + 1, 0 \leq x < 2, 1, 2 \leq x < 3, -5 + 6x \right. \\
& \qquad \qquad \qquad \left. -\frac{3}{2}x^2, 3 \leq x < 4, 25 + \frac{3(x-1)^2}{2} - 12x + \frac{x^2}{2}, 4 \leq x < 5, -5 + \frac{x^2}{2} - \frac{(x-1)^2}{2}, 5 \right. \\
& \qquad \qquad \qquad \left. \leq x < 6, -\frac{35}{2} + 5x - \frac{(x-1)^2}{2}, x \geq 6, 0 \right) : \\
& f_g(x)
\end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} 0 & x < -1 \\ x + 1 & -1 \leq x < 0 \\ 1 & 0 \leq x < 2 \\ -5 + 6x - \frac{3}{2}x^2 & 2 \leq x < 3 \\ 25 + \frac{3(x-1)^2}{2} - 12x + \frac{x^2}{2} & 3 \leq x < 4 \\ -5 + \frac{x^2}{2} - \frac{(x-1)^2}{2} & 4 \leq x < 5 \\ -\frac{35}{2} + 5x - \frac{(x-1)^2}{2} & 5 \leq x < 6 \\ 0 & 6 \leq x \end{array} \right. \tag{13}$$

$$\text{> } \text{plot}(f_g(x), x = -2..7)$$



>

свертка функций $f(x)$ и $g(x)$ склеилась во всех точках, следовательно найдена верно

```
> restart;
> with(plots) :
> #Найти образ Фурье функции  $f(x)$ , если  $f(x) \equiv 0$  при  $x \notin [x1, x4]$ , а при  $x \in [x1, x4]$  график
    этой функции состоит из звеньев ломаной, проходящей через точки  $A(x1, y1)$ ,  $B(x2, y2)$ ,  $C(x3, y3)$ ,  $D1(x4, y4)$ .
> A(-2, 1) :
    B(-1, 1) :
    C(1, -2) :
    D1(3, 1) :
```

#Найдем функцию $f(x)$ как уравнение прямой по двум точкам: две точки $(x1, y1)$, $(x2, y2)$

тогда уравнение прямой имеет вид $\frac{y - y1}{y2 - y1} = \frac{x - x1}{x2 - x1}$

Первые две точки $A(-2, 1)$ и $B(-1, 1)$,

тогда уравнение прямой имеет вид $\frac{y - 1}{1 - 1} = \frac{x - (-2)}{-1 - (-2)} \Rightarrow y = 1$ на $-2 < x \leq -1$

Следующие две точки $B(-1, 1)$ и $C(1, -2)$,

тогда уравнение прямой имеет вид $\frac{y-1}{-2-1} = \frac{x-(-1)}{1-(-1)} \Rightarrow y = \frac{-3 \cdot x - 1}{2}$ на $-1 < x \leq 1$


Следующие две точки $C(1, -2)$ и $D(3, 1)$,

тогда уравнение прямой имеет вид $\frac{y-(-2)}{1-(-2)} = \frac{x-1}{3-1} \Rightarrow y = \frac{3 \cdot x - 7}{2}$ на $1 < x \leq 3$

#Получаем функцию $f(x)$:

$$\left[\begin{array}{l} \text{> } f(x) := \text{piecewise}\left(x \leq -2, 0, -2 < x \leq -1, 1, -1 < x \leq 1, \frac{-3 \cdot x - 1}{2}, 1 < x \leq 3, \frac{3 \cdot x - 7}{2}, x \right. \\ \left. > 3, 0 \right) : \\ f(x) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{ll} 0 & x \leq -2 \\ 1 & -2 < x \leq -1 \\ -\frac{3x}{2} - \frac{1}{2} & -1 < x \leq 1 \\ \frac{3x}{2} - \frac{7}{2} & 1 < x \leq 3 \\ 0 & 3 < x \end{array} \right. \quad (14)$$

> plot(f(x), x=-3..4)



Представим функцию $f(x)$ в виде суммы "треугольного импульса" и "прямоугольного импульса"

> #График функции $f1(x)$ - "прямоугольный импульс"

> $f1(x) := \text{rect}\left(\frac{x-m}{d}\right)$, m — середина отрезка $[a, b]$, d — длина отрезка $[a, b]$

> $a := -2$;
 $b := -1$;

$$m := \frac{a+b}{2}$$

$$m := -\frac{3}{2} \quad (15)$$

$$d := b - a$$

$$d := 1 \quad (16)$$

$$f1(x) := \text{rect}\left(\frac{x-m}{d}\right) :$$

$$f1(x)$$

$$\text{rect}\left(x + \frac{3}{2}\right) \quad (17)$$

[> #График функции $f_2(x)$ - "треугольный импульс"

> $f_2(x) := c_1 \cdot \Lambda\left(\frac{x - m_1}{d_1}\right) + \text{rect}\left(\frac{x - m_2}{d_2}\right)$, m_1, m_2 – середина отрезка $[c, f]$, d_1, d_2

– длина отрезка $[c, f]$, c_1

– растяжение вдоль оси ординат и отражение относительно оси абсцисс

$c := -1$:

$c_1 := -3$:

$f := 3$:

$$m_1 := \frac{c + f}{2}$$

$$m_1 := 1 \quad (18)$$

$$d_1 := \frac{f - c}{2}$$

$$d_1 := 2 \quad (19)$$

$$m_2 := \frac{c + f}{2}$$

$$m_2 := 1 \quad (20)$$

$$d_2 := f - c$$

$$d_2 := 4 \quad (21)$$

$$f_2(x) := c_1 \cdot \Lambda\left(\frac{x - m_1}{d_1}\right) + \text{rect}\left(\frac{x - m_2}{d_2}\right) :$$

$f_2(x)$

$$-3 \Lambda\left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{2}\right) + \text{rect}\left(-\frac{1}{4} + \frac{x}{4}\right) \quad (22)$$

[> #Таким образом, функция $f(x)$ представляет собой сумму "треугольного импульса" и двух "прямоугольных импульсов":

> $f(x) := f_1(x) + f_2(x)$;

$$f := x \rightarrow f_1(x) + f_2(x) \quad (23)$$

> $f(x)$

$$\text{rect}\left(x + \frac{3}{2}\right) - 3 \Lambda\left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{2}\right) + \text{rect}\left(-\frac{1}{4} + \frac{x}{4}\right) \quad (24)$$

[> #Найдем образ Фурье функции $f(x)$:

$$F[f](v) := d \cdot e^{-I \cdot 2 \cdot \pi \cdot v \cdot m} \cdot \frac{\sin(\pi \cdot v \cdot d)}{\pi \cdot v \cdot d} + d_2 \cdot e^{-I \cdot 2 \cdot \pi \cdot v \cdot m_2} \cdot \frac{\sin(\pi \cdot v \cdot d_2)}{\pi \cdot v \cdot d_2} + c_1 \cdot d_1 \cdot e^{-I \cdot 2 \cdot \pi \cdot v \cdot m_1} \cdot \frac{\sin^2(\pi \cdot v \cdot d_1)}{(\pi \cdot v \cdot d_1)^2}$$

$$F_f := v \rightarrow \frac{d e^{-2I \pi v m} \sin(\pi v d)}{\pi v d} + \frac{d_2 e^{-2I \pi v m_2} \sin(\pi v d_2)}{\pi v d_2} + \frac{c_1 d_1 e^{-2I \pi v m_1} \sin^2(\pi v d_1)}{\pi^2 v^2 d_1^2} \quad (25)$$


$F[f](v)$

$$\frac{e^{3I \pi v} \sin(\pi v)}{\pi v} + \frac{e^{-2I \pi v} \sin(4 \pi v)}{\pi v} - \frac{3 e^{-2I \pi v} \sin(2 \pi v)^2}{2 \pi^2 v^2} \quad (26)$$

```

> #Построим график найденного образа Фурье
> complexplot(F[f](v), v=-3..3)

```



```

#Построим действительную часть образа Фурье


```

$$\begin{aligned}
 > FI[f](v) := d \cdot \cos(-2 \cdot \pi \cdot v \cdot m) \cdot \frac{\sin(\pi \cdot v \cdot d)}{\pi \cdot v \cdot d} + d2 \cdot \cos(-2 \cdot \pi \cdot v \cdot m2) \cdot \frac{\sin(\pi \cdot v \cdot d2)}{\pi \cdot v \cdot d2} + c1 \cdot d1 \\
 &\quad \cdot \cos(-2 \cdot \pi \cdot v \cdot m1) \cdot \frac{\sin^2(\pi \cdot v \cdot d1)}{(\pi \cdot v \cdot d1)^2} \\
 FI_f := v \rightarrow &\frac{d \cos(-2 \pi v m) \sin(\pi v d)}{\pi v d} + \frac{d2 \cos(-2 \pi v m2) \sin(\pi v d2)}{\pi v d2} \\
 &+ \frac{c1 d1 \cos(-2 \pi v m1) \sin^2(\pi v d1)}{\pi^2 v^2 d1^2}
 \end{aligned}
 \tag{27}$$

```

> plot(FI[f](v), v=-3..3)

```



#Построим мнимую часть образа Фурье

$$> F2[f](v) := d \cdot \sin(-2 \cdot \pi \cdot v \cdot m) \cdot \frac{\sin(\pi \cdot v \cdot d)}{\pi \cdot v \cdot d} + d2 \cdot \sin(-2 \cdot \pi \cdot v \cdot m2) \cdot \frac{\sin(\pi \cdot v \cdot d2)}{\pi \cdot v \cdot d2} + c1 \cdot d1$$


$$\cdot \sin(-2 \cdot \pi \cdot v \cdot m1) \cdot \frac{\sin^2(\pi \cdot v \cdot d1)}{(\pi \cdot v \cdot d1)^2}$$

$$F2_f := v \rightarrow \frac{d \sin(-2 \pi v m) \sin(\pi v d)}{\pi v d} + \frac{d2 \sin(-2 \pi v m2) \sin(\pi v d2)}{\pi v d2}$$

$$+ \frac{c1 d1 \sin(-2 \pi v m1) \sin(\pi v d1)^2}{\pi^2 v^2 d1^2}$$

(28)

$$> \text{plot}(F2[f](v), v=-3..3)$$



[>