

**2017 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO
UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA**
Pakartotinė sesija

I dalis


Užd. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ats.	B	B	C	D	C	C	B	D	D	B

II dalis

11.	35
12.1.	4,25 m (arba 4,25)
12.2.	$\sqrt{19}$ m (arba $\sqrt{19}$)
13.1.	$6x - 2$
13.2.	$\cos x - x \sin x$
14.1.	8
14.2.	-1
15.1.	15°
15.2.	90°
15.3.	$\frac{1}{4}$ (arba 0,25)
16.	$\frac{7}{32}$ (arba 0,21875)
17.	12

III dalis


Užd.	Sprendimas ir atsakymas	Taškai	Vertinimas
18.		4	
18.1.		2	
	I būdas $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5},$	1	Už apskaičiuotą teisingą tikimybę, kad bus išimta mėlyna kaladėlė.
	$65 \cdot \frac{3}{5} = 39.$ Ats.: 39.	1	Už gautą teisingą atsakymą.
	II būdas $65 \cdot \frac{2}{5} = 26,$	1	Už gautą teisingą raudonų kaladėlių skaičių.
	$65 - 26 = 39.$ Ats.: 39.	1	Už gautą teisingą atsakymą.
18.2.		2	
	I būdas $P(A) = \frac{39}{65} \cdot \frac{26}{64} + \frac{26}{65} \cdot \frac{39}{64} =$ $= \frac{39}{80}.$	1	Už bent vieną teisingai užrašytą sandaugą.
	Ats.: $\frac{39}{80}$ (arba 0,4875).	1	Už gautą teisingą atsakymą.
	II būdas $\frac{2 \cdot 39 \cdot 26}{A_{65}^2} =$	1	Už teisingą skaitiklį arba vardiklį.
	$= \frac{39}{80}.$ Ats.: $\frac{39}{80}$ (arba 0,4875).	1	Už gautą teisingą atsakymą.

Užd.	Sprendimas ir atsakymas	Taškai	Vertinimas
19.		5	
19.1.	$V(x) = x(10 - 2x)^2 = 4x^3 - 40x^2 + 100x$	1	Už teisingą įrodymą.
19.2.	$10 - 2x = x,$ $x = \frac{10}{3}.$ <i>Ats.:</i> $\frac{10}{3}$ (arba $3\frac{1}{3}$).	1	Už gautą teisingą atsakymą.
19.3.		3	
	$V'(x) = 12x^2 - 80x + 100,$	1	Už teisingą išvestinę.
	$3x^2 - 20x + 25 = 0,$ $x = \frac{5}{3}$ arba $x = 5.$	1	Už apskaičiuotas teisingas x reikšmes.
		1	Už teisingą pagrindimą, kad kai $x = \frac{5}{3}$, tai V reikšmė yra didžiausia.

Užd.	Sprendimas ir atsakymas	Taškai	Vertinimas
20.		7	
20.1.	-26.	1	Už gautą teisingą atsakymą.
20.2.		2	
	$3^{a^2-1} = 27,$	1	Už sudarytą teisingą lygtį.
	$3^{a^2-1} = 3^3,$ $a^2 - 1 = 3,$ $a = -2$ arba $a = 2.$ <i>Ats.:</i> -2 arba 2.	1	Už gautą teisingą atsakymą.
20.3.		2	
	$f'(x) = 2 \ln 3 \cdot 3^{x^2-1} \cdot x.$	1	Už teisingą išvestinės išraišką.
	<i>Ats.:</i> $f'(1) = 2 \ln 3.$	1	Už teisingą atsakymą.
20.4.		2	
	$g(f(x)) = \log_9 3^{x^2-1} =$	1	Už teisingai užrašytą sudėtinę funkciją.
	$= \frac{\log_3 3^{x^2-1}}{\log_3 9} = \frac{1}{2}(x^2 - 1).$		
	<i>Ats.:</i> $g(f(x)) = \frac{x^2 - 1}{2} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ (arba $\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$).	1	Už gautą teisingą atsakymą.

Užd.	Sprendimas ir atsakymas	Taškai	Vertinimas
21.		4	
21.1.	$6600 \cdot 1,1 = 7260$. <i>Ats.: 7260 eurų.</i>	1	Už gautą teisingą atsakymą.
21.2.	$6600 : 1,1 = 6000$. <i>Ats.: 6000 eurų.</i>	1	Už gautą teisingą atsakymą.
21.3.		2	
	I būdas $S_5 = \frac{6000(1,1^5 - 1)}{1,1 - 1} =$	1	Už pasirinktą teisingą sprendimo būdą.
	$= 36630,6$. <i>Ats.: 36631 eurų.</i>	1	Už gautą teisingą atsakymą.
	II būdas $6000 + 6600 + 7260 + 7986 + 8784,6 = 36630,6$.	1	Už pasirinktą teisingą sprendimo būdą.
	<i>Ats.: 36631 eurų.</i>	1	Už gautą teisingą atsakymą.

Užd.	Sprendimas ir atsakymas	Taškai	Vertinimas
22.		4	
22.1.		2	
	$S_{ABCD} = AD \cdot CD \cdot \sin CDA$, $10\sqrt{3} = 4 \cdot 5 \cdot \sin CDA$,	1	Už sudarytą teisingą lygtį.
	$\sin CDA = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\angle CDA = 60^\circ$. <i>Ats.: 60°.</i>	1	Už gautą teisingą atsakymą.
22.2.		2	
	$V_{SABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SD$, $2\sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot 10\sqrt{3} \cdot SD$,	1	Už sudarytą teisingą lygtį.
	$SD = 0,6$. <i>Ats.: 0,6 arba $\frac{3}{5}$.</i>	1	Už gautą teisingą atsakymą.

Užd.	Sprendimas ir atsakymas	Taškai	Vertinimas
23.		6	
23.1.		2	
	$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1,$ $\cos^2 \alpha = \frac{35}{36},$	1	Už teisingą $\cos^2 \alpha$ reikšmę.
	$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{35}}{6}, \text{ nes } \alpha \in (90^\circ; 180^\circ).$ $\text{Ats.: } -\frac{\sqrt{35}}{6}.$	1	Už gautą teisingą atsakymą.
23.2.	$\cos \alpha = -0,7 \text{ (arba } -\frac{7}{10})$	1	Už gautą teisingą atsakymą.
23.3.		3	
	$\begin{cases} \frac{m+1}{m} > -1, \\ \frac{m+1}{m} < 0. \end{cases}$ $\begin{cases} \frac{2m+1}{m} > 0, \\ \frac{m+1}{m} < 0. \end{cases}$	1	Už teisingai sudarytą nelygybių sistemą.
	$\begin{cases} (2m+1)m > 0, \\ (m+1)m < 0. \end{cases}$	1	Už teisingai pasirinktą nelygybių sistemos sprendimo būdą.
	 $\text{Ats.: } \left(-1; -\frac{1}{2}\right).$	1	Už gautą teisingą atsakymą.

Užd.	Sprendimas ir atsakymas	Taškai	Vertinimas
24.		4	
24.1.		2	
	$f'(x) = -\frac{1}{x^2},$ $f'(2) = -\frac{1}{4},$	1	Už gautą teisingą funkcijos išvestinės reikšmę taške $\left(2; \frac{1}{2}\right)$.
	$y = -\frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{2},$ $y = -\frac{1}{4}x + 1.$ <p>Ats.: $y = -\frac{1}{4}x + 1.$</p>	1	Už gautą teisingą atsakymą.
24.2.		2	
	$\begin{cases} f(1+a)+b=0, \\ f(-1+a)+b=\frac{2}{3}. \end{cases}$ $\begin{cases} \frac{1}{1+a}+b=0, \\ \frac{1}{-1+a}+b=\frac{2}{3}. \end{cases}$	1	Už teisingai sudarytą sistemą.
	Ats.: $a=2, \quad b=-\frac{1}{3}.$	1	Už teisingai gautas a ir b reikšmes.

Užd.	Sprendimas ir atsakymas	Taškai	Vertinimas
25.		4	
25.1.	$\triangle MCD = \triangle ACB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Pakaks įrodyti, kad trikampiai ABC ir ANK yra panašieji: $\angle ACB = \angle NKA = 90^\circ$; $\angle ANK = 90^\circ - \angle NAK = 90^\circ - (180^\circ - 90^\circ - \angle BAC) = \angle BAC$.	1	Už teisingą įrodymą.
25.2.		3	
	I būdas $NK = NA \cos \angle ANK = MC \cos \angle ANK = MD \cos^2 \angle CMD$, $FE = BF \sin \angle FBE = CD \sin \angle FBE = MD \sin^2 \angle CMD$,	2	Po vieną tašką už teisingai užrašytas NK ir FE per MD .
	$NK + FE = MD(\cos^2 \angle CMD + \sin^2 \angle CMD) = MD$.	1	Už gautą teisingą lygybę $NK + FE = MD$.
	II būdas $\frac{MD}{NA} = \frac{MC}{NK} \Rightarrow NK = \frac{NA \cdot MC}{MD} = \frac{MC^2}{MD}$, $\frac{MD}{BF} = \frac{CD}{FE} \Rightarrow FE = \frac{BF \cdot CD}{MD} = \frac{CD^2}{MD}$,	2	Po vieną tašką už teisingai užrašytas NK ir FE .
	$NK + FE = \frac{MC^2 + CD^2}{MD} = \frac{MD^2}{MD} = MD$.	1	Už gautą teisingą lygybę $NK + FE = MD$.
Pastaba. Gali būti ir kitokie sprendimo būdai, pvz.: Iš taško C nuleiskime statmenį CG į AB . Tada $\triangle ACG = \triangle AKN$, $AG = NK$; $\triangle BCG = \triangle BEF$, $GB = FE$; Tada $AG + GB = NK + FE = AB = MD$. <ul style="list-style-type: none"> • Už teisingus samprotavimus (įrodymus), bet nevedančius prie išvadų – 1 taškas. • Už teisingą (neprikaištingą) įrodymą – 2 taškai. 			