

Linear hyperbolic equations with time-dependent propagation speed

Alessandro La Farciola

Università di Pisa

18 Dicembre 2020



UNIVERSITÀ DI PISA

Presentazione del problema

Consideriamo un'equazione differenziale lineare del secondo ordine con un coefficiente dipendente dal tempo $c(t)$. In particolare, prendiamo uno spazio di Hilbert H e un operatore di moltiplicazione A e consideriamo l'equazione

$$\ddot{u}(t) + c(t)Au = 0$$

con condizioni iniziali

$$u(0) = u_0, \quad \dot{u}(0) = u_1.$$



Presentazione del problema

Consideriamo un'equazione differenziale lineare del secondo ordine con un coefficiente dipendente dal tempo $c(t)$. In particolare, prendiamo uno spazio di Hilbert H e un operatore di moltiplicazione A e consideriamo l'equazione

$$\ddot{u}(t) + c(t)Au = 0$$

con condizioni iniziali

$$u(0) = u_0, \quad \dot{u}(0) = u_1.$$

Abbiamo studiato la regolarità delle soluzioni $u(t)$ in base alla regolarità spaziale dei dati iniziali e quella temporale della velocità di propagazione $c(t)$.



Presentazione del problema

Consideriamo un'equazione differenziale lineare del secondo ordine con un coefficiente dipendente dal tempo $c(t)$. In particolare, prendiamo uno spazio di Hilbert H e un operatore di moltiplicazione A e consideriamo l'equazione

$$\ddot{u}(t) + c(t)Au = 0$$

con condizioni iniziali

$$u(0) = u_0, \quad \dot{u}(0) = u_1.$$

Abbiamo studiato la regolarità delle soluzioni $u(t)$ in base alla regolarità spaziale dei dati iniziali e quella temporale della velocità di propagazione $c(t)$.

Si dimostra che una peggiore regolarità temporale di $c(t)$ è compensata da una maggiore regolarità spaziale dei dati iniziali.



Presentazione del problema

I principali risultati affrontati sono stati presentati per la prima volta nello studio *“Sur les équations hyperboliques avec des coefficients qui ne dépendent que du temps”* pubblicato da Ennio De Giorgi, Ferruccio Colombini and Sergio Spagnolo nel 1979 in *Annali Scuola Normale Superiore di Pisa*.



Struttura della tesi

- 1 Definizioni di spazi funzionali
- 2 Stime delle energie
- 3 Teoremi di buona positura
- 4 Effetto altalena: costruzione dei controesempi



Definizione

Sia H uno spazio di Hilbert. Un operatore $A : D(A) \longrightarrow H$ è detto un **operatore di moltiplicazione** se esiste una base di Hilbert $\{e_k\}$ e una successione $\{\lambda_k\} \subseteq \mathbb{R}$ tale che per ogni $u = \sum_{k \in \mathbb{N}} u_k e_k \in D(A)$

$$Au = \sum_{k \in \mathbb{N}} \lambda_k u_k e_k \quad \text{e} \quad D(A) = \left\{ u \in H : \sum_{k \in \mathbb{N}} \lambda_k^2 u_k^2 < +\infty \right\}.$$



Definizione

Sia H uno spazio di Hilbert. Un operatore $A : D(A) \longrightarrow H$ è detto un **operatore di moltiplicazione** se esiste una base di Hilbert $\{e_k\}$ e una successione $\{\lambda_k\} \subseteq \mathbb{R}$ tale che per ogni $u = \sum_{k \in \mathbb{N}} u_k e_k \in D(A)$

$$Au = \sum_{k \in \mathbb{N}} \lambda_k u_k e_k \quad \text{e} \quad D(A) = \left\{ u \in H : \sum_{k \in \mathbb{N}} \lambda_k^2 u_k^2 < +\infty \right\}.$$

Consideriamo, ora, uno spazio di Hilbert H separabile con $\{e_k\}$ una sua base e sia A un operatore di moltiplicazione con $\{\lambda_k^2\}$ la successione di autovalori di A tale che $\lambda_k \geq 1$.



Spazi funzionali

Allora, sappiamo che $u \in H \Leftrightarrow \sum_{k \in \mathbb{N}} u_k^2 < \infty$.

Più in generale, consideriamo

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} w_k u_k^2 \quad \text{con} \quad \{w_k\} \subseteq \mathbb{R}^+.$$



Allora, sappiamo che $u \in H \Leftrightarrow \sum_{k \in \mathbb{N}} u_k^2 < \infty$.

Più in generale, consideriamo

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} w_k u_k^2 \quad \text{con} \quad \{w_k\} \subseteq \mathbb{R}^+.$$

- Spazi di Sobolev, $D(A^\alpha)$: $w_k = \lambda_k^{4\alpha}$
- Distribuzioni, $D(A^{-\alpha})$: $w_k = \lambda_k^{-4\alpha}$
- Spazi di Gevrey, $\mathcal{G}_{\varphi,r,\alpha}(A)$: $w_k = \lambda_k^{4\alpha} \exp(2r\varphi(\lambda_k))$
- Ultradistribuzioni di Gevrey, $\mathcal{G}_{-\psi,R,\alpha}(A)$: $w_k = \lambda_k^{4\alpha} \exp(-2R\psi(\lambda_k))$



Allora, sappiamo che $u \in H \Leftrightarrow \sum_{k \in \mathbb{N}} u_k^2 < \infty$.

Più in generale, consideriamo

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} w_k u_k^2 \quad \text{con} \quad \{w_k\} \subseteq \mathbb{R}^+.$$

- Spazi di Sobolev, $D(A^\alpha)$: $w_k = \lambda_k^{4\alpha}$
- Distribuzioni, $D(A^{-\alpha})$: $w_k = \lambda_k^{-4\alpha}$
- Spazi di Gevrey, $\mathcal{G}_{\varphi,r,\alpha}(A)$: $w_k = \lambda_k^{4\alpha} \exp(2r\varphi(\lambda_k))$
- Ultradistribuzioni di Gevrey, $\mathcal{G}_{-\psi,R,\alpha}(A)$: $w_k = \lambda_k^{4\alpha} \exp(-2R\psi(\lambda_k))$

Inoltre valgono i seguenti contenimenti

$$\mathcal{G}_{\varphi,r,\alpha}(A) \subseteq D(A^\alpha) \subseteq H \subseteq D(A^{-\alpha}) \subseteq \mathcal{G}_{-\psi,R,\alpha}(A).$$



Consideriamo lo spazio di Hilbert separabile $L^2((0, \pi))$. Sia $\{e_k\} = \left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(kx) \right\}$ una sua base. Sia A l'operatore tale che $Au = -\ddot{u}$, allora la base precedente è composta da autovettori con $\lambda_k^2 = k^2$ come autovalori.



Compatibilità con le definizioni classiche

Consideriamo lo spazio di Hilbert separabile $L^2((0, \pi))$. Sia $\{e_k\} = \left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(kx) \right\}$ una sua base. Sia A l'operatore tale che $Au = -\ddot{u}$, allora la base precedente è composta da autovettori con $\lambda_k^2 = k^2$ come autovalori.

- se $w_k = \lambda_k^{4\alpha}$ l'usuale spazio di **Sobolev** $H^{2\alpha}$ con le opportune condizioni al bordo,
- se $w_k = \exp(2rk)$ si ha l'equivalenza con lo spazio delle funzioni **analitiche** di raggio r ,
- se $w_k = \exp(2rk^{1/s})$ con $s > 1$ si ottiene lo spazio di **Gevrey standard**.



Compatibilità con le definizioni classiche

Consideriamo lo spazio di Hilbert separabile $L^2((0, \pi))$. Sia $\{e_k\} = \left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(kx) \right\}$ una sua base. Sia A l'operatore tale che $Au = -\ddot{u}$, allora la base precedente è composta da autovettori con $\lambda_k^2 = k^2$ come autovalori.

- se $w_k = \lambda_k^{4\alpha}$ l'usuale spazio di **Sobolev** $H^{2\alpha}$ con le opportune condizioni al bordo,
- se $w_k = \exp(2rk)$ si ha l'equivalenza con lo spazio delle funzioni **analitiche** di raggio r ,
- se $w_k = \exp(2rk^{1/s})$ con $s > 1$ si ottiene lo spazio di **Gevrey standard**.



Compatibilità con le definizioni classiche

Consideriamo lo spazio di Hilbert separabile $L^2((0, \pi))$. Sia $\{e_k\} = \left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(kx) \right\}$ una sua base. Sia A l'operatore tale che $Au = -\ddot{u}$, allora la base precedente è composta da autovettori con $\lambda_k^2 = k^2$ come autovalori.

- se $w_k = \lambda_k^{4\alpha}$ l'usuale spazio di **Sobolev** $H^{2\alpha}$ con le opportune condizioni al bordo,
- se $w_k = \exp(2rk)$ si ha l'equivalenza con lo spazio delle funzioni **analitiche** di raggio r ,
- se $w_k = \exp(2rk^{1/s})$ con $s > 1$ si ottiene lo spazio di **Gevrey standard**.



Tornando al problema originario, sia H uno spazio di Hilbert separabile con $\{e_k\}$ una sua base e sia A un operatore di moltiplicazione. Consideriamo l'equazione lineare

$$\ddot{u}(t) + c(t)Au = 0.$$



Tornando al problema originario, sia H uno spazio di Hilbert separabile con $\{e_k\}$ una sua base e sia A un operatore di moltiplicazione. Consideriamo l'equazione lineare

$$\ddot{u}(t) + c(t)Au = 0.$$

Grazie alle ipotesi assunte su A l'equazione è equivalente ad un sistema di ODEs del tipo

$$\ddot{u}_k(t) + \lambda_k^2 c(t) u_k(t) = 0.$$



Ci concentriamo, pertanto, sulla seguente famiglia di equazioni differenziali ordinarie

$$\ddot{u}_\lambda(t) + \delta(t)\dot{u}_\lambda(t) + \lambda^2 c(t)u_\lambda(t) = 0.$$



Problema generale

Ci concentriamo, pertanto, sulla seguente famiglia di equazioni differenziali ordinarie

$$\ddot{u}_\lambda(t) + \delta(t)\dot{u}_\lambda(t) + \lambda^2 c(t)u_\lambda(t) = 0.$$

dove:

- $\delta(t) \geq 0$,
- λ è un parametro reale,
- $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione che chiamiamo **velocità di propagazione** a causa del suo significato fisico.



Problema generale

Ci concentriamo, pertanto, sulla seguente famiglia di equazioni differenziali ordinarie

$$\ddot{u}_\lambda(t) + \delta(t)\dot{u}_\lambda(t) + \lambda^2 c(t)u_\lambda(t) = 0.$$

dove:

- $\delta(t) \geq 0$,
- λ è un parametro reale,
- $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione che chiamiamo **velocità di propagazione** a causa del suo significato fisico.



Ci concentriamo, pertanto, sulla seguente famiglia di equazioni differenziali ordinarie

$$\ddot{u}_\lambda(t) + \delta(t)\dot{u}_\lambda(t) + \lambda^2 c(t)u_\lambda(t) = 0.$$

dove:

- $\delta(t) \geq 0$,
- λ è un parametro reale,
- $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione che chiamiamo **velocità di propagazione** a causa del suo significato fisico.



Ci concentriamo, pertanto, sulla seguente famiglia di equazioni differenziali ordinarie

$$\ddot{u}_\lambda(t) + \delta(t)\dot{u}_\lambda(t) + \lambda^2 c(t)u_\lambda(t) = 0.$$

dove:

- $\delta(t) \geq 0$,
- λ è un parametro reale,
- $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione che chiamiamo **velocità di propagazione** a causa del suo significato fisico.



Ci concentriamo, pertanto, sulla seguente famiglia di equazioni differenziali ordinarie

$$\ddot{u}_\lambda(t) + \delta(t)\dot{u}_\lambda(t) + \lambda^2 c(t)u_\lambda(t) = 0.$$

dove:

- $\delta(t) \geq 0$,
- λ è un parametro reale,
- $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione che chiamiamo **velocità di propagazione** a causa del suo significato fisico.

Il nostro obiettivo è quello di studiare la crescita della soluzione $u_\lambda(t)$ quando $\lambda \rightarrow +\infty$.



Definizione

Definiamo, ora, tre energie:

- chiamiamo **Simple energy** la quantità

$$S_\lambda(t) := \dot{u}_\lambda^2(t) + u_\lambda^2(t),$$

- chiamiamo **Kovaleskian energy** la quantità

$$E_\lambda(t) := \dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t),$$

- data $\gamma(t)$ una funzione non negativa di classe C^1 , chiamiamo **Hyperbolic energy** la quantità

$$F_\lambda(t) := \dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 \gamma(t) u_\lambda^2(t).$$

Definizione

Definiamo, ora, tre energie:

- chiamiamo **Simple energy** la quantità

$$S_\lambda(t) := \dot{u}_\lambda^2(t) + u_\lambda^2(t),$$

- chiamiamo **Kovaleskian energy** la quantità

$$E_\lambda(t) := \dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t),$$

- data $\gamma(t)$ una funzione non negativa di classe C^1 , chiamiamo **Hyperbolic energy** la quantità

$$F_\lambda(t) := \dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 \gamma(t) u_\lambda^2(t).$$

Definizione

Definiamo, ora, tre energie:

- chiamiamo **Simple energy** la quantità

$$S_\lambda(t) := \dot{u}_\lambda^2(t) + u_\lambda^2(t),$$

- chiamiamo **Kovaleskian energy** la quantità

$$E_\lambda(t) := \dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t),$$

- data $\gamma(t)$ una funzione non negativa di classe C^1 , chiamiamo **Hyperbolic energy** la quantità

$$F_\lambda(t) := \dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 \gamma(t) u_\lambda^2(t).$$

E' possibile dimostrare alcuni teoremi che mostrano diverse stime sulla **Kovaleskian energy** dipendenti dalla regolarità assunta sulla velocità di propagazione $c(t)$.

Teorema (Caso $c(t) \in L^1$)

Sia T una costante positiva. Assumiamo che la velocità di propagazione $c(t) \in L^1((0, T))$. Allora, la soluzione $u(t)$ soddisfa la seguente disuguaglianza

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp \left(\lambda t + \lambda \int_0^t |c(s)| ds \right)$$

dove K è una costante che dipende dalle condizioni iniziali.



Nel caso precedente abbiamo visto che l'energia ha una crescita del tipo $\exp(\lambda t)$. Una stima migliore si ottiene se si assume la condizione di **stretta iperbolicità** su $c(t)$, ovvero esistono due costanti μ_1 e μ_2 tali che $0 < \mu_1 \leq c(t) \leq \mu_2$.



Nel caso precedente abbiamo visto che l'energia ha una crescita del tipo $\exp(\lambda t)$. Una stima migliore si ottiene se si assume la condizione di **stretta iperbolicità** su $c(t)$, ovvero esistono due costanti μ_1 e μ_2 tali che $0 < \mu_1 \leq c(t) \leq \mu_2$.

Teorema (Caso $c(t) \in L^1$ e strettamente iperbolica)

Sia T una costante positiva. Assumiamo che $c(t) \in L^1((0, T))$ soddisfi la condizione di stretta iperbolicità. Allora, per ogni $\epsilon > 0$ esiste una costante N_ϵ tale che la soluzione $u_\lambda(t)$ soddisfa la seguente disuguaglianza

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp \left\{ \frac{\lambda \epsilon}{\mu_1} + N_\epsilon t \right\}.$$



Nel caso precedente abbiamo visto che l'energia ha una crescita del tipo $\exp(\lambda t)$. Una stima migliore si ottiene se si assume la condizione di **stretta iperbolicità** su $c(t)$, ovvero esistono due costanti μ_1 e μ_2 tali che $0 < \mu_1 \leq c(t) \leq \mu_2$.

Teorema (Caso $c(t) \in L^1$ e strettamente iperbolica)

Sia T una costante positiva. Assumiamo che $c(t) \in L^1((0, T))$ soddisfi la condizione di stretta iperbolicità. Allora, per ogni $\epsilon > 0$ esiste una costante N_ϵ tale che la soluzione $u_\lambda(t)$ soddisfa la seguente disuguaglianza

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp \left\{ \frac{\lambda \epsilon}{\mu_1} + N_\epsilon t \right\}.$$

In questo caso la costante N_ϵ non dipende da λ .



Teorema (Caso $c(t)$ strettamente iperbolica e ω -continua)

Sia $c(t)$ una velocità di propagazione che soddisfa la condizione di iperbolicità. Assumiamo inoltre che $c(t)$ è ω -continua. Allora, esiste una costante $N > 0$ tale che la soluzione $u(t)$ soddisfa la seguente disuguaglianza

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp \left\{ N \lambda \omega \left(\frac{1}{\lambda} \right) t \right\}.$$



Teorema (Caso $c(t)$ strettamente iperbolica e ω -continua)

Sia $c(t)$ una velocità di propagazione che soddisfa la condizione di iperbolicità. Assumiamo inoltre che $c(t)$ è ω -continua. Allora, esiste una costante $N > 0$ tale che la soluzione $u(t)$ soddisfa la seguente disuguaglianza

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp \left\{ N \lambda \omega \left(\frac{1}{\lambda} \right) t \right\}.$$

Dal caso precedente seguono alcuni corollari che dipendono dal modulo di continuità scelto.



Lipschitz

Se $c(t)$ è Lipschitziana, cioè $\omega(x) = L|x|$, allora

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp(\tilde{N}t)$$



Lipschitz

Se $c(t)$ è Lipschitziana, cioè $\omega(x) = L|x|$, allora

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp(\tilde{N}t)$$

Hölder

Se $c(t)$ è α -Hölderiana, cioè $\omega(x) = H|x|^\alpha$ con $\alpha \in (0, 1)$, allora

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp(N\lambda^{1-\alpha}t)$$

Lipschitz

Se $c(t)$ è Lipschitziana, cioè $\omega(x) = L|x|$, allora

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp(\tilde{N}t)$$

log-Lipschitz

Se $c(t)$ è log-Lipschitz continua, cioè $\omega(x) = L|x||\log x|$, allora

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \lambda^{\tilde{N}t}$$

Hölder

Se $c(t)$ è α -Hölderiana, cioè $\omega(x) = H|x|^\alpha$ con $\alpha \in (0, 1)$, allora

$$\dot{u}_\lambda^2(t) + \lambda^2 u_\lambda^2(t) \leq K \exp(N\lambda^{1-\alpha}t)$$

Definizione

Dato un problema matematico, diciamo che è **ben posto** se verifica le seguenti proprietà:

- Esiste una soluzione
- La soluzione è unica
- Il comportamento della soluzione cambia in modo continuo rispetto alle condizioni iniziali



Teoremi di buona positura

Teoremi

- 1 se $c(t) \in L^1((0, T))$ per ogni $T > 0$, si ha buona positura in ultradistribuzioni analitiche
- 2 se $c(t)$ soddisfa la stretta iperbolicità ed è ω -continua allora:
 - se i dati iniziali appartengono ad ultradistribuzioni si ha buona positura in
$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{-\infty, m_0+m_1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{-\infty, m_0+m_1/2}(A))$$
- se i dati iniziali appartengono a spazi di Gevrey si ha buona positura in
$$C^0([0, T], G_{\omega, m_0+m_1/2}(A)) \cap C^1([0, T], G_{\omega, m_0+m_1/2}(A))$$

Teoremi

- ① se $c(t) \in L^1((0, T))$ per ogni $T > 0$, si ha buona positura in ultradistribuzioni analitiche
- ② se $c(t)$ soddisfa la stretta iperbolicità ed è ω -continua allora:
 - se i dati iniziali appartengono ad ultradistribuzioni si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 0}(A))$$

- se i dati iniziali appartengono a spazi di Gevrey si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 0}(A)).$$

con la condizione che

$$\frac{1}{c(t)} \leq \frac{1}{\omega(t)} \quad \text{per } t \in (0, T)$$

Teoremi

- ① se $c(t) \in L^1((0, T))$ per ogni $T > 0$, si ha buona positura in ultradistribuzioni analitiche
- ② se $c(t)$ soddisfa la stretta iperbolicità ed è ω -continua allora:
 - se i dati iniziali appartengono ad ultradistribuzioni si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 0}(A))$$

- se i dati iniziali appartengono a spazi di Gevrey si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 0}(A)).$$

con la condizione che

Teoremi

- ① se $c(t) \in L^1((0, T))$ per ogni $T > 0$, si ha buona positura in ultradistribuzioni analitiche
- ② se $c(t)$ soddisfa la stretta iperbolicità ed è ω -continua allora:
 - se i dati iniziali appartengono ad ultradistribuzioni si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 0}(A))$$

- se i dati iniziali appartengono a spazi di Gevrey si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 0}(A)).$$

con le condizioni che

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\psi(x)} \omega\left(\frac{1}{x}\right) < \infty \quad \text{e} \quad \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\varphi(x)} \omega\left(\frac{1}{x}\right) < +\infty.$$

Teoremi

- ① se $c(t) \in L^1((0, T))$ per ogni $T > 0$, si ha buona positura in ultradistribuzioni analitiche
- ② se $c(t)$ soddisfa la stretta iperbolicità ed è ω -continua allora:
 - se i dati iniziali appartengono ad ultradistribuzioni si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 0}(A))$$

- se i dati iniziali appartengono a spazi di Gevrey si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 0}(A)).$$

con le condizioni che

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\psi(x)} \omega\left(\frac{1}{x}\right) < \infty \quad \text{e} \quad \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\varphi(x)} \omega\left(\frac{1}{x}\right) < +\infty.$$

Teoremi

- ① se $c(t) \in L^1((0, T))$ per ogni $T > 0$, si ha buona positura in ultradistribuzioni analitiche
- ② se $c(t)$ soddisfa la stretta iperbolicità ed è ω -continua allora:
 - se i dati iniziali appartengono ad ultradistribuzioni si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{-\psi, R_0+Rt, 0}(A))$$

- se i dati iniziali appartengono a spazi di Gevrey si ha buona positura in

$$C^0([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 1/2}(A)) \cap C^1([0, T], \mathcal{G}_{\varphi, r_0-rt, 0}(A)).$$

con le condizioni che

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\psi(x)} \omega\left(\frac{1}{x}\right) < \infty \quad \text{e} \quad \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\varphi(x)} \omega\left(\frac{1}{x}\right) < +\infty.$$

Corollari

- **Hölder**: prendendo $\omega(x) = Hx^\alpha$ con $\alpha \in (0, 1)$, il problema è ben posto nello spazio di **Gevrey standard** di ordine $s = (1 - \alpha)^{-1}$.
- **log-Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx|\log x|$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev con **derivative loss finito**.
- **beta-log-Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx|\log x|^\beta$ con $\beta \in (0, 1)$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev con **derivative loss piccolo a piacere**.
- **Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev **senza derivative loss**.



Teoremi di buona positura

Corollari

- **Hölder**: prendendo $\omega(x) = Hx^\alpha$ con $\alpha \in (0, 1)$, il problema è ben posto nello spazio di **Gevrey standard** di ordine $s = (1 - \alpha)^{-1}$.
- **log-Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx|\log x|$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev con **derivative loss finito**.
- **beta-log-Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx|\log x|^\beta$ con $\beta \in (0, 1)$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev con **derivative loss piccolo a piacere**.
- **Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev **senza derivative loss**.



Corollari

- **Hölder**: prendendo $\omega(x) = Hx^\alpha$ con $\alpha \in (0, 1)$, il problema è ben posto nello spazio di **Gevrey standard** di ordine $s = (1 - \alpha)^{-1}$.
- **log-Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx|\log x|$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev con **derivative loss finito**.
- **beta-log-Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx|\log x|^\beta$ con $\beta \in (0, 1)$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev con **derivative loss piccolo a piacere**.
- **Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev **senza derivative loss**.



Corollari

- **Hölder**: prendendo $\omega(x) = Hx^\alpha$ con $\alpha \in (0, 1)$, il problema è ben posto nello spazio di **Gevrey standard** di ordine $s = (1 - \alpha)^{-1}$.
- **log-Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx|\log x|$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev con **derivative loss finito**.
- **beta-log-Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx|\log x|^\beta$ con $\beta \in (0, 1)$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev con **derivative loss piccolo a piacere**.
- **Lipschitz**: prendendo $\omega(x) = Lx$, allora il problema è ben posto in spazi di Sobolev **senza derivative loss**.



Effetto altalena: costruzione dei controesempi

Partendo dall'equazione differenziale ordinaria di base

$$\ddot{u}_\lambda + \lambda^2 c(t) u_\lambda = 0,$$

dalle stime sulle energie fatte in precedenza avevamo ottenuto che

$$E(t) \leq E(0) \exp(M\lambda t).$$



Partendo dall'equazione differenziale ordinaria di base

$$\ddot{u}_\lambda + \lambda^2 c(t) u_\lambda = 0,$$

dalle stime sulle energie fatte in precedenza avevamo ottenuto che

$$E(t) \leq E(0) \exp(M\lambda t).$$

Ora, il nostro obiettivo è mostrare che tale stima risulta ottimale. Per questo occorre costruire opportune soluzioni che verificano l'uguaglianza nella precedente disuguaglianza, cioè soluzioni che crescono esponenzialmente con il tempo.



Effetto altalena: costruzione dei controesempi

Se pensiamo al problema come ad un modello di oscillatore armonico abbiamo bisogno di una opportuna forza della molla $c(t)$ che permette alla soluzione di crescere esponenzialmente. L'idea è quella di utilizzare una molla più debole quando ci si muove verso l'origine e una più forte quando si va nella direzione opposta.



Effetto altalena: costruzione dei controesempi

Matematicamente, questo effetto si ottiene prendendo

$$c(t) = 1 - 4\epsilon \sin(\lambda t) \cos(\lambda t) - \epsilon^2 \sin^4(\lambda t)$$

e di conseguenza

$$u(t) = b \sin(\lambda t) \exp \left\{ \frac{1}{2} \epsilon \lambda t - \frac{1}{4} \epsilon \sin(2\lambda t) \right\}.$$



Per quanto riguarda il caso generale, consideriamo la solita equazione

$$\ddot{u}(t) + c(t)Au = 0.$$

Allora è possibile trovare una velocità di propagazione $c(t)$ che sia ω -continua tale per cui la soluzione è regolare al tempo $t = 0$ e irregolare quando $t > 0$.



Effetto altalena: costruzione dei controesempi

Teorema

Siano $\varphi : (0, +\infty) \longrightarrow (0, +\infty)$ and $\psi : (0, +\infty) \longrightarrow (0, +\infty)$ tali che

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\varphi(x)} \omega\left(\frac{\pi}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\psi(x)} \omega\left(\frac{\pi}{x}\right) = +\infty.$$

Allora esiste una funzione ω -continua $c : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$\frac{1}{2} \leq c(t) \leq \frac{3}{2} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

e una soluzione $u(t)$ tale che

$$(u(0), \dot{u}(0)) \in \mathcal{G}_{\varphi,r,1/2}(A) \times \mathcal{G}_{\varphi,r,0}(A) \quad \forall r > 0$$

$$(u(t), \dot{u}(t)) \notin \mathcal{G}_{-\psi,R,1/2}(A) \times \mathcal{G}_{-\psi,R,0}(A) \quad \forall R > 0, \quad \forall t > 0.$$

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

