


Практическое задание к Уроку 7. Производная функции одной переменной. Часть 2

1. Найти интервалы возрастания и убывания функций:

1) $f(x) = x + e^{-x}$



$$f'(x) = (x + e^{-x})' = 1 + e^{-x} \cdot (-x)' = 1 + e^{-x} \cdot (-1 \cdot x^{1-1}) = 1 - e^{-x}$$


$$1 - e^{-x} = 0$$

$$\frac{e^x - 1}{e^x} = 0$$

$$e^x - 1 = 0 \Rightarrow x = 0 - \text{нуль функции}$$

$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$
Функция убывает	Функция возрастает

2) $f(x) = x \ln x$




$$f'(x) = x' \ln x + x \ln x' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$\ln x + 1 = 0 \Rightarrow x = 0.36788 - \text{нуль функции}$$

$(-\infty; 0.36788)$	$(0.36788; +\infty)$
$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$
Функция убывает	Функция возрастает

$$3) y = \frac{1}{1-x^2}$$



$x = \pm 1$ – точки разрыва функции


$$y' = \left(\frac{1}{1-x^2} \right)' = \frac{1' \cdot (1-x^2) - 1 \cdot (1-x^2)'}{(1-x^2)^2} = \frac{-1 \cdot (0-2x)}{(1-x^2)^2} = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$$

$$\frac{2x}{(1-x^2)^2} = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ – нуль функции}$$

$(-\infty; -1)$	$(-1; 0)$	$(0; 1)$	$(1; +\infty)$
$f'(x) < 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$	$f'(x) > 0$
Функция убывает	Функция убывает	Функция возрастает	Функция возрастает

2. Найти экстремумы функций:

$$1) f(x) = x^3 - 3x + 1$$



$$f'(x) = (x^3 - 3x + 1)' = 3x^2 - 3$$


$$3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \text{ – нули функции}$$

$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$
Функция возрастает	Функция убывает	Функция возрастает

$x = -1$ является локальным максимумом, поскольку в его окрестностях производная функции меняет знак с $+$ на $-$

$x = 1$ является локальным минимумом, поскольку в его окрестностях производная функции меняет знак с $-$ на $+$

$$2) y = e^{x^2 - 4x + 5}$$




$$y' = (e^{x^2 - 4x + 5})' = e^{x^2 - 4x + 5} \cdot (x^2 - 4x + 5)' = e^{x^2 - 4x + 5} \cdot (2x - 4) = 2(x - 2) \cdot e^{x^2 - 4x + 5}$$

$$(x - 2) \cdot e^{x^2 - 4x + 5} = 0 \Rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 5.428766 - \text{нули функции}$$

$(-\infty; 2)$	$(2; 5.428766)$	$(5.428766; +\infty)$
$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$	$f'(x) > 0$
Функция убывает	Функция возрастает	Функция возрастает

$x = 2$ является локальным минимумом, поскольку в его окрестностях производная функции меняет знак с $-$ на $+$

$$3) y = x - \arctg x$$



$$y' = (x - \arctg x)' = 1 - \frac{1}{1 + x^2} = \frac{1 + x^2 - 1}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2}$$


$$\frac{x^2}{1 + x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 0 - \text{нуль функции}$$

$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
$f'(x) > 0$	$f'(x) > 0$
Функция возрастает	Функция возрастает

Локальные максимум и/или минимум отсутствуют.

3. Найти интервалы выпуклости и точки перегиба функций:

1) $f(x) = e^{-x^2}$



$$f'(x) = (e^{-x^2})' = e^{-x^2} \cdot (-x^2)' = -2x \cdot e^{-x^2}$$

$$f''(x) = (-2x \cdot e^{-x^2})' = (-2x)' \cdot e^{-x^2} - 2x \cdot (e^{-x^2})' = -2e^{-x^2} - 2x \cdot (-2x \cdot e^{-x^2}) = -2e^{-x^2} + 4x^2 e^{-x^2}$$

$$-2e^{-x^2} + 4x^2 e^{-x^2} = 0$$


$$2e^{-x^2}(2x^2 - 1) = 0$$

$$2e^{-x^2} = 0 \Rightarrow e^{-x^2} = 0 \Rightarrow \ln e^{-x^2} = \ln 0 \Rightarrow \text{содержит неопределенность}$$

$$2x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{1}{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} - \text{точки перегиба функции}$$

$\left(-\infty; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; +\infty\right)$
$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$
Функция вогнута	Функция выпукла	Функция вогнута

2) $y = \cos x$




$$y' = \cos x' = -\sin x$$

$$y'' = -\sin x' = -\cos x$$

$$-\cos x = 0 \Rightarrow x_1 = 7.8539816, x_2 = 10.995574 - \text{точки перегиба функции}$$

$(-\infty; 7.8539816)$	$(7.8539816; 10.995574)$	$(10.995574; +\infty)$
$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$
Функция выпукла	Функция вогнута	Функция выпукла

$$3)y = x^5 - 10x^2 + 7x$$



$$y' = (x^5 - 10x^2 + 7x)' = 5x^4 - 20x + 7$$


$$y'' = (5x^4 - 20x + 7)' = 20x^3 - 20$$

$20x^3 - 20 = 0 \Rightarrow x = 1$ – точка перегиба функции

$(-\infty; 1)$	$(1; +\infty)$
$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$
Функция выпукла	Функция вогнута

4. Найти асимптоты графиков функции:

$$1)y = \frac{3x}{x+2}$$



$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (kx + b - f(x))$ – определение асимптоты

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{3x}{x+2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{x(x+2)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x+2} = 0$$


$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{x+2} - 0 \cdot x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{x+2} = 3$$

$y = 3$ – горизонтальная асимптота

$x_1 = -2$ – вертикальная асимптота

$$\lim_{x \rightarrow -2 \pm 0} \frac{3x}{x+2} = \mp \infty$$
 – пределы в точке $x_1 = -2$ (точка разрыва 2-го рода)

$$2) y = e^{-\frac{1}{x}}$$



При $x = 0$ данная функция не определена.

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (kx + b - f(x))$ – определение асимптоты

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x \cdot e^{\frac{1}{x}}} = 0$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-\frac{1}{x}} - 0 \cdot x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{e^{\frac{1}{x}}} = 1$$

$y = 1$ – горизонтальная асимптота


Вертикальные асимптоты находятся в точках бесконечных разрывов.

Вертикальные асимптоты отсутствуют.

5. Провести полное исследование и построить графики функций:

$$1) y = \ln(1 - x^2)$$

а) График функции



б) Область определения функции

$$1 - x^2 > 0 \Rightarrow x = \pm 1 \Rightarrow \{x | -1 < x < 1\}$$

с) Четность, нечетность и периодичность

$$y(-x) = \ln(1 - x^2)$$

$$y(-x) = y(x) \Rightarrow \text{четная функция}$$

д) Участки непрерывности функции, точки разрыва и вид разрыва

$x = \pm 1$ – точки устранимого разрыва функции

$y = \ln(1 - x^2)$ – функция непрерывна

е) Точки пересечения графика с осями координат

$x = 0, y = 0$ – пересечение с осью y

$y = 0; \ln(1 - x^2) = 0 \Rightarrow x = 0$, – пересечение с осью x

f) Интервалы знакопостоянства функции

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow \{x | -1 < x < 1\}$$

g) Асимптоты

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (kx + b - f(x))$ – определение асимптоты

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\ln(1 - x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\ln(1 - x^2)}{x} = 0$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \ln(1 - x^2) - 0 \cdot x = \infty - \text{наклонные асимптоты функции отсутствуют}$$

h) Интервалы возрастания и убывания, экстремумы

$$y' = \ln(1 - x^2)' = \ln(1 - x^2)' = \frac{1}{1 - x^2} \cdot (1 - x^2)' = \frac{-2x}{1 - x^2}$$

$x = 0$ – нуль функции

$(0; +\infty)$ – интервал возрастания


i) Интервалы выпуклости и вогнутости, точки перегиба

$$y'' = \left(\frac{-2x}{1 - x^2} \right)' = \frac{(-2x)' \cdot (1 - x^2) - (-2x) \cdot (1 - x^2)'}{(1 - x^2)^2} = \frac{-2 + 2x^2 - 4x^2}{(1 - x^2)^2} = \frac{-2 - 2x^2}{(1 - x^2)^2}$$

$$\frac{-2 - 2x^2}{(1 - x^2)^2} = 0 \Rightarrow -2 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{-1} - \text{точки перегиба отсутствуют}$$

$$2)y = \frac{x^2}{1 - x^2}$$

а) График функции



б) Область определения функции

$$1 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \Rightarrow \{x | x \neq \pm 1\}$$

с) Четность, нечетность и периодичность

$$y(-x) = \frac{x^2}{1 - x^2}$$

$$y(-x) = y(x) \Rightarrow \text{четная функция}$$

д) Участки непрерывности функции, точки разрыва и вид разрыва

$x = \pm 1$ – точки разрыва функции 2-го рода

$f(x) \rightarrow \infty \Leftrightarrow \{x|x \neq \pm 1\}$ – участки непрерывности функции

е) Точки пересечения графика с осями координат

$x = 0, y = 0$ – пересечение с осью y

$y = 0; \frac{x^2}{1-x^2} = 0 \Rightarrow x = 0$, – пересечение с осью x

ф) Интервалы знакопостоянства функции

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow \{x| -1 > x > 1\}$$

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow \{x| -1 < x < 1\}$$

г) Асимптоты

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (kx + b - f(x))$ – определение асимптоты

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{x^2}{1-x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{1-x^2} = 0$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{1-x^2} - 0 \cdot x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^2 = -1$$

$y = -1$ – горизонтальная асимптота

$x = \pm 1$ – точки разрыва функции 2-го рода и являются вертикальными асимптотами

h) Интервалы возрастания и убывания, экстремумы

$$y' = \left(\frac{x^2}{1-x^2} \right)' = \frac{x^{2'}(1-x^2) - x^2(1-x^2)'}{(1-x^2)^2} = \frac{2x - 2x^3 + 2x^3}{(1-x^2)^2} = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$$

$2x = 0 \Rightarrow x = 0$ – нуль функции

$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, +\infty)$
$f'(x) < 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$	$f'(x) > 0$
Функция убывает	Функция убывает	Функция возрастает	Функция возрастает

$x = 0$ является локальным минимумом, поскольку в его окрестностях производная функции меняет знак с $-$ на $+$

и) Интервалы выпуклости и вогнутости, точки перегиба


$$y'' = \left(\frac{2x}{(1-x^2)^2} \right)' = \frac{(2x)' \cdot (1-x^2)^2 - (2x) \cdot (1-x^2)^{2'}}{(1-x^2)^4} = \frac{2 \cdot (1-x^2)^2 - 2x \cdot 2 \cdot (1-x^2) \cdot (1-x^2)'}{(1-x^2)^4} =$$
$$= \frac{2 \cdot (1-x^2)^2 - 4x \cdot (1-x^2) \cdot (-2x)}{(1-x^2)^4} = \frac{2(1-x^2)(1-x^2+4x^2)}{(1-x^2)^4} = \frac{2-2x^2+8x^2}{(1-x^2)^3} = \frac{2+6x^2}{(1-x^2)^3}$$

$\frac{2+6x^2}{(1-x^2)^3} = 0 \Rightarrow 2+6x^2 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{-\frac{1}{3}}$ – точки перегиба отсутствуют, как и корни уравнения

$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
$f''(x) < 0$	$f''(x) > 0$	$f''(x) < 0$
Функция выпукла	Функция вогнута	Функция выпукла

$$3) y = x^2 \cdot e^{-x}$$

а) График функции



б) Область определения функции

$$x^2 \cdot e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow \{x | x \in \mathbb{R}\} \Leftrightarrow (-\infty, \infty)$$

с) Четность, нечетность и периодичность

$$y(-x) = x^2 \cdot e^x \Rightarrow \text{функция общего вида}$$

д) Участки непрерывности функции, точки разрыва и вид разрыва

$x = 0$ – точка устранимого разрыва функции

$$y = x^2 \cdot e^{-x} - \text{функция непрерывна}$$

е) Точки пересечения графика с осями координат

$x = 0, y = 0$ – пересечение с осью y

$$y = 0; x^2 \cdot e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 0, - \text{пересечение с осью } x$$

ф) Интервалы знакопостоянства функции

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow \{x | x \in \mathbb{R}\}$$

г) Асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (kx + b - f(x)) - \text{определение асимптоты}$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \cdot e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = 0$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - kx = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot e^{-x} - 0 \cdot x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$$

$y = 0$ – горизонтальная асимптота

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \cdot e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^x} = -\infty - \text{наклонных асимптот не существует, поскольку коэффициент } k \text{ равен бесконечности.}$$

h) Интервалы возрастания и убывания, экстремумы

$$y' = (x^2 \cdot e^{-x})' = x^{2'} \cdot e^{-x} + x^2 \cdot e^{-x'} = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot e^{-x} \cdot (-x)' = \frac{x(2-x)}{e^x}$$

$$x(2+x) = 0 \Rightarrow x_1 = 0; x_2 = 2 - \text{нули функции}$$

$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$
Функция убывает	Функция возрастает	Функция убывает

$x = 0$ является локальным минимумом, поскольку в его окрестностях производная функции меняет знак с $-$ на $+$

$x = 2$ является локальным максимумом, поскольку в его окрестностях производная функции меняет знак с $+$ на $-$

i) Интервалы выпуклости и вогнутости, точки перегиба

$$y'' = ((2x - x^2)e^{-x})' = (2x - x^2)'e^{-x} + (2x - x^2)(e^{-x})' = (2 - 2x)e^{-x} + (2x - x^2)e^{-x} \cdot (-x)' =$$

$$= (2 - 2x)e^{-x} - (2x - x^2)e^{-x} = e^{-x}(2 - 2x - 2x + x^2) = \frac{x^2 - 4x + 2}{e^x}$$

$$\frac{x^2 - 4x + 2}{e^x} = 0$$

$$x^2 - 4x + 2 = 0$$

$$x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x + 4 - 4 + 2 = 0$$


$$(x - 2)^2 = 2$$

$$x = \sqrt{2} \pm 2 \Rightarrow x_1 = 3.4142; x_2 = 0.58559 - \text{точки перегиба}$$

$(-\infty, 0.58559)$	$(0.58559, 3.4142)$	$(3.4142, +\infty)$
$f''(x) > 0$	$f''(x) < 0$	$f''(x) > 0$
Функция вогнута	Функция выпукла	Функция вогнута

$$4) y = x - \ln x$$

a) График функции



b) Область определения функции

$$\ln x > 0 \Rightarrow x > 0 \Rightarrow \{x | x > 0\}$$

c) Четность, нечетность и периодичность

$$y(-x) = -x - \ln(-x) \Rightarrow \text{функция общего вида}$$

d) Участки непрерывности функции, точки разрыва и вид разрыва

$$x = 1 - \text{точки устранимого разрыва функции}$$

$$y = x - \ln x - \text{функция непрерывна}$$

e) Точки пересечения графика с осями координат

Пересечения с осями координат отсутствуют

f) Интервалы знакопостоянства функции

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow \{x | x > 0\}$$

g) Асимптоты

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (kx + b - f(x))$ – определение асимптоты

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x - \ln x}{x} = 1$$

$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x - \ln x - 0 \cdot x = -\infty$ – наклонные асимптоты функции отсутствуют

h) Интервалы возрастания и убывания, экстремумы

$$y' = (x - \ln x)' = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x - 1}{x}$$

$x = 1$ – нуль функции

$(-\infty, 1)$	$(1, +\infty)$
$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$
Функция убывает	Функция возрастает

$x = 1$ является локальным минимумом, поскольку в его окрестностях производная функции меняет знак с $-$ на $+$

i) Интервалы выпуклости и вогнутости, точки перегиба

$$y'' = \left(\frac{x - 1}{x}\right)' = \frac{(x - 1)'x - (x - 1)x'}{x^2} = \frac{x - x + 1}{x^2} = \frac{1}{x^2}$$

$\frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow$ корни уравнения отсутствуют

$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
$f''(x) > 0$	$f''(x) > 0$
Функция вогнута	Функция вогнута