

Calcolo delle probabilità e statistica

Alessandro Carella

Indice

1	Spazio di probabilità	3
1.1	Esempi di spazi di probabilità	5
1.1.1	Spazi finiti	5
1.1.2	Spazi discreti	5
2	Calcolo combinatorio	6
2.1	Permutazioni	6
2.1.1	Permutazioni senza ripetizioni	6
2.1.2	Permutazioni con ripetizioni	7
2.2	Coefficiente binomiale	8
2.3	Esercizi di combinatoria e probabilità elementari	8
3	Proprietà della funzione di probabilità	11
3.1	Proprietà di continuità	11
3.2	Proprietà della σ -addività	12
4	Eventi condizionati e indipendenti	14
4.0.1	Indipendenza stocastica per eventi	15
4.1	Partizione di uno spazio di probabilità	16
4.1.1	Formula di Bayes	18
4.2	Costruzione spazio prodotto	19
4.3	Esercizi su combinatoria e spazi di probabilità	20
5	Variabili aleatorie	25
5.1	Variabili aleatorie semplici	27
5.2	Media e varianza	28
5.2.1	Media, valore atteso, aspettazione o speranza matematica	28
5.2.2	Varianza di una variabile aleatoria	28

5.3	Indipendenza per v.a.	29
5.4	Variabile distribuzione binomiale	31
5.5	Esercizi su variabili aleatorie	32
5.6	Variabile aleatoria discreta	33
5.6.1	Variabile aleatoria di Poisson	33
5.6.2	Distribuzione geometrica	38
5.7	Funzione di ripartizione	42
5.7.1	Esericizi sulle variabili aleatorie discrete	46
5.8	Variabili aleatorie continue	48
5.8.1	Attesa e varianza di una variabile aleatoria continua	50
5.9	Distribuzione esponenziale	51
5.9.1	Attesa della distribuzione esponenziale	55
5.9.2	Varianza della distrubuzione esponenziale	55
5.10	Distribuzione normale o gaussiana	57
5.10.1	Attesa della distribuzione gaussiana	58
5.10.2	Varianza della distribuzione gaussiana	59
5.10.3	Procedura di standardizzazione	61

Capitolo 1

Spazio di probabilità

DEFINIZIONE 1.1: SPAZIO DI PROBABILITÀ

Lo spazio di probabilità è una terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

1. Ω è un insieme non vuoto, lo spazio campionario, i cui elementi $\omega \in \Omega$ rappresentano i singoli esiti dell'esperimento aleatorio;

Esempio

Esperimento di lancio di una moneta:

$$\Omega = \{T, C\}$$

Lancio di un dado:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

2. $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ ($|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|}$) è una collezione di sottoinsiemi di Ω , chiamati **eventi**, tali che:

2.1. $\emptyset, \Omega \in \mathcal{F}$ ove $\emptyset$ è l'evento impossibile e Ω è l'evento certo;

2.2. $E \in \mathcal{F} \iff E^C = \Omega \setminus E \in \mathcal{F}$

2.3. Se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ è una successione di eventi $\Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$

Ad esempio:

$$E_1, E_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow E_1 \cup E_2 \in \mathcal{F}$$

Ne consegue la seguente proprietà:

2.4. $E_1, E_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow E_1 \cap E_2 \in \mathcal{F}$

Infatti, dalle legge di De Morgan ne consegue che:

$$(E_1 \cap E_2)^C = E_1^C \cup E_2^C \in \mathcal{F}$$

$$\text{Piu' in generale, se } \{E_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F} \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$$

$\mathcal{F}$ è una σ -algebra se rispetcia le proprietà elencate.

3. P è una funzione di probabilità, cioè:

$$P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

$$E \mapsto \mathcal{P}(E) \in \mathcal{F}$$

tale che:

$$3.1. \mathcal{P}(\emptyset) = 0, \mathcal{P}(\Omega) = 1$$

$$3.2. \text{ Se } \{E_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F} \text{ con } E_n \cap E_m = \emptyset \quad \forall n \neq m$$

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n)$$

Di conseguenza:

$$\bullet \mathcal{P}(E^C) = 1 - \mathcal{P}(E)$$

Questo perchè:

$$\Omega = E \cup E^C \Rightarrow \mathcal{P}(\Omega) = \mathcal{P}(E \cup E^C) \Rightarrow 1 = \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(E^C)$$

$$\bullet \text{ Sia } E_2 \subset E_1$$

$$\mathcal{P}(E_1 \setminus E_2) = \mathcal{P}(E_1) - \mathcal{P}(E_2) \geq 0 \iff \mathcal{P}(E_1) \geq \mathcal{P}(E_2)$$

Questa è la **monotonia**:

$$E \subseteq F \in \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{P}(E) \leq \mathcal{P}(F)$$

$$\bullet \mathcal{P}(E_1 \cup E_2) = \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1 \cap E_2)$$

Questo perchè:

$$E_1 \cup E_2 = E_1 \cup (E_2 \setminus E_1) \Rightarrow \mathcal{P}(E_1 \cup E_2) = \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2 \setminus E_1)$$

$$E_2 \setminus E_1 = E_2 \setminus (E_1 \cap E_2) \Rightarrow \mathcal{P}(E_2 \setminus E_1) = \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1 \cap E_2)$$

Ne consegue che:

$$\mathcal{P}(E_1 \cup E_2) \leq \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2)$$

1.1 Esempi di spazi di probabilità

1.1.1 Spazi finiti

Negli spazi di probabilità finiti Ω è un insieme finito, ovvero: $|\Omega| < \infty$. Una distribuzione di probabilità finita su Ω è una probabilità P tale che $\mathcal{P}(\{\omega\}) = p$, dove $\omega \in \Omega$ e p è un numero che non dipende da ω . Dalla relazione:

$$1 = \mathcal{P}(\Omega) = \sum_{w \in \Omega} \mathcal{P}(\{w\}) = \sum_{p=\mathcal{P}(\{w\})} p$$

ove $0 < p < 1$ Sia $E \subset \Omega$ allora:

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{i: w_i \in E} p_i$$

In particolare:

$$p_1 = p_2 = \dots = p_n = \frac{1}{n}$$

corrisponde al cosiddetto **spazio uniforme**. Quindi:

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{i: w_i \in E} p_i = \frac{|E|}{n} = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

ove $|E|$ sono i casi favorevoli e $|\Omega|$ i casi possibili.

1.1.2 Spazi discreti

Negli spazi di probabilità discreti Ω è un infinito numerabile, ovvero: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$. Una distribuzione di probabilità discreta su Ω è una probabilità P tale che $\mathcal{P}(\{w_i\}) =$

$$p_i \quad \forall i \in \mathbb{N} \text{ ove } 0 < p_i < 1 \text{ con } \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1.$$

Un esperimento può consistere nel scegliere "a caso" un numero tra 0 e 1, quindi: $\Omega = [0, 1]$

Considerando un intervallo $I = [a, b] \subset [0, 1] \in \mathcal{F}$ e $\mathcal{P}(I) = b - a$.

è bene notare che la collezione di tutti gli intervalli contenuti in $[0, 1]$ non è una σ -algebra perchè non soddisfano la proprietà del complementare in quanto il complementare di un intervallo è sconnesso e quindi non è un intervallo.

Ad esempio in un intervallo $I = [0, 1]$ e sia $A = [0.5, 0.7] \subset I \Rightarrow A^C = [0, 0.5[\cup]0.7, 1]$

$\mathcal{F} = \beta \not\subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ove $\beta = \sigma$ -algebra dei boreliani.

$E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ e $\mathcal{P}(E) = 0$.

Capitolo 2

Calcolo combinatorio

Il calcolo combinatorio è la branca della matematica che studia i modi secondo i quali possiamo raggruppare o ordinare elementi di un insieme finito di oggetti. Quindi dato un insieme A di n oggetti si vogliono contare le configurazioni che possono assumere k oggetti tratti da questo insieme e bisogna precisare due aspetti:

1. se l'ordinamento è importante;
2. se si possono avere piu' ripetizioni di uno stesso oggetto.

2.1 Permutazioni

Una permutazione di un insieme di oggetti è una presentazione ordinata dei suoi elementi.

2.1.1 Permutazioni senza ripetizioni

Nel caso di permutazioni senza ripetizioni un elemento puo' apparire una sola volta nella sequenza ordinata. Per contare quante sono le permutazioni di un insieme di n elementi, si osservi che il primo elemento in n modi diversi, il secondo in $n - 1$ modi diversi e cosi via. Dunque il numero di permutazioni corrisponde esattamente al **fattoriale** di n , ovvero $n!$. Il fattoriale è una funzione definita ricorsivamente in questo modo:

$$n! = n \cdot (n - 1)!$$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot (n)$$

Nella teoria delle probabilità serve per calcolare la probabilità di eventi con ordine.

Esempio

In quanti modi si può anagrammare la parola "MONTE", contando anche le parole prive di significato?

La parola MONTE ha 5 lettere quindi $n = 5$ e le possibili permutazioni sono $5! = 120$

2.1.2 Permutazioni con ripetizioni

In alcuni casi un insieme può contenere anche elementi che si ripetono. In questo caso alcune permutazioni di tali elementi saranno uguali tra loro. Indicando con $k_1, k_2, \dots, k_r$ ove $r \leq n$ il numero di volte in cui un oggetto dell'insieme viene ripetuto più volte, il numero di permutazioni diviene:

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdots k_r!}$$

ovvero si divide il numero delle permutazioni di n oggetti per il numero di permutazioni di presenze di uno stesso elemento.

Esempio

In quanti modi si può anagrammare la parola "FARFALLA"?

Le lettere nella parola FARFALLA sono 8, quindi $n = 8$, gli elementi che si ripetono sono:

- la lettera F, con $k_1 = 2$
- la lettera A, con $k_2 = 3$
- la lettera L, con $k_3 = 3$

quindi il numero di permutazioni diventa:

$$\frac{8!}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = 1680$$

2.2 Coefficiente binomiale

Dato un numero $n \in \mathbb{N}$ e un numero $k \in [0, n]$ il coefficiente binomiale è così definito:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Il coefficiente binomiale conta il numero di sottoinsiemi di k elementi in un insieme di n elementi. È bene considerare che:

- $\binom{n}{0} = 1$ ovvero l'insieme vuoto;
- $\binom{n}{n} = 1$ ovvero l'insieme con tutti gli elementi;
- $\binom{n}{1} = n$ ovvero tutti i sottoinsiemi con un solo elemento e sono disponibili n scelte.

Il coefficiente binomiale deriva dalla **formula del binomio di Newton**:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Se $a = b = 1$:

$$2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

che corrisponde al numero degli elementi dell'insieme delle parti di un insieme.

2.3 Esercizi di combinatoria e probabilità elementari

Esercizio 2.3.1

Traccia

Ho un'associazione con 50 soci.

Devo scegliere 5 membri per formare un comitato direttivo.

Quante scelte ho?

Per calcolare il numero di scelte utilizziamo il coefficiente binomiale ove $n = 50$ e $k = 5$. Quindi:

$$\binom{50}{5} = \frac{50!}{5! \cdot 45!} = \frac{50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 2.118.766$$

Esercizio 2.3.2

Traccia

Quanti numeri di 5 cifre posso scrivere usando solo 1, 3, 5, 7, 9 senza ripetizioni? E con ripetizioni?

Alla prima domanda si risponde facendo $5! = 120$ perchè sono delle permutazioni senza ripetizioni.

Alla seconda domanda si risponde $5^5 = 3125$ perchè ho 5 possibilità per tutte e 5 le posizioni.

Esercizio 2.3.3

Traccia

Ho a disposizione 2 paia di scarpe, 3 paia di pantaloni e 5 magliette. In quanti modi posso vestirmi?

La risposta è data da $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

Esercizio 2.3.4

Traccia

Quanti sono i numeri di 6 cifre che non contengono 0, che hanno la cifra 1 due volte e che hanno la cifra 2 due volte?

La risposta è data dal calcolo:

$$\binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot 7^2 =$$

Perchè ho preso un sottoinsieme di 2 elementi dalle 6 posizioni possibili, un sottoinsieme di 2 elementi dalla restanti 4 posizioni possibili e ho 7 possibilità per le restanti due ultime posizioni possibili.

Esercizio 2.3.5: Esercizio della scarpiera

Traccia

Una scarpiera contiene 8 paia di scarpe.

Si prendono 4 scarpe a caso, qual'è la probabilità di non formare nessun paio di scarpe, di formarne esattamente uno e di formarne esattamente 2?

Questo si risolve con $\mathcal{P}(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$ ove $|\Omega| = \binom{16}{4} = 1820$

$$1. |E| = \frac{16 \cdot 14 \cdot 12 \cdot 10}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 1120.$$

$$\text{Quindi } \mathcal{P}(E) = \frac{1120}{1820}$$

Questo perchè alla prima scelta si hanno 16 possibilità per scegliere una scarpa, successivamente abbiamo 14 possibilità in quanto non possiamo selezionare il paio abbinato alla scarpa scelta precedentemente e così via.

$$2. |E| = \frac{8 \cdot 14 \cdot 12}{2} = 672$$

$$\text{Quindi } \mathcal{P}(E) = \frac{672}{1820}$$

Questo perchè scegliamo il primo paio dove abbiamo 8 possibilità, quindi abbiamo 14 scarpe disponibili per scegliere la terza scarpa e altre 12 per scegliere la quarta scarpa. Dividiamo per 2 perchè non dobbiamo tenere conto dell'ordine della terza e quarta scarpa.

$$3. |E| = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$$

$$\text{Quindi } \mathcal{P}(E) = \frac{28}{1820}$$

Questo perchè dove aver scelto il primo paio di scarpe con 8 possibilità ne avremo 7. Dividiamo per 2 perchè non dobbiamo tenere conto dell'ordine.

Esercizio 2.3.6

Traccia

In un paese ci sono 5 alberghi. Se 3 persone devono scegliere a caso dove pernottare, qual'è la probabilità che finiscano in 3 alberghi diversi?

Vogliamo usare la formula $\mathcal{P}(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$

Ogni persona ha 5 possibilità quindi $|\Omega| = 5^3 = 125$

$$|E| = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

$$\text{Quindi } \mathcal{P}(E) = \frac{60}{125}.$$

Capitolo 3

Proprietà della funzione di probabilità

Se abbiamo una successione di eventi $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ allora è vero che:

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n)$$

In particolare se $\mathcal{P}(E_n) = 0 \Rightarrow \mathcal{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = 0$

3.1 Proprietà di continuità

Teorema 3.1: Continuità successione di eventi crescente

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ uno spazio di probabilità e $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ una successione di eventi tali che $E_n \subset E_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}(E_n) = \mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$$

Teorema 3.2: Continuità successione di eventi decrescente

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ uno spazio di probabilità e $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ una successione di eventi tali che $E_{n+1} \subseteq E_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}(E_n) = \mathcal{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)$$

Corollario 3.1

Nella ipotesi della **continuità successione di eventi decrescente**, se

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset \Rightarrow \mathcal{P}(E_n) \rightarrow 0$$

Dimostrazione. Dimostrazione della proprietà **continuità successione di eventi crescente** Sia $F_1 = E_1, F_2 = E_2 \setminus E_1, \dots, F_n = E_n \setminus E_{n-1}$

Inoltre $F_n \cap F_m = \emptyset$ e vale $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathcal{P}(F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mathcal{P}(F_k)$$

$$\sum_{k=1}^n \mathcal{P}(F_k) = \mathcal{P}(F_1) + \mathcal{P}(F_2) + \dots + \mathcal{P}(F_n)$$

$$\begin{aligned} &= \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_3) - \mathcal{P}(E_2) + \dots + \mathcal{P}(E_n) - \mathcal{P}(E_{n-1}) \\ &= \mathcal{P}(E_n) \end{aligned}$$

□

3.2 Proprietà della σ -additività

$$\mathcal{P}(E \cup F) = \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(F) - \mathcal{P}(E \cap F) \leq \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(F)$$

Per induzione è facile verificare che:

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(E_i)$$

Teorema 3.3: σ -additività

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ uno spazio di probabilità, allora $\mathcal{P}$ è σ -additiva, cioè:

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_i)$$

$$\forall \{E_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$$

Dimostrazione. Dimostrazione della σ -additività

Sia: $F_1 = E_1, F_2 = E_2 \cup E_1, \dots, F_n = \bigcup_{i=1}^n E_i$

Inoltre, $F_n \subseteq F_{n+1}$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}(F_n) = \mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right)$

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}(E_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(E_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n)$$

□

Esercizio 3.2.1

Traccia

Sono dati E, F con $\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(F) = 0.9$

Verificare $\mathcal{P}(E \cap F) \geq 0.8$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(E \cup F) &= \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(F) - \mathcal{P}(E \cap F) \\ \Rightarrow \mathcal{P}(E \cap F) &= \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(F) - \mathcal{P}(E \cup F) \\ &= 1.8 - 1 = 0.8\end{aligned}$$

in quanto $\mathcal{P}(E \cup F) \leq \mathcal{P}(\Omega) = 1$

Capitolo 4

Eventi condizionati e indipendenti

DEFINIZIONE 4.1: EVENTI CONDIZIONATI

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e supponiamo un evento $H \in \mathcal{F}$ ove $\mathcal{P}(H) > 0$.

Sia un ulteriore evento $E \in \mathcal{F}$, allora definiamo:

$$\mathcal{P}(E | H) = \frac{\mathcal{P}(E \cap H)}{\mathcal{P}(H)}$$

e si chiama la **probabilità condizionata di E dato H**

Nota

La funzione $E \in \mathcal{F} \mapsto \mathcal{P}(E | H)$ è una funzione di probabilità.

Infatti:

$$\mathcal{P}(\Omega | H) = \frac{\mathcal{P}(\Omega \cap H)}{\mathcal{P}(H)} = \frac{\mathcal{P}(H)}{\mathcal{P}(H)} = 1$$

e inoltre rispetta la proprietà di σ -additività, infatti:

$$\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F} \quad E_n \cap E_m = \emptyset \quad \forall n \neq m$$

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n | H\right) = \frac{1}{\mathcal{P}(H)} \cdot \mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \cap H\right) = \frac{1}{\mathcal{P}(H)} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n \cap H) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n | H)$$

Esempio

Sia $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ e $\mathcal{P}(\{i\}) = \frac{1}{6}$

$H = \{2, 4, 6\}$ e $E = \{2\}$ ove $\mathcal{P}(E) = \frac{1}{6}$

$$\mathcal{P}(E | H) = \frac{\mathcal{P}(E \cap H)}{\mathcal{P}(H)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

4.0.1 Indipendenza stocastica per eventi

DEFINIZIONE 4.2: INDIPENDENZA STOCASTICA

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e sia $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$ sono indipendenti se:

$$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \mathcal{P}(E_1)\mathcal{P}(E_2)$$

Dimostrazione. Dimostrazione di **indipendenza stocastica**

Dato che:

$$\mathcal{P}(E_1 | E_2) = \mathcal{P}(E_1)$$

$$\mathcal{P}(E_2 | E_1) = \mathcal{P}(E_2)$$

allora:

$$\mathcal{P}(E_1 | E_2) = \frac{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathcal{P}(E_2)} \Rightarrow \mathcal{P}(E_1) = \frac{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathcal{P}(E_2)}$$

□

Nota : Evento indipendente da se stesso

Un evento E è indipendente da se stesso $\iff$

$$\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(E \cap E) = \mathcal{P}(E)^2 \iff \mathcal{P}(E) = 0 \wedge \mathcal{P}(E) = 1$$

Nota : Indipendenza del complementare degli eventi

Se E_1, E_2 sono indipendenti, allora:

$$E_1^C, E_2^C \text{ sono indipendenti}$$

Verifichiamo che E_1^C e E_2 sono indipendenti:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(E_1^C \cap E_2) &= \mathcal{P}(E_2 \setminus E_1) \\ &= \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_2 \cap E_1) \\ &= \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_2)\mathcal{P}(E_1) \\ &= \mathcal{P}(E_2)(1 - \mathcal{P}(E_1)) \\ &= \mathcal{P}(E_2)\mathcal{P}(E_1^C)\end{aligned}$$

$E_1^C \cap E_2$ rappresentano gli eventi presenti in E_1^C e E_2 e di conseguenza quelli che sono in E_2 ma non sono in E_1 quindi:

$$E_1^C \cap E_2 = E_2 \setminus E_1$$

Dimostrazione. Dimostrazione **indipendenza del complementare degli eventi**
Sappiamo che:

$$\mathcal{P}(E_1^C \cap E_2^C) = \mathcal{P}((E_1 \cup E_2)^C) \quad (4.1)$$

$$= 1 - \mathcal{P}(E_1 \cup E_2) \quad (4.2)$$

$$= 1 - [\mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1 \cap E_2)] \quad (4.3)$$

$$= 1 - \mathcal{P}(E_1) - \mathcal{P}(E_2) + \mathcal{P}(E_1) \mathcal{P}(E_2) \quad (4.4)$$

$$= (1 - \mathcal{P}(E_1))(1 - \mathcal{P}(E_2)) \quad (4.5)$$

$$= \mathcal{P}(E_1^C) \mathcal{P}(E_2^C) \quad (4.6)$$

□

DEFINIZIONE 4.3: INDIPENDENZA PER FAMIGLIA DI EVENTI

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e $E_1, E_2, \dots, E_n \in \mathcal{F}$ sono indipendenti se:

$$\forall k \in 2 \leq k \leq n \quad \forall i_1, i_2, \dots, i_k \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\mathcal{P}(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k}) = \mathcal{P}(E_{i_1}) \mathcal{P}(E_{i_2}) \dots \mathcal{P}(E_{i_k})$$

Nota

Non è vero che una famiglia di eventi sono indipendenti se sono a 2 a 2 indipendenti.

Ad esempio se $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ e:

$$A_1 = \{1, 4\} \quad A_2 = \{2, 4\} \quad A_3 = \{3, 4\}$$

Allora A_1, A_2, A_3 sono indipendenti a due a due ma:

$$\mathcal{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathcal{P}(\{4\}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathcal{P}(A_1) \mathcal{P}(A_2) \mathcal{P}(A_3)$$

4.1 Partizione di uno spazio di probabilità

DEFINIZIONE 4.4: PARTIZIONE DI UNO SPAZIO DI PROBABILITÀ

Una partizione di uno spazio di probabilità è una collezione di eventi

$$\{H_1, H_2, \dots, H_n\} \subset \mathcal{F} \text{ tali che } H_i \cap H_j = \emptyset \quad \forall i \neq j \text{ e } \bigcup_{i=1}^{\infty} H_i = \Omega$$

Le H stanno per hypothesis.

DEFINIZIONE 4.5: FORMULA DELLA PROBABILITÀ TOTALE

Sia $E \in \mathcal{F}$, l'obiettivo è esprimere $\mathcal{P}(E)$ se conosco $\mathcal{P}(H_i)$ e $\mathcal{P}(E | H_i)$

Allora:

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(E | H_i) \mathcal{P}(H_i)$$

Dimostrazione. Dimostrazione della **formula della probabilità totale**

$E = \bigcup_{i=1}^n (E \cap H_i)$ e $(E \cap H_i) \cap (E \cap H_j) = \emptyset \quad \forall i \neq j$ e quindi:

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(E \cap H_i) = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(E | H_i) \mathcal{P}(H_i)$$

□

Esercizio 4.1.1: Esercizio partizione di spazio probabilita**Traccia**

Un'urna contiene 10 monete, di cui sono 4 truccate e fanno uscire testa con probabilità $\frac{1}{3}$.

Si pesca a caso una moneta e la si lancia una volta. Qual è la probabilità che esca testa? Qual è la probabilità che la moneta sia equa se è uscita testa?

- $H_1 = \text{"Scelgo una moneta equa"}$

$$\mathcal{P}(H_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

- $H_2 = \text{"Scelgo una moneta truccata"}$

$$\mathcal{P}(H_2) = \mathcal{P}(H_1^C) = 1 - \mathcal{P}(H_1) = \frac{2}{5}$$

- $E = \text{"Esce testa"}$

$$\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(E | H_1) \mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E | H_2) \mathcal{P}(H_2)$$

$$\text{Calcoliamo } \mathcal{P}(E | H_1) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Calcoliamo } \mathcal{P}(E | H_2) = \frac{1}{3}$$

Allora:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(E) &= \mathcal{P}(E | H_1) \mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E | H_2) \mathcal{P}(H_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \\ &= \frac{3}{10} + \frac{2}{15} = \frac{13}{30} \end{aligned}$$

Risolviamo il secondo punto. Questa è la probabilità di H_1 dato E , quindi:

$$\mathcal{P}(H_1 | E) = ?$$

per risolvere questo punto ci serve la formula di Bayes.

4.1.1 Formula di Bayes

DEFINIZIONE 4.6: FORMULA DI BAYES

Vogliamo calcolare $\mathcal{P}(H_j | E)$

Notiamo che $\mathcal{P}(E | H_j) = \frac{\mathcal{P}(E \cap H_j)}{\mathcal{P}(H_j)}$

Allora:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(H_j | E) &= \frac{\mathcal{P}(H_j \cap E)}{\mathcal{P}(E)} \\ &= \frac{\mathcal{P}(H_j \cap E)}{\sum_{i=1}^n \mathcal{P}(E | H_i) \mathcal{P}(H_i)} \\ &= \frac{\mathcal{P}(E | H_j) \mathcal{P}(H_j)}{\sum_{i=1}^n \mathcal{P}(E | H_i) \mathcal{P}(H_i)} \\ &= \frac{\mathcal{P}(E | H_j) \mathcal{P}(H_j)}{\mathcal{P}(E)}\end{aligned}$$

Con questa formula possiamo completare l'**esercizio partizione di spazio probabilita**.

Esercizio 4.1.2

Traccia

Un'urna contiene 4 monete. Scelgo una pallina e la lancio 2 volte. Consideriamo:

- E_1 = "Esce testa al primo lancio"
- E_2 = "Esce testa al secondo lancio"

E_1 e E_2 sono indipendenti?

Ovvero $\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) \stackrel{?}{=} \mathcal{P}(E_1) \mathcal{P}(E_2)$

Dall'esercizio precedente **esercizio partizione di spazio probabilita** abbiamo

$$\text{che } \mathcal{P}(E_1) = \mathcal{P}(E_2) = \frac{13}{30}$$

$$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_1)\mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_2)\mathcal{P}(H_2)$$

$$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{5} \neq \left(\frac{13}{30}\right)^2$$

Quindi E_1 e E_2 sono eventi dipendenti.

Aggiungiamo un'ulteriore domanda, qual è la probabilità che la moneta sia equa se entrambi i lanci hanno dato testa?

Ovvero ci sta chiedendo $\mathcal{P}(H_1 \mid E_1 \cap E_2)$ che si calcola con la **formula di Bayes**, quindi:

$$\mathcal{P}(H_1 \mid E_1 \cap E_2) = \frac{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_1)\mathcal{P}(H_1)}{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{3}{20} + \frac{2}{45}} = 0,77$$

4.2 Costruzione spazio prodotto

DEFINIZIONE 4.7: SPAZIO PRODOTTO

Siano $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathcal{P}_1)$ e $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mathcal{P}_2)$

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2) : \omega_1 \in \Omega_1, \omega_2 \in \Omega_2\}$$

$\mathcal{F}$ = la σ -algebra degli eventi = $E_1 \times E_2$ = rettangoli. Quindi $\mathcal{F}$ è la σ -algebra generata dai rettangoli, ovvero la più piccola σ -algebra che contiene tutti i rettangoli.

$$\mathcal{P}(E_1 \times E_2) = \mathcal{P}_1(E_1)\mathcal{P}_2(E_2)$$

Quindi otteniamo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ che si chiama *spazio prodotto*.

Dimostrazione. Verifichiamo che gli eventi dello spazio prodotto sono indipendenti

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}((E_1 \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times E_2)) &= \mathcal{P}(E_1 \times E_2) \\
&= P_1(E_1)P_2(E_2) \\
&= \mathcal{P}(E_1 \times \Omega_2)\mathcal{P}(\Omega_1 \times E_2)
\end{aligned}$$

□

4.3 Esercizi su combinatoria e spazi di probabilità

Esercizio 4.3.1

Traccia

Dato un insieme di n persone, qual è la probabilità che almeno 2 persone facciano il compleanno lo stesso giorno?

Affinchè questo evento sia possibile n deve essere maggiore o uguale a 2.

Inoltre, per il principio della piccioni e caselle se $n > 365$ allora c'è almeno un caso possibile, quindi $2 \leq n \leq 365$.

Assumiamo, inoltre, che i giorni sono equiprobabili.

E = "Almeno 2 persone fanno il compleanno lo stesso giorno"

$\mathcal{P}(E) = 1 \iff n > 365$

$|\Omega| = 365^n$ perchè per ogni persona possiamo segnare 1 tra i 365 giorni disponibili.

$\mathcal{P}(E) = 1 - \mathcal{P}(E^C)$ e $\mathcal{P}(E^C) = \frac{|E^C|}{365^n} = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}$

Quindi:

$$\mathcal{P}(E) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}$$

Esercizio 4.3.2

Traccia

Hai chiesto a un vicino di innaffiare una piantina mentre sei in vacanza. Senza acqua la piantina muore con $p = 0.8$, innaffiandola la probabilità che muoia diventa $p = 0.15$. Il vicino la annaffia con $p = 0.9$.

Qual è la probabilità che la piantina sia viva al tuo ritorno? Se fosse morta, qual è la probabilità che il vicino si è dimenticato di innaffiarla?

- H_1 = "Il vicino si ricorda di innaffiare la piantina"
 $\mathcal{P}(H_1) = 0.9$
- H_2 = "Il vicino si dimentica di innaffiare la piantina"
 $\mathcal{P}(H_2) = 0.1$

- $E = \text{"La piantina è morta"}$

$$\mathcal{P}(E | H_1) = 0.15$$

$$\mathcal{P}(E | H_2) = 0.8$$

$$\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(E | H_1)\mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E | H_2)\mathcal{P}(H_2) = 0.15 \cdot 0.9 + 0.8 \cdot 0.1 = 0.21$$

$\mathcal{P}(E^C) = 1 - 0.21 = 0.79$ e questa è la probabilità che la piantina sia ancora viva.

$$\mathcal{P}(H_2 | E) = \frac{\mathcal{P}(E | H_2)\mathcal{P}(H_2)}{\mathcal{P}(E)} = \frac{0.8 \cdot 0.1}{0.21} = 0.38 \text{ e questa è la probabilità}$$

che il vicino si è dimenticato di innaffiare la pianta se quest'ultima è morta.

Esercizio 4.3.3

Traccia

Un'urna contiene 2 palline rosse e 4 palline nere. Due giocatori, A e B, giocano nel modo seguente. Le palline vengono estratte ad una ad una, vince A se l'ultima pallina estratta è rossa, altrimenti vince B.

1. Qual è la probabilità che A vinca?
2. Qual è la probabilità che A vinca se la prima pallina estratta è rossa?

$$\text{Calcoliamo } |\Omega| = \frac{6!}{2! \cdot 4!} = 15$$

1. $A = \text{"A vince"}$

A è l'insieme degli anagrammi che terminano per R, che è lo stesso calcolo per Ω ma ora abbiamo 5 palline tra le quali 4 sono ripetute, quindi:

$$|A| = \frac{5!}{4!} = 5$$

$$\mathcal{P}(A) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

2. $R_1 = \text{"La prima pallina estratta è rossa"}$

$$\mathcal{P}(A | R_1) = \frac{\mathcal{P}(A \cap R_1)}{\mathcal{P}(R_1)}$$

$\mathcal{P}(R_1) = \frac{1}{3}$ e $\mathcal{P}(A \cap R_1) = \frac{1}{15}$ perchè è solo una la configurazione vincente avendo la prima pallina rossa.

$$\mathcal{P}(A | R_1) = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{5}$$

A e R_1 non sono indipendenti $\mathcal{P}(A \cap R_1) = \frac{1}{15} \neq \mathcal{P}(A)\mathcal{P}(R_1)$

Esercizio 4.3.4

Traccia

3 urne numerate, 1, 2, 3, sono inizialmente vuote sono inizialmente vuote. Esse vengono riempite con n palline, che vengono inserite una dopo l'altra in una delle 3 urne, scelte a caso ogni volta.

1. Costruire lo spazio di probabilità che descrive questa situazione.
2. Qual è la probabilità che l'urna 1 resti vuota?
3. Qual è la probabilità che restino vuote le urne 1 e 2?
4. Qual è la probabilità che **solo** una delle tre urne resti vuota?
5. Qual è la probabilità che l'urna 1 è vuota se so che è vuota l'urna 2?

1. Un esito è un $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \quad \omega_i \in \{1, 2, 3\}$

$$\Omega = \{\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) : \omega_i \in \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}^n\}$$

$$|\Omega| = 3^n$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega) \quad \mathcal{P}(E) = \frac{|E|}{3^n} \quad \forall E \subset \Omega$$

2. $E_1 = \text{"Urna 1 rimane vuota"}$

$$E_1 = \{\omega \in \Omega \mid \omega_i \in \{2, 3\} \text{ e } |E_1| = 2^n$$

$$\mathcal{P}(E_1) = \frac{2^n}{3^n}$$

3. $E_2 = \text{"Urna 2 è vuota"}$

$$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \frac{|E_1 \cap E_2|}{3^n}$$

$$E_1 \cap E_2 = \{(3, \dots, 3)\} \text{ quindi } |E_1 \cap E_2| = 1^n$$

$$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \frac{1^n}{3^n}$$

4. $F_i = \text{"Solo l'urna } i \text{ resta vuota"}$ ove $i = 1, 2, 3$

$$\mathcal{P}(F_1 \cup F_2 \cup F_3) = \mathcal{P}(F_1) + \mathcal{P}(F_2) + \mathcal{P}(F_3) = 3\mathcal{P}(F_1) \text{ perchè gli eventi}$$

$$F_i \cap F_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$\text{Notiamo che } F_1 \subset E_1 \text{ e } |F_1| = |E_1| - |E_1 \setminus F_1|$$

$$E_1 \setminus F_1 \text{ è urna 1 e 2 vuota oppure urna 1 e 3 vuote}$$

$$E_1 \setminus F_1 = \{(3, 3, \dots, 3), (2, 2, \dots, 2)\} \text{ quindi } |E_1 \setminus F_1| = 2$$

$$|F_1| = 2^n - 2$$

$$\mathcal{P}(F_1) = \frac{2^n - 2}{3^{n-1}}$$

$$5. \mathcal{P}(E_1 | E_2) = \frac{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathcal{P}(E_2)} = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^n}{\left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{1^n}{2^n}$$

Esercizio 4.3.5

(Inserire nella dimostrazione dell'uniformità dello spazio prodotto)

Supponiamo di avere $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathcal{P}_1)$ e $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mathcal{P}_2)$ ove $|\Omega_1| = n$ e $|\Omega_2| = m$.

Allora $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega_1 \times \Omega_2), \mathcal{P})$ è uniforme.

$\mathcal{P}(E_1 \times E_2) = \mathcal{P}_1(E_1)\mathcal{P}_2(E_2)$, infatti:

$$\mathcal{P}(\{(\omega_1, \omega_2)\}) = \mathcal{P}_1(\{\omega_1\})\mathcal{P}_2(\{\omega_2\}) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{m} = \frac{1}{n \cdot m}$$

ove $n \cdot m = |\Omega_1 \times \Omega_2|$

Esercizio 4.3.6

Traccia

Quattro amici insieme ad altri 8 ragazzi partecipano ad una partita di calcio a 6 (con squadre di 6 giocatori ciascuna). Le squadre vengono sorteggiate a caso, qual è la probabilità che i 4 amici finiscano nella stessa squadra?

12 è il numero di persone totali.

$$\binom{12}{6} = \frac{12!}{6!6!} = 924$$

Per avere la squadra con i 4 amici insieme, devo prendere un sottinsieme di altre 2 persone tra le 8 restanti, quindi:

$$|E| = \binom{8}{2} = \frac{8!}{2!6!} = 28 \Rightarrow \mathcal{P}(E) = \frac{28}{924}$$

Esercizio 4.3.7

Traccia

Una scatola contiene 3 palline bianche e 2 nere. Marco estrae una pallina e la rimette nella scatola aggiungendo una pallina dello stesso colore. Estrae nuovamente una pallina, qual è la probabilità che sia bianca? Se la seconda pallina estratta è bianca, qual è la probabilità che la prima pallina estratta è bianca?

- H_1 = "La prima pallina estratta è bianca"
 $\mathcal{P}(H_1) = \frac{3}{5}$
- H_2 = "La prima pallina estratta è nera"
 $\mathcal{P}(H_2) = \frac{2}{5}$
- E = "La seconda pallina estratta è bianca"
 $\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(E | H_1)\mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E | H_2)\mathcal{P}(H_2)$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(E \mid H_1) &= \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \\ \mathcal{P}(E \mid H_2) &= \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \\ \mathcal{P}(E) &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}\end{aligned}$$

$$\bullet \mathcal{P}(H_1 \mid E) = \frac{\mathcal{P}(E|H_1)\mathcal{P}(H_1)}{\mathcal{P}(E)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{2}{3}$$

Capitolo 5

Variabili aleatorie

DEFINIZIONE 5.1: VARIABILE ALEATORIA

Dato uno spazio di probabilità, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$, una variabile aleatoria, v.a., di uno spazio di probabilità, è una funzione:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

ove $\Omega \ni \omega \rightarrow X(\omega) \in \mathbb{R}$ tale che $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < \alpha\} \in \mathcal{F}$. Questa condizione è automaticamente soddisfatta se $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

Se $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, le seguenti condizioni sono soddisfatte:

1. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < \alpha\} \in \mathcal{F}$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \geq \alpha\} \in \mathcal{F}$
3. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq \alpha\} \in \mathcal{F}$
4. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) > \alpha\} \in \mathcal{F}$

Inoltre, se X, Y sono v.a di $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$, allora:

1. $\alpha X + \beta Y$ è una v.a $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
2. $X \cdot Y$ è una v.a

Dimostrazione. Dimostrazione somma e prodotto di due v.a
Dividiamo la dimostrazione in due passi:

1. X è una v.a. quindi $\forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha X$ è una v.a.

- Se $\alpha = 0 \Rightarrow 0 \cdot X = 0$
- Se $\alpha \neq 0$ allora vale che:

$$\{\omega \in \Omega \mid \alpha X(\omega) < c\} = \left\{ \omega \in \Omega \mid X(\omega) < \frac{c}{\alpha} \right\} \in \mathcal{F} \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

2. X è una v.a. $\Rightarrow X^2$ è una v.a.

- $\{\omega \in \Omega \mid X^2(\omega) < \alpha\} = \emptyset \iff \alpha < 0$
- Se $\alpha \geq 0$ allora vale che:

$$\{\omega \in \Omega \mid X^2(\omega) < \alpha\} = \{\omega \in \Omega \mid -\sqrt{\alpha} < X(\omega) < \sqrt{\alpha}\} \in \mathcal{F}$$

Allora notiamo che:

$$(X + Y)^2 = X^2 + Y^2 + 2XY \Rightarrow XY = \frac{1}{2}[(X + Y)^2 - X^2 - Y^2]$$

è una v.a. se $X + Y$ è una v.a.

Dalla definizione di v.a. notiamo che:

$$\begin{aligned} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) + Y(\omega) > \alpha\} &= \\ \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) > q \text{ e } Y(\omega) > \alpha - q\} &= \\ \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < q\} \cap \{\omega \in \Omega \mid Y(\omega) > \alpha - q\} \end{aligned}$$

Sia:

$$F = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{\omega \mid X(\omega) < q \text{ e } Y(\omega) > \alpha - q\}$$

L'inclusione $F \subseteq E$ è ovvia in quanto:

$$X > q \text{ e } Y > \alpha - q \Rightarrow X + Y > q + \alpha - q = \alpha$$

Verifichiamo $E \subset F$:

$$x + y > \alpha \Rightarrow x > \alpha - y \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Q} \mid \alpha - y < q < x$$

□

5.1 Variabili aleatorie semplici

Consideriamo della v.a. X per le quali supporremo che prendano al più una infinità numerabile di valori $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots\}$.

DEFINIZIONE 5.2: DENSITÀ DISCRETA

Data una v.a. semplice X consideriamo la funzione $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definita da $p(\lambda) = P(\{X = \lambda\})$.

p gode delle seguenti proprietà:

- $p(x) = 0$ tranne per i valori assunti da X
-

$$\sum_{\lambda \in \mathbb{R}} p(\lambda) = 1$$

La funzione p indica la probabilità che X assuma un certo valore λ

Esempio : Variabile aleatoria indicatrice

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e $E \in \mathcal{F}$.

Indichiamo con 1_E la *funzione indicatrice* di E , cioè la funzione che assume il valore 1 su E e 0 su E^C :

$$1_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in E \\ 0 & \omega \notin E \end{cases}$$

La sua densità p è data da:

- $p(1) = P\{1_E = 1\} = P(E)$
- $p(0) = P\{1_E = 0\} = 1 - P(E)$

Una v.a. semplice è del tipo:

$$X = \sum_{i=1}^n \lambda_i 1_{E_i}$$

ove $\lambda_i \in \mathbb{R}$ e sono i valori che X può assumere e $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ sono partizioni di E e $E_i \cap E_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n E_i = \Omega$

5.2 Media e varianza

5.2.1 Media, valore atteso, aspettazione o speranza matematica

Sia X una v.a. semplice che prenda i valori $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ e indichiamo con p la densità con la quale un certo valore venga assunto.

DEFINIZIONE 5.3: VALORE ATTESO DI X

Definiamo con valore atteso di X o speranza matematica di X la quantità:

$$E[X] = \sum_{i=1}^n \lambda_i p(\lambda_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(\{X = \lambda_i\})$$

Osservando la formula notiamo che i termini che intervengono non sono altro che i possibili valori di X moltiplicati per la probabilità con cui essi vengono assunti.

Proprietà del valore atteso

Se X, Y sono v.a. allora:

- $E[\alpha X + \beta Y] = \alpha E[X] + \beta E[Y]$
- Se $X \geq 0 \Rightarrow E[X] \geq 0$
- Se $X \geq 0$ e $E[X] = 0 \Rightarrow X = 0$

Esempio : Valore atteso della v.a. indicatrice

Sia $E \in \mathcal{F}$ e consideriamo la v.a. indicatrice 1_E . Sappiamo che 1_E ha una legge di Bernoulli di parametro $p = P(E)$. Dunque:

$$E[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$$

5.2.2 Varianza di una variabile aleatoria

DEFINIZIONE 5.4: VARANZA DI UNA VARIABILE ALEATORIA

Sia X una v.a. e definiamo varianza di una variabile aleatoria la *dispersione* di X attorno alla sua media, infatti la varianza è così definita:

$$Var[X] = E[(X - \mu)^2]$$

ove $\mu = E[X]$

Se sappiamo con certezza che $\mu = E[X] = X$ allora $Var[X] = 0$

Esempio : Calcolo della varianza per la variabile di Bernoulli

Sia $E \in \mathcal{F}$ e consideriamo la v.a. indicatrice 1_E . Sappiamo che 1_E ha una legge di Bernoulli di parametro $p = P(E)$ ove $E[X] = p$. Dunque:

$$\begin{aligned} Var[X] &= E[(X - p)^2] = \\ &= E[X^2 + p^2 - 2pX] = \\ &= E[X^2] + p^2 - 2pX = \\ &= E[X^2] - p^2 = \\ &= p - p^2 = p(1 - p) \end{aligned}$$

Proprietà della varianza

- $Var[\alpha X] = \alpha^2 Var[X]$
- $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$
- $Var[X + c] = Var[X] \quad \forall c \in \mathbb{R}$

Nota

$$Var[X + Y] \neq Var[X] + Var[Y]$$

5.3 Indipendenza per v.a.

DEFINIZIONE 5.5: VARIABILI ALEATORIE INDIPENDENTI

Le variabili aleatorie X, Y su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ sono indipendenti se $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$P[\{X \leq \alpha\} \cap \{Y \leq \beta\}] = P[\{X \leq \alpha\}]P[\{Y \leq \beta\}]$$

Nel caso in cui:

$$X = \sum_{i=1}^n \lambda_i 1_{E_i} \quad \{E_1, E_2, \dots, E_n\} \subset \mathcal{F} \text{ partizioni di } \Omega$$

e

$$Y = \sum_{j=1}^m \lambda_j 1_{F_j} \quad \{F_1, F_2, \dots, F_m\} \subset \mathcal{F} \text{ partizioni di } \Omega$$

X e Y sono indipendenti $\iff P(E_i \cap F_j) = P(E_i)P(F_j)$

Teorema 5.1

Se X, Y sono v.a. semplici indipendenti:

$$Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y]$$

LEMMA 5.1 – «ATTESA DI DUE VARIABILI ALEATORIE INDIPENDENTI»

Se X e Y sono v.a. semplici indipendenti:

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

Dimostrazione. Dimostrazione attesa di due variabili aleatorie indipendenti

$$XY = \sum_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, m}} \lambda_i \mu_j 1_{E_i \cap F_j}$$

allora:

$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, m}} \lambda_i \mu_j P(E_i \cap F_j) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \lambda_i \mu_j P(E_i) P(F_j) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i P(E_i) \right) \left(\sum_{j=1}^m \mu_j P(F_j) \right) = \\ &= E[X] E[Y] \end{aligned}$$

□

Se: $\mu = E[X]$ e $v = E[Y]$ allora $Var[X + Y] = Var[(X - \mu) + (Y - v)]$.

Possiamo supporre che: $\mu = v = 0$:

$$\begin{aligned} Var[X + Y] &= E\left[(X + Y)^2 - (E[X + Y])^2\right] = \\ &= E[X^2 + Y^2 + 2XY] = \\ &= E[X^2] + E[Y^2] + 2E[XY] = \\ &= E[X^2] + E[Y^2] + 2E[X]E[Y] = \\ &= Var[X] + Var[Y] \end{aligned}$$

5.4 Variabile distribuzione binomiale

Sia:

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

ove X_i può assumere i valori $\{0, 1\}$

$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ dove X_i prende valori $\{0, 1\}$ con legge di Bernoulli $p = P(E) = P(\{X_i = 1\})$ con X_i indipendenti.

Allora, possiamo calcolare il valore atteso e la varianza in due modi:

1. $E[X_i] = p$ e $Var(X_i) = p(1 - p)$, allora:

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = np \quad Var[X] = \sum_{i=1}^n Var(X_i) = np(1 - p)$$

in quanto X_i sono indipendenti e ci possiamo risparmiare i calcoli della distribuzione binomiale.

2. X prende i valori $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ e la distribuzione di probabilità è data dalla formula:

$$P(\{X = k\}) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Calcoliamo $E[X]$ e $Var[X]$ con la sola definizione: Allora:

$$E[X] = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$Var[X] = E[X^2] - n^2 p^2 = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} - n^2 p^2$$

Si possono calcolare queste somme ma il calcolo è complesso e il risultato è sempre lo stesso.

5.5 Esercizi su variabili aleatorie

Esercizio 5.5.1

Traccia

Un calcolatore è collegato a una rete e permette l'accesso a un massimo di 20 persone. Collegati a questa rete ci sono 24 operatori e a un dato istante la probabilità che l'operatore richieda l'accesso è $p = 0.6$ e le richieste di accesso sono indipendenti.

Qual è la probabilità che a un certo istante di tempo la rete sia satura?

Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di richieste in un certo istante di tempo.

X è binomiale con $p = 0.6$ e $n = 24$, quindi:

$$P[X = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Ci interessa sapere $P[X \geq 20] = P[X = 20] + P[X = 21] + P[X = 22] + P[X = 23] + P[X = 24]$

$E[X] = np \approx 14.4$ quindi ci dice che in media ci saranno 14 operatori collegati in un certo istante di tempo.

Esercizio 5.5.2

Traccia

Una fabbrica produce componenti elettronici. Questi escono da due linee di produzione A e B nelle percentuali 30% e 70%. La linea A ha una percentuale di pezzi difettosi pari al 10% contro il 17% di B .

Qual è la probabilità che un pezzo pescato a caso sia difettoso?

I pezzi vengono venduti in confezione da 10, tutti appartenenti alla stessa linea di produzione. Una di queste confezioni viene ispezionata e viene trovato esattamente un pezzo difettoso, qual è la probabilità che questa confezione provenga da A ?

Rispondiamo alla prima domanda:

- A = "il pezzo proviene dalla linea A" e $P(A) = 0.3$
- B = "il pezzo proviene dalla linea B" e $P(B) = 0.7$
- E = "il pezzo è difettoso":
 - $P(E | A) = 0.1$
 - $P(E | B) = 0.17$

$$P(E) = P(E | A)P(A) + P(E | B)P(B) = 0.149 \approx 15\%$$

Rispondiamo alla seconda domanda:

- F = "1 pezzo è difettoso"
 $P(F) = P(F | A)P(A) + P(F | B)P(B)$
 $P(F | A) = \binom{10}{1} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{10}{1} \frac{1}{10} \left(\frac{9}{10}\right)^9 = 0.38$
 $P(F | B) = \binom{10}{1} \frac{17}{10} \left(\frac{83}{10}\right)^9 = 0.31$
 $P(F) = 0.38 \cdot 0.3 + 0.31 \cdot 0.7 = 0.331$
 $P(A | F) = \frac{P(F|A)P(A)}{P(F)} = 0.344 \approx 35\%$

Applichiamo la distribuzione binomiale perchè i pezzi sono indipendenti l'uno dall'altro e gli esperimenti sono gli stessi ripetuti tante volte.

5.6 Variabile aleatoria discreta

X è una variabile aleatoria discreta se:

$$X = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n 1_{E_n}(\omega)$$

con $\{E_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$

5.6.1 Variabile aleatoria di Poisson

Una variabile di Poisson è una v.a. X che prende i valori $\{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$ e vale la legge:

$$P[X = k] = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$$

con $\lambda > 0$.

λ si presta ad una doppia interpretazione in quanto $E[X] = \lambda$ oppure $Var[X] = \lambda$

Questa variabile si chiama anche *variabile degli eventi rari* e si presta a contare la probabilità di k eventi considerati rari.

Teorema 5.2: Formula di Poisson

Se $\{X_n\}$ è una successione di binomiali con parametri n e $p = \frac{\lambda}{n}$, allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P[X_n = k] = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Dimostrazione. Dimostrazione della **formula di Poisson**

Come abbiamo detto le variabili di Poisson possono essere usate per approssimare le leggi binomiali.

Consideriamo infatti una v.a. $X_n \sim B(n, \frac{\lambda}{n})$ e studiamo il comportamento di essa per $n \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} P[X_n = k] &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &\rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

dove abbiamo usato i limiti:

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n &\rightarrow e^{-\lambda} \\ \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} &\rightarrow 1 \\ \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} &\rightarrow 1 \end{aligned}$$

□

Proprietà

Se X e Y sono v.a. di Poisson indipendenti, allora:

- $X + Y$ è di Poisson e il parametro di $X + Y$ è $\mu + \lambda$ ove μ è il parametro di X e λ di Y .

Questa probabilità si chiama **riproducibilità** di Poisson.

- $E[X] = Var[X] = \lambda$

Esercizio 5.6.1

Traccia

Due centralini, tra di loro indipendenti, ricevono nell'unità di tempo un numero di telefonate, X e Y , v.a. di Poisson rispettivamente di parametro λ e μ .

1. Qual è la probabilità che nell'unità di tempo i due centralini ricevano insieme più di 3 telefonate se $\lambda = 2$ e $\mu = 4$

2. Qual è la probabilità la legge condizionata di X sapendo che $X + Y = n$?

1. $X + Y$ è la v.a. che conta quante chiamate ricevono i centralini complessivamente di parametro $\lambda + \mu = 2 + 4 = 6$

$$P[X + Y > 3] = 1 - P[X + Y \leq 3] = 1 - P[X + Y = 0] - P[X + Y = 1] - P[X + Y = 2] - P[X + Y = 3]$$

$$P[X + Y = k] = e^{-6} \frac{6^k}{k!}$$

$$P[X + Y = 0] = e^{-6} \frac{6^0}{0!} = e^{-6}$$

$$P[X + Y = 1] = e^{-6} \frac{6^1}{1!} = e^{-6} \cdot 6$$

$$P[X + Y = 2] = e^{-6} \frac{6^2}{2!} = e^{-6} \cdot 18$$

$$P[X + Y = 3] = e^{-6} \frac{6^3}{3!} = e^{-6} \cdot 36$$

$$P[X + Y > 3] = 1 - e^{-6}(1 + 6 + 18 + 36) = 0.85$$

$$2. P[X = k \mid X + Y = n] = \frac{P[X = k \cap X + Y = n]}{P[X + Y = n]}$$

Questa è 0 quando $k > n$, quindi l'analizziamo per $k = 1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned} P[X = k \mid X + Y = n] &= \frac{P[X = k \cap Y = n - k]}{P[X + Y = n]} = \frac{P[X = k]P[Y = n - k]}{P[X + Y = n]} = \\ &= \frac{e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}} = \frac{\lambda^k}{k!} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} \frac{n!}{(\lambda+\mu)^n} = \\ &= \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} \frac{1}{(\lambda+\mu)^{n-k}} \frac{1}{(\lambda+\mu)^k} = \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu} \right)^{n-k} \end{aligned}$$

Questa corrisponde alla distribuzione binomiale con:

$$p = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \quad 1 - p = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

Speranza matematica per la variabile di Poisson

La speranza matematica della variabile di Poisson è :

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k \cdot \lambda^k}{k!}$$

Sappiamo che:

$$e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Se derivate, troviamo che:

$$e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k \cdot \lambda^{k-1}}{k!}$$

Moltiplicando per λ ad entrambi i membri, otteniamo:

$$\lambda e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k \cdot \lambda^k}{k!}$$

Quindi:

$$E[X] = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k \cdot \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda} = \lambda$$

Varianza della variabile di Poisson

La varianza della variabile di Poisson è:

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

Notiamo che:

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!}$$

Come detto prima:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{\lambda}$$

Derivando, otteniamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^{k-1}}{k!} = e^{\lambda} + \lambda e^{\lambda} = (\lambda + 1) e^{\lambda}$$

Moltiplicando per λ otteniamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} = (\lambda^2 + \lambda) e^{\lambda}$$

Allora:

$$E[X^2] = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} (\lambda^2 + \lambda) e^{\lambda} = \lambda^2 + \lambda$$

Concludendo:

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Riproducibilità di Poisson

Sia $X \sim Poisson(\lambda)$ e $Y \sim Poisson(\mu)$ e vogliamo verificare che:

$$P[X + Y = k] = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!}$$

Possiamo considerare che $X = l$ e $Y = k - l$, quindi:

$$\begin{aligned}
 P[X + Y = k] &= \sum_{l=0}^k P[X = l \cap Y = k - l] = \sum_{l=0}^k P[X = l]P[Y = k - l] \\
 &= \sum_{l=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^l}{l!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-l}}{(k-l)!} = e^{-(\lambda+\mu)} \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} \frac{1}{k!} \lambda^l \mu^{k-l} \\
 &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} \lambda^l \mu^{k-l} \\
 &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!}
 \end{aligned}$$

Dove abbiamo applicato la formula di Newton:

$$\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} \lambda^l \mu^{k-l} = (\lambda + \mu)^k$$

e

$$\frac{1}{l!(k-l)!} = \binom{k}{l} \frac{1}{k!}$$

5.6.2 Distribuzione geometrica

La distribuzione geometrica è la variabile aleatoria che conta il numero di tentativi necessari per ottenere primo successo nell'esperimento.

L'esperimento è la ripetizione infinita dello stesso esperimento a due esiti, 0 e 1. Consideriamo la variabile aleatoria X che conta il numero di tentativi necessari ad avere il primo successo. I valori che può assumere X sono $\{1, 2, 3, \dots\}$.

$$\mathcal{P}[X = n] = pq^{n-1}$$

ove $q = 1 - p$ e p è la probabilità di successo in un singolo lancio. Questa si chiama distribuzione geometrica in quanto nella legge appare una successione geometrica di ragione q .

Teorema 5.3: Attesa e varianza di una v.a. geometrica

Se X è una variabile aleatoria geometrica di parametro p , allora:

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

e

$$Var[X] = \frac{q}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

Dimostrazione. Dimostrazione dell'**attesa e varianza di una v.a. geometrica**

- Dimostriamo che $E[X] = \frac{1}{p}$

Per definizione:

$$E[X] = \sum_{n=1}^{\infty} npq^{n-1} = p \sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$

Abbiamo utilizzato la successione geometrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

la cui derivata:

$$\sum_{n=0}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

- Dimostriamo che $Var[X] = \frac{q}{p^2}$

Per definizione: $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$

$$E[X^2] = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 pq^{n-1} = p \sum_{n=1}^{\infty} n^2 q^{n-1} = p \frac{1+q}{p^3} = \frac{1+q}{p^2}$$

Sappiamo che:

$$\sum_{n=0}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

Moltiplicando per q :

$$\sum_{n=0}^{\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}$$

la cui derivata:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 q^{n-1} = \frac{(1-q)^2 + 2q(1-q)}{(1-q)^4} = \frac{(1-q)(1-q+2q)}{(1-q)^3} = \frac{1+q}{(1-q)^3}$$

Allora:

$$Var[X] = \frac{1+q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

□

Se ci troviamo di fronte a casi del tipo $P[X > n]$ allora possiamo calcolare il complementare dato da:

$$\begin{aligned} 1 - P[X \leq n] &= 1 - P[X = 1] - P[X = 2] - \dots - P[X = n] = \\ &= 1 - (p + pq + pq^2 + \dots + pq^{n-1}) = \\ &= 1 - p(1 + q + \dots + q^{n-1}) = \\ &= 1 - p \frac{1 - q^n}{1 - q} = \\ &= q^n \end{aligned}$$

Quindi:

$$P[X > n] = q^n = (1-p)^n$$

La formula usata prima usa la progressione geometrica:

$$\begin{aligned} 1 + q + q^2 + \dots + q^k &= \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q} \Rightarrow \\ &\Rightarrow (1 + q + q^2 + \dots + q^k)(1 - q) = 1 - q^{k+1} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 1 + q + q^2 + \dots + q^k - q - q^2 - \dots - q^k - q^{k+1} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

Assenza di memoria della distribuzione geometrica

La proprietà di *assenza di memoria* è una proprietà classica della distribuzione geometrica: se $k \geq 0$, allora vale che:

$$P[X > n + k \mid X > n] = P[X > k]$$

Dimostrazione. Dimostrazione dell'assenza di memoria

$$\begin{aligned} P[X > n + k \mid X > n] &= \frac{P[X > n + k \cap X > n]}{P[X > n]} = \\ &= \frac{P[X > n + k]}{P[X > n]} = \\ &= \frac{q^{n+k}}{q^n} = q^k = \\ &= P[X > k] \end{aligned}$$

□

Dunque la probabilità di dover attendere per il primo successo ancora k prova è la stessa che si avrebbe se le prime n prove senza successi non avrebbero avuto luogo. Questa proprietà è ovvia se si pensa che in uno schema a prove ripetute indipendenti i risultati delle prime prove non influiscono sulle successive; quindi se le prime n prove non hanno avuto successo la probabilità di avere successo nelle prove successive non è influenzata.

Teorema 5.4

Se X è una v.a. a valori in $\{1, 2, 3, \dots\}$ e X gode di assenza di memoria allora X è una v.a. geometrica per qualche parametro p , cioè:

$$P[X = n] = p(1 - p)^{n-1} \quad 0 < p < 1$$

Dimostrazione. Introduciamo una funzione $g(n)$ tale che:

$$g(n) = P[X > n]$$

Per la proprietà di assenza di memoria:

$$\begin{aligned} P[X > n + k \mid X > k] &= P[X > k] = g(k) = \\ &= \frac{g(n + k)}{g(n)} \Rightarrow \\ &\Rightarrow g(n + k) = g(k)g(n) \end{aligned}$$

Se consideriamo che:

$$\begin{aligned} g(1) &= q \quad 0 < q < 1 \\ g(2) &= g(1 + 1) = g(1)^2 = q^2 \end{aligned}$$

allora per induzione:

$$g(n) = q^n = P[X > n]$$

Una volta che conosciamo questa conosciamo anche:

$$P[X \leq n] = 1 - q^n$$

e

$$\begin{aligned} P[X = n] &= P[X \leq n \setminus X \leq n - 1] = \\ &= 1 - q^n - (1 - q^{n-1}) = \\ &= q^{n-1} - q^n = \\ &= q^{n-1}(1 - q) = \\ &= pq^{n-1} \end{aligned}$$

□

5.7 Funzione di ripartizione

Sia X una v.a. su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ allora la sua funzione di ripartizione:

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

è così definita:

$$F_X(t) = P[X \leq t]$$

La funzione di ripartizione è definita per ogni variabile aleatoria, discreta o no.

Esempio : Funzione di ripartizione per v.a. di Bernoulli

$$X(\omega) = 1_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in E \\ 0 & \omega \notin E \end{cases}$$

e $p = P(E)$, allora la funzione di ripartizione:

$$P[1_E \leq t] = 0 \iff t < 0$$

$$P[1_E \leq \omega] \iff 0 < \omega < 1$$

Teorema 5.5: Proprietà della funzione di ripartizione

Se X è una v.a., allora F_X ha le seguenti proprietà:

1. $F_X(t) \in [0, 1] \quad \forall t \in \mathbb{R}$
2. F_X è una funzione monotona non decrescente.
Quindi se $s \leq t \Rightarrow F_X(s) \leq F_X(t)$
3. $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$ e $\lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1$
4. F_X è continua da destra:

$$\lim_{t \rightarrow t_0^+} F_X(t) = F_X(t) \quad \forall t_0 \in \mathbb{R}$$

e $\forall t_0 > 0$

$$F_X(t_0) - \lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = P[X = t_0]$$

Dimostrazione. Dimostrazione delle **proprietà della funzione di ripartizione**

1. $F_X(t) = P[X \leq t] \in [0, 1]$
2. Consideriamo:
 - $E_t = [X \leq t]$
 - $E_s = [X \leq s]$

allora se

$$s \leq t \Rightarrow E_s \subset E_t \Rightarrow P(E_s) \leq P(E_t) \Rightarrow F_X(s) \leq F_X(t)$$

3. Dimostriamo che:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$$

Questo è vero se $\forall \{t_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ con $t_{n+1} \leq t_n$ e $t_n \downarrow -\infty$ si ha:

$$F_X(t_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Consideriamo $E_n = [X \leq t_n]$ allora $E_{n+1} \subseteq E_n$ e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(E_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = P[X = -\infty] = 0$$

questo perchè E_n è una qualsiasi successione t_n decrescente a $-\infty$.

4. • Verifichiamo:

$$\lim_{t \rightarrow t_0^+} F_X(t) = F_X(t_0)$$

Consideriamo una successione decrescente $\forall \{t_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ove $t_0 \leq t_{n+1} \leq t_n$ e $t_n \downarrow t_0$

Definiamo gli eventi $A_n = [X \leq t_n]$ e osserviamo che $E_{n+1} \subseteq E_n$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(E_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = P[X \leq t_0] = F_X(t_0)$$

Verifichiamo che:

$$[X \leq t_0] \subseteq \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} [X \leq t_n]\right)$$

ma $x \leq t_0 \Rightarrow x \leq t_n \quad \forall n$.

Quindi ora dobbiamo verificare che:

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} [X \leq t_n]\right) \subseteq [X \leq t_0]$$

quindi $x \leq t_n \Rightarrow x \leq \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t_0$

- Verifichiamo che $\forall t_0 > 0$:

$$P[X = t_0] = F_X(t_0) - \lim_{t \rightarrow t_0^-} F_X(t) = F_X(t_0) - F_X(t_0^-)$$

Consideriamo una successione crescente $\{t_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $t_n < t_{n+1} < t_0$ e $t_n \uparrow t_0$

Consideriamo $E_n = [X \leq t_n]$ e osserviamo che $E_n \subseteq E_{n+1}$.

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(E_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = P[X < t_0]$$

Quindi:

$$F_X(t_0^-) := \lim_{t \rightarrow t_0^-} F_X(t) = P[X < t_0]$$

Questo perchè:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subset [X < t_0] \Rightarrow \exists n_0 \mid X(\omega) \leq t_{n_0} < t_0$$

Ora verifichiamo che:

$$[X < t_0] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} [X \leq t_n] \Rightarrow \exists n_0 \mid X(\omega) \leq t_{n_0} < t_0$$

Possiamo decomporre l'evento $\{X \leq t_0\}$:

$$\{X \leq t_0\} = \{X < t_0\} \cup \{X = t_0\}$$

questi sono due eventi *disgiunti*, quindi:

$$P[X \leq t_0] = P[X < t_0] + P[X = t_0]$$

da cui:

$$F_X(t_0) = F_X(t_0^-) + P[X = t_0]$$

Abbiamo dimostrato quindi che:

$$P[X = t_0] = F_X(t_0) - F_X(t_0^-)$$

□

5.7.1 Esercizi sulle variabili aleatorie discrete

Esercizio 5.7.1

Traccia

Due dadi equilibrati vengono lanciati separatamente più volte. Indichiamo con X il numero di lanci necessari a ottenere 1 con il primo dado, e con Y il numero di lanci a ottenere 5 o 6 con il secondo.

1. Qual è la legge di X e Y ?
2. Consideriamo $Z = \max(X, Y)$, qual è la legge di Z ?
3. Calcolare $P[X \geq Y]$

$$1. P[X = k] = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6} \right)^{k-1}$$
$$P[Y = m] = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} \right)^{m-1}$$

X e Y sono v.a. geometriche indipendenti.

$$2. P[Z = n] = ?$$

Procediamo calcolando la funzione di ripartizione di Z

$$P[Z \leq n] = P[X \leq n \cap Y \leq n] = P[X \leq n]P[Y \leq n] = (1 - P[X > n])(1 - P[Y > n]) = (1 - (\frac{5}{6})^n)(1 - (\frac{2}{3})^n)$$

Adesso $[Z = n] = [Z \leq n] \setminus [Z \leq n - 1]$, quindi:

$$P[Z = n] = [1 - (\frac{5}{6})^n][1 - (\frac{2}{3})^n] - [1 - (\frac{5}{6})^{n-1}][1 - (\frac{2}{3})^{n-1}]$$

$$3. P[X \geq Y] = \sum_{m=1}^{\infty} P[X \geq Y \mid Y = m]P[Y = m] = \sum_{m=1}^{\infty} P[X \geq m]P[Y = m] = \sum_{m=1}^{\infty} (\frac{5}{6})^{m-1} \frac{1}{3} (\frac{2}{3})^{m-1} = \frac{1}{3} \sum_{m=1}^{\infty} (\frac{5}{9})^{m-1} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{5}{9}} = \frac{1}{3} \frac{9}{4} = \frac{3}{4}$$

Esercizio 5.7.2

Traccia

Una moneta dà testa con probabilità p e viene lanciata N volte, dove N è una v.a. di Poisson di parametro λ . Indichiamo con X e Y il numero di teste e di croci ottenute rispettivamente.

1. Calcolare le leggi di X e Y .
2. Dimostrare che X e Y sono indipendenti.

Dato che N è una v.a. di Poisson, allora:

$$P[N = n] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$$

$$\begin{aligned} 1. P[X = k] &= \sum_{n=0}^{\infty} P[X = k | N = n] P[N = n] = \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} = p^k e^{-\lambda} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{k!(n-k)!} (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} = \\ &= p^k e^{-\lambda} \frac{1}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{(n-k)!} (1-p)^{n-k} \lambda^n = p^k e^{-\lambda} \frac{1}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{(n-k)!} (1-p)^{n-k} \lambda^{n-k} \lambda^k = \\ &= \lambda^k p^k e^{-\lambda} \frac{1}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{(n-k)!} (1-p)^{n-k} \lambda^{n-k} = \\ &= \lambda^k p^k e^{-\lambda} \frac{1}{k!} e^{(1-p)\lambda} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \end{aligned}$$

In quanto:

$$P[X = k | N = n] = \begin{cases} 0 & n < k \\ \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} & n \geq k \end{cases}$$

Abbiamo trovato che $P[X = k] \sim \text{Poisson}(\lambda p)$

Quindi $Y \sim \text{Poisson}(\lambda(1-p))$

$$\begin{aligned} 2. P[X = k \cap Y = l] &= P[X = k] P[Y = l] \\ P[X = k] P[Y = l] &= \frac{e^{-\lambda} (\lambda p)^k (\lambda(1-p))^l}{k! l!} \\ P[X = k \cap Y = l] &= \sum_{n=0}^{\infty} P[X = k \cap Y = k+l | N = n] P[N = n] \\ P[X = k \cap Y = l | N = n] &\neq 0 \iff k+l = n \\ \text{Quindi: } P[X = k \cap Y = l] &= \sum_{n=0}^{\infty} P[X = k \cap Y = k+l | N = n] P[N = n] \\ &= P[X = k \cap Y = l | N = k+l] P[N = k+l] = \frac{\binom{k+l}{k} p^k (1-p)^l \lambda^k \lambda^l e^{-\lambda}}{(k+l)!} \\ \text{Confrontando otteniamo che } P[X = k \cap Y = l] &= P[X = k] P[Y = l] \end{aligned}$$

Esercizio 5.7.3

Traccia

Un giocatore gioca al lotto i numeri 1,2,3. Per aiutare la fortuna egli fa in modo di aggiungere all'urna tre palline supplementari con i numeri 1, 2, 3 quindi ora vi sono nell'urna. 93 palline).

1. Qual è la probabilità che il trucco venga scoperto?
 2. Di quanto è aumentata la sua probabilità di fare terno?
1. $E =$ "trucco viene scoperto"
 $E_1 =$ "Si ripete esattamente un solo numero"
 $E_2 =$ "Si ripete una coppia di numeri"
 $P(E) = P(E_1) + P(E_2)$
 $P(E_2) = \frac{|E_2|}{|\Omega|}$ ove $|\Omega| = \binom{93}{5}$ e $E_2 = 3 \cdot 89$
 $P(E_2) = \frac{3 \cdot 89}{\binom{93}{5}}$
 $|E_1| =$

5.8 Variabili aleatorie continue

DEFINIZIONE 5.6: VARIABILE ALEATORIA CONTINUA

Una v.a. X si dice continua se F_X è continua in $\mathbb{R}$

In generale:

$$P[a < X \leq b] = P[X \leq b] - P[X < a] = F_X(b) - F_X(a)$$

Per una variabile aleatoria continua:

$$P[a \leq X \leq b] = P[a < X \leq b]$$

Se F_X è derivabile con derivata $f_X = F'_X$ continua allora:

$$F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t) dt$$

e f_X è la *densità di probabilità* di X .

DEFINIZIONE 5.7: VARIABILE ALEATORIA ASSOLUTAMENTE CONTINUA

Una variabile aleatoria X continua si dice *assolutamente continua* se:

$$\exists f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

con $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, f è integrabile e $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$ e vale che:

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) = P[a \leq X \leq b]$$


Nota

Se $F_X \in C' \Rightarrow f = F'_X$

C' indica che è derivabile una volta e F'_X è continua.

Esempio : Densità uniforme

Sia X una v.a. che prende tutti i valori in $[a, b]$ in modo uniforme.



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases}$$

e la funzione di ripartizione:

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx = \int_{-\infty}^t \frac{1}{b-a}dx = \int_a^t \frac{1}{b-a}dx = \frac{t-a}{b-a}$$

allora:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < a \\ \frac{t-a}{b-a} & a \leq t < b \\ 1 & t \geq b \end{cases}$$

Poichè X assume valori in $[a, b]$ se $t < a$ l'evento $\{X \leq t\}$ è impossibile, nel caso in cui $a \leq t \leq b$ è l'integrale svolto precedentemente, se $t > b$ allora:

$$F_X(t) = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{b-a}{b-a} = 1$$

5.8.1 Attesa e varianza di una variabile aleatoria continua

Attesa di una v.a. continua

L'attesa di una variabile aleatoria continua è data da:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

a patto che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < \infty$$

Varianza di una v.a. continua

La varianza di una variabile aleatoria continua è data da:

$$Var[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

ove $\mu = E[X]$ ed è ancora vero che:

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

Esempio : Attesa e varianza della distribuzione uniforme

Calcoliamo l'attesa:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{1}{2} [x^2]_{x=a}^{x=b} = \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{b-a} (b^2 - a^2) = \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{1}{2} (b-a)(b+a) = \\ &= \frac{b+a}{2} \end{aligned}$$

Calcoliamo la varianza:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \\ &= \frac{1}{3} \frac{1}{b-a} [x^3]_{x=a}^{x=b} = \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{1}{3} (b^3 - a^3) = \\ &= \frac{1}{3} (b^2 + ab + a^2) \end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} Var[X] &= \frac{1}{3} (b^2 + ab + a^2) - \frac{(a+b)^2}{4} = \\ &= \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3(a^2 + b^2 + 2ab)}{12} = \\ &= \frac{b^2 + a^2 - 2ab}{12} = \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

5.9 Distribuzione esponenziale

DEFINIZIONE 5.8: DISTRIBUZIONE ESPONENZIALE

Una distribuzione esponenziale di parametro λ presenta la seguente legge:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

ove $\lambda \in \mathbb{R}^+$

La distribuzione esponenziale serve per descrivere l'andamento di eventi microscopici che sono privi di assenza di memoria a differenza di eventi macroscopici che soffrono, invece, di memoria.




Figura 5.1: Grafico della legge della distribuzione esponenziale

Notiamo dal grafico che $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Verifichiamo che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -e^{-\lambda x} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} \\ &= -(0 - 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

□

Calcoliamo la funzione di ripartizione:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = -e^{-\lambda} \left[t \right]_{t=0}^{t=x} = 1 - e^{-\lambda x}$$




Figura 5.2: Grafico della funzione di ripartizione della distribuzione esponenziale

Dal grafico notiamo che la funzione tende a 1 per valori che tendono a $+\infty$. Quindi la distribuzione esponenziale verifica tutte le proprietà delle variabili aleatorie continue.

Teorema 5.6: Proprietà di assenza della memoria per la distribuzione geometrica

Se X è una v.a con distribuzione esponenziale, allora:

$$P[X > t + s \mid X > t] = P[X > s] \quad \forall t, s \geq 0$$

Dimostrazione. Dimostrazione della proprietà di assenza della memoria per la

distribuzione geometrica

$$\begin{aligned} P[X > u] &= \int_u^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -e^{-\lambda} \left[x \right]_{x=u}^{x=+\infty} \\ &= -(-e^{-\lambda u}) \\ &= e^{-\lambda u} \end{aligned}$$

Allora adesso possiamo verificare la proprietà di assenza di memoria:

$$\begin{aligned} P[X > t + s \mid X > t] &= \frac{P[X > t + s \cap X > t]}{P[X > t]} \\ &= \frac{P[X > t + s]}{P[X > t]} \\ &= \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} \\ &= e^{-\lambda s} = P[X > s] \end{aligned}$$

Risulta così dimostrata la proprietà di assenza di memoria. $\square$

Teorema 5.7

Se X è una v.a. continua distribuita su $[0, \infty)$ che gode della proprietà di assenza di memoria allora X è esponenziale.

Dimostrazione. Cenni di dimostrazione

Definiamo la funzione:

$$G(t) = P[X > t] = 1 - P(X \leq t) = 1 - F_X(t)$$

G è una continua come funzione da $[0, \infty)$ a $\mathbb{R}$.

Inoltre:

$$\frac{G(t+s)}{G(s)} = G(t) \quad \forall t, s \geq 0$$

cioè $G(t+s) = G(t)G(s) \Rightarrow G(t) = e^{-\lambda t} \quad \forall t \geq 0$

La dimostrazione completa è lasciata come esercizio e bisogna dimostrare che $G(t) = e^{-\lambda t}$ $\square$

5.9.1 Attesa della distribuzione esponenziale

Se X è esponenziale di parametro λ , allora:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Dimostrazione. Dimostrazione del risultato dell'attesa

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -x e^{-\lambda x} \Big|_{x=0}^{x=\infty} - \int_0^{+\infty} -e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{e^{-\lambda x} \Big|_{x=0}^{x=\infty}}{-\lambda} \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

□

5.9.2 Varianza della distribuzione esponenziale

Se X è esponenziale di parametro λ , allora:

$$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Dimostrazione. Dimostrazione del risultato della varianza

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

Calcoliamo $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -e^{\lambda} \left[x \right]_{x=0}^{x=\infty} \left[x^2 \right]_{x=0}^{x=\infty} + \int_0^{+\infty} 2e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Allora:

$$\begin{aligned} Var[X] &= E[X^2] - E[X]^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} \\ &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$

□

Proposizione Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ sono v.a. esponenziali di parametro $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ e supponiamo siano indipendenti, allora:

$X = \min_{i \leq i \leq n} \{X_i\}$ è ancora esponenziale

con parametro $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$.

Dimostrazione. Verifichiamo il risultato soprastante
Vogliamo dimostrare che:

$$X = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$$

Consideriamo:

$$\begin{aligned}P[X \leq t] &= 1 - P[X > t] \\&= 1 - P[\min_{1 \leq i \leq n} X_i > t] \\&= 1 - P[X_1 > t \cap X_2 > t \cap \dots \cap X_n > t] \\&= 1 - P[X_1 > t]P[X_2 > t] \dots P[X_n > t] \\&= 1 - e^{-\lambda_1 t} \cdot e^{-\lambda_2 t} \dots e^{-\lambda_n t} \\&= 1 - e^{-t(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)}\end{aligned}$$

□

5.10 Distribuzione normale o gaussiana

DEFINIZIONE 5.9: DISTRIBUZIONE GAUSSIANA

Una distribuzione gaussiana di parametro σ e μ presenta la seguente legge:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

ove $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$ e questa è la distribuzione più importante di tutta la probabilità.




Figura 5.3: Grafico della distribuzione gaussiana

Dal grafico notiamo che $f(x) \geq 0 \quad \forall x$ e, inoltre, è verificato che:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

μ rappresenta la media di questa funzione e σ rappresenta la varianza, quindi:

$$E[X] = \mu$$

e

$$Var[X] = \sigma^2$$

ove $\sigma = \sqrt{Var[X]}$ è la deviazione standard.

Teorema 5.8: Integrale gaussiano

L'integrale gaussiano è così definito:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Dimostrazione. Verifichiamo che:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Poniamo $t = \frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}$ e $x - \mu = \sqrt{2}\sigma t$ e $dx = \sqrt{2}\sigma dt$, allora:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \sqrt{2}\sigma dt = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = 1$$

□

5.10.1 Attesa della distribuzione gaussiana

Come già detto:

$$E[X] = \mu$$

ove X è un v.a. gaussiana.

Dimostrazione. Dimostrazione dell'attesa della distribuzione gaussiana

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx + \mu \\
 &= \mu
 \end{aligned}$$

perchè:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 0$$

in quanto $\int_{-\infty}^{\infty} F(t)dt = 0 \iff F$ è integrabile e $F(-t) = -F(t)$ e possiamo sostituire $(x - \mu) = t$ $\square$

5.10.2 Varianza della distribuzione gaussiana

Come detto precedentemente:

$$Var[X] = \sigma^2$$

ove X è una v.a. gaussiana.

Dimostrazione. Dimostrazione della varianza della distribuzione gaussiana

$$Var[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Consideriamo $t = \frac{x - \mu}{\sqrt{2}\sigma}$ e $(x - \mu)^2 = 2\sigma^2 t^2$, allora:

$$\begin{aligned}
 Var[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} 2\sigma^2 t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t^2} \sqrt{2}\sigma dt \\
 &= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt \\
 &= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot t e^{-t^2} dt \\
 &= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} - \frac{1}{2} e^{-[t^2]}_{t=-\infty}^{t=\infty} [t]_{t=-\infty}^{t=\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} e^{-t^2} dt \\
 &= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi}{2} \\
 &= \sigma^2
 \end{aligned}$$

□

Se scelgo $\mu = 0$ e $\sigma = 1$ ottengo la *distribuzione normale standard*.

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

ove $\Phi(x)$ è la funzione di errore ed è la funzione di ripartizione della distribuzione normale standard.




Figura 5.4: Grafico della funzione di ripartizione della distribuzione gaussiana

5.10.3 Procedura di standardizzazione

Per le altre variabili invece, applichiamo una procedura di standardizzazione e consideriamo: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e questo indica che la v.a. X è una distribuzione gaussiana o normale di parametri μ e σ^2 , allora consideriamo la seguente v.a. :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

ove $Z \sim N(0, 1)$

Calcoliamo l'attesa di Z :

$$\begin{aligned} E[Z] &= E\left[\frac{X - \mu}{\sigma}\right] \\ &= \frac{1}{\sigma} \{E[X] - \mu\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Per quanto riguarda la varianza:

$$\begin{aligned} Var[Z] &= Var\left[\frac{X - \mu}{\sigma}\right] \\ &= \frac{1}{\sigma^2} Var[X - \mu] \\ &= \frac{Var[X]}{\sigma^2} \\ &= \frac{\sigma^2}{\sigma^2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Calcoliamo la sua funzione di ripartizione:

$$\begin{aligned} P[Z \leq t] &= P\left[\frac{X - \mu}{\sigma} \leq t\right] \\ &= P[X \leq \mu + \sigma t] \\ &= \int_{-\infty}^{\mu + \sigma t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} dx \end{aligned}$$

Consideriamo $u = \frac{x - \mu}{\sigma}$ e $x = \mu + \sigma u$ e $dx = \sigma du$, allora:

$$\begin{aligned} P[Z \leq t] &= P\left[\frac{X - \mu}{\sigma} \leq t\right] \\ &= P[X \leq \mu + \sigma t] \\ &= \int_{-\infty}^{\mu + \sigma t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{u^2}{2}} \sigma du \\ &= \Phi(t) = Err(t) \end{aligned}$$

Supponiamo $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e supponiamo di voler calcolare:

$$P[a \leq X \leq b] = P\left[\frac{a - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right] = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

e il valore di Φ è tabulata.