

Teorema

Teorema 3.1 (Convergenza in aspettativa). Posto $\alpha := 1 - \frac{\lambda}{L}$ e $\beta := \frac{\omega}{2L}$, per ogni $k \geq 0$ vale

$$\mathbb{E}[J(w_k) - J(w_*)] \leq \alpha^k \varepsilon_0 + \beta a \frac{\alpha^k - a^{-k}}{\alpha a - 1},$$

dove il rapporto va inteso nel senso dei limiti se $\alpha a = 1$. Di conseguenza, posto $\rho := \max\{\alpha, 1/a\}$, se $a > 1$ si ha $\rho < 1$ ed esiste una costante $C = C(\varepsilon_0, \omega, \lambda, L, a)$ tale che

$$\mathbb{E}[J(w_k) - J(w_*)] \leq C \rho^k \quad \forall k \geq 0.$$

Teorema 3.1 vs. Nocedal et al. (2012)

Simboli: J obiettivo, J_* minimo, ∇J gradiente; λ convessità forte, L lisciatezza; θ tolleranza; ω bound di varianza; $n_k = |\mathcal{S}_k|$ batch, $n_k = \lceil a^k \rceil$; ε accuratezza richiesta.

Aspetto	Nocedal et al. (2012)	Questa tesi (Teor. 3.1)
Stima del gradiente	$\ \nabla J\ ^2 \geq \lambda(J - J_*)$ (perde un fattore 2)	$\ \nabla J\ ^2 \geq 2\lambda(J - J_*)$ (convessità forte)
Convergenza deterministica	$1 - (1 - \theta)\lambda/(2L)$	$1 - (1 - \theta)\lambda/L$
Ricorrenza in aspettativa	$\varepsilon_{k+1} \leq (1 - \lambda/2L)\varepsilon_k + \omega/(2Ln_k)$	$\varepsilon_{k+1} \leq (1 - \lambda/L)\varepsilon_k + \omega/(2Ln_k)$
Metodo	induzione (maggiorazioni)	soluzione esatta (forma chiusa)
Tasso di convergenza ρ	$1 - \lambda/(4L)$	$1 - \lambda/L$
Intervallo per a	$1 < a \leq (1 - \lambda/4L)^{-1}$	$1 < a \leq (1 - \lambda/L)^{-1}$ (più ampio)
Costante C	$C = M_N$	$C = C(\varepsilon_0, \omega, \lambda, L, a)$, esplicita
Complessità per ε	gradienti $O(L/\lambda\varepsilon)$; lavoro $O(Lm/(\lambda\varepsilon) M_N)$	stesso ordine; lavoro $O(Lm/(\lambda\varepsilon) M_T)$, $M_T < M_N$

Note: $\Delta_0 = J(w_0) - J(w_*)$; $M_N = \max\{\Delta_0, 2\omega/\lambda\}$; $M_T = \max\{\Delta_0, \omega/\lambda\}$. Esito: tasso λ/L vs. $\lambda/(4L)$; complessità invariata.