Stati coerenti per bosoni e fermioni

Alessandro Lovo

15 giugno 2020

Luce e materia

Consideriamo l'hamiltoniana in prima quantizzazione $\hat{H}_{cl} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r})$ con autostati

$$\hat{H}_{cl} \ket{\phi_{\alpha}} = E_{\alpha} \ket{\phi_{\alpha}}$$

Una generica funzione d'onda può dunque essere espressa come $|\psi\rangle=\sum_{\alpha}c_{\alpha}\,|\phi_{\alpha}\rangle$ e si può dunque scrivere l'energia associata come

$$H = \langle \psi | \hat{H}_{cl} | \psi \rangle = \sum_{lpha} \frac{\mathcal{E}_{lpha}}{2} \left(c_{lpha} c_{lpha}^* + c_{lpha}^* c_{lpha} \right)$$

Con un procedimento simile a quello per la seconda quantizzazione del campo elettromagnetico è possibile promuovere ad operatori c_{α} , c_{α}^* e di conseguenza H, ψ .

15 giugno 2020

Operatori bosonici e fermionici

$$\begin{split} \hat{\psi} &= \sum_{\alpha} \hat{c}_{\alpha} \phi_{\alpha} \\ \hat{N}_{\alpha} &= \hat{c}_{\alpha}^{\dagger} \hat{c}_{\alpha} \\ \hat{H} &= \sum_{\alpha} \textit{E}_{\alpha} \left(\hat{N}_{\alpha} + \frac{1}{2} \right) \approx \sum_{\alpha} \textit{E}_{\alpha} \hat{N}_{\alpha} \end{split}$$

Nel caso di bosoni

$$[\hat{c}_{\alpha}, \hat{c}^{\dagger}_{\beta}] = \delta_{\alpha\beta}, \, [\hat{c}_{\alpha}, \hat{c}_{\beta}] = [\hat{c}^{\dagger}_{\alpha}, \hat{c}^{\dagger}_{\beta}] = 0, \, \sigma(\hat{N}_{\alpha}) = \mathbb{N}$$

mentre nel caso di fermioni

$$\{\hat{c}_{lpha},\hat{c}^{\dagger}_{eta}\}=\delta_{lphaeta},\,\{\hat{c}_{lpha},\hat{c}_{eta}\}=\{\hat{c}^{\dagger}_{lpha},\hat{c}^{\dagger}_{eta}\}=0,\,\sigma(\hat{N}_{lpha})=\{0,1\}$$

Stati numero e stati coerenti

Come nel caso della luce gli operatori $\hat{c}_{\alpha}, \hat{c}_{\alpha}^{\dagger}$ rispettivamente distruggono e creano una particella nello stato ϕ_{α} agendo sullo spazio di Fock in rappresentazione di numero:

$$\hat{N}_{\alpha} | \dots n_{\alpha} \dots \rangle = n_{\alpha} | \dots n_{\alpha} \dots \rangle$$

Viene dunque spontaneo chiedersi se anche per la materia sia possibile avere degli stati coerenti, ossia autostati dell'operatore di annichilazione in cui il numero di particelle non sia fissato

$$\hat{c}_{\alpha} \ket{c_{\alpha}} = c_{\alpha} \ket{c_{\alpha}}$$

Bosoni

Nel caso di particelle bosoniche non c'è limite al numero di particelle che occupino un singolo stato e infatti con la condensazione di Bose-Einstein occupano tutte lo stato ad energia inferiore ϕ_0 . Inoltre poichè le regole di commutazione sono le stesse della luce è immediato esprimere lo stato coerente come

$$|c\rangle_{\alpha} = e^{-|c_{\alpha}|^{2}/2} \sum_{n_{\alpha}=0}^{\infty} \frac{c_{\alpha}}{\sqrt{n_{\alpha}!}} |n_{\alpha}\rangle$$

dove $\overline{N}=|c_{\alpha}|^2$ rappresenta il numero medio di bosoni nello stato ϕ_{α} . Analogamente al caso della luce la fluttuazione di $\hat{\psi}$ (che corrisponde al campo elettrico) calcolata sullo stato coerente è la stessa di quella sullo stato di vuoto.

Fermioni

Nel caso di fermioni la situazione è più complicata poiché ogni stato ϕ_{α} può contenere al massimo una particella. Questo altro non è che il principio di esclusione di Pauli che in seconda quantizzazione può essere formulato come $(\hat{c}_{\alpha}^{\dagger})^2 |0\rangle = 0$.

Ciononostante è comunque possibile definire lo stato coerente come autosatato dell'operatore di annichilazione

$$\left|\hat{c}_{lpha}\left|c_{lpha}
ight
angle = c_{lpha}\left|c_{lpha}
ight
angle,\,\left\langle c_{lpha}
ight|\hat{c}_{lpha}^{\dagger} = ar{c}_{lpha}\left\langle c_{lpha}
ight|$$

Tuttavia a causa delle regole di anticommutazione c_{α} , \bar{c}_{α} non sono numeri complessi bensì numeri di Grassmann.

$$c_{\alpha}^2 = \bar{c}_{\alpha}^2 = 0, \ c_{\alpha}\bar{c}_{\alpha} + \bar{c}_{\alpha}c_{\alpha} = 1$$

Campi 'classici'

Gli stati coerenti possono essere usati come ponte per ottenere l'analogo 'classico' del campo di materia $\hat{\psi}$:

$$\begin{split} \hat{\psi} &= \sum_{\alpha} \phi_{\alpha} \hat{c}_{\alpha} \, \rightarrow \, \psi = \sum_{\alpha} \phi_{\alpha} c_{\alpha} \\ \hat{\psi} \left| \psi \right\rangle &= \psi \left| \psi \right\rangle \\ \left| \psi \right\rangle &= \bigotimes_{\alpha} \left| c_{\alpha} \right\rangle, \, \hat{c}_{\alpha} \left| c_{\alpha} \right\rangle = c_{\alpha} \left| c_{\alpha} \right\rangle \end{split}$$

Nel caso di bosoni ψ sarà un campo complesso, mentre nel caso di fermioni un campo di Grassmann.