

# Preuves en logique du premier ordre

David Delahaye

Faculté des Sciences  
[David.Delahaye@lirmm.fr](mailto:David.Delahaye@lirmm.fr)

Master M1 2020-2021

# Logique du premier ordre

## Définitions préliminaires

- $\mathcal{V} \equiv$  ensemble de variables d'individu  $x, y$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{F}} \equiv$  ensemble de symboles de fonctions  $f, g$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{P}} \equiv$  ensemble de symboles de prédicats  $P, Q$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{F}} \cap \mathcal{S}_{\mathcal{P}} = \emptyset$  ;
- Arité  $m : \mathcal{S}_{\mathcal{F}} \cup \mathcal{S}_{\mathcal{P}} \rightarrow \mathbb{N}$ .

## Termes du premier ordre

- Plus petit ensemble  $\mathcal{T}$  t.q. :
  - ▶ Si  $x \in \mathcal{V}$  alors  $x \in \mathcal{T}$  ;
  - ▶ Si  $f \in \mathcal{S}_{\mathcal{F}}$  d'arité  $n$  et  $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}$ , alors  $f(t_1, \dots, t_n) \in \mathcal{T}$ .

# Logique du premier ordre

## Définitions préliminaires

- $\mathcal{V} \equiv$  ensemble de variables d'individu  $x, y$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{F}} \equiv$  ensemble de symboles de fonctions  $f, g$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{P}} \equiv$  ensemble de symboles de prédicats  $P, Q$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{F}} \cap \mathcal{S}_{\mathcal{P}} = \emptyset$  ;
- Arité  $m : \mathcal{S}_{\mathcal{F}} \cup \mathcal{S}_{\mathcal{P}} \rightarrow \mathbb{N}$ .

## Formules du premier ordre

- Plus petit ensemble  $\mathcal{F}$  t.q. :
  - ▶ Si  $P \in \mathcal{S}_{\mathcal{P}}$  d'arité  $n$  et  $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}$ , alors  $P(t_1, \dots, t_n) \in \mathcal{F}$  ;
  - ▶  $\perp, \top \in \mathcal{F}$  ;
  - ▶ Si  $\Phi \in \mathcal{F}$  alors  $\neg \Phi \in \mathcal{F}$  ;
  - ▶ Si  $\Phi, \Phi' \in \mathcal{F}$  alors  $\Phi \wedge \Phi', \Phi \vee \Phi', \Phi \Rightarrow \Phi', \Phi \Leftrightarrow \Phi' \in \mathcal{F}$  ;
  - ▶ Si  $x \in \mathcal{V}$  et  $\Phi \in \mathcal{F}$ , alors  $\forall x. \Phi, \exists x. \Phi \in \mathcal{F}$ .

# Logique du premier ordre

## Associativité des connecteurs

- $\wedge$ ,  $\vee$ , et  $\Leftrightarrow$  associent à gauche :
  - ▶  $A \wedge B \wedge C \equiv (A \wedge B) \wedge C$ .
- $\Rightarrow$  associe à droite :
  - ▶  $A \Rightarrow B \Rightarrow C \equiv A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$ .

## Précédence des connecteurs

- On a la précédence suivante :  $\neg \succ \wedge \succ \vee \succ \Rightarrow \succ \Leftrightarrow$  ;
- Exemples :
  - ▶  $A \wedge B \Rightarrow C \equiv (A \wedge B) \Rightarrow C$  ;
  - ▶  $A \wedge \neg B \vee C \Rightarrow D \equiv ((A \wedge \neg B) \vee C) \Rightarrow D$  ;
  - ▶  $A \Rightarrow B \Leftrightarrow C \wedge D \equiv (A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (C \wedge D)$ .

## Notation pointée pour les quantificateurs

- La portée d'un quantificateur va jusqu'à la parenthèse fermante de la formule du quantificateur ;
- Si la formule du quantificateur n'est pas parenthésée, la portée du quantificateur va jusqu'à la fin de la formule ;
- Donc, si on veut arrêter la portée d'un quantificateur, il suffit d'utiliser des parenthèses pour limiter explicitement la portée du quantificateur ;
- Exemple :
  - ▶  $\exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b) \equiv \exists x.(P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b))$  ;
  - ▶ Si on veut que le  $\exists$  ne porte que sur  $P(x)$ , on doit écrire :  
 $(\exists x.P(x)) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$ .
- Notation :  $\forall x, y. \Phi \equiv \forall x. \forall y. \Phi$  (idem pour  $\exists$ ).

## Logique classique

- Une formule est toujours vraie ou fausse ;
- Que je puisse en démontrer la validité ou non ;
- Logique bi-valuée (vrai, faux) ;
- Logique du « tiers exclu » :  $A \vee \neg A$ .

## Logique intuitionniste ou constructive

- Une formule est vraie, fausse, ou « on ne sait pas » ;
- Si on ne sait en démontrer la validité, alors « on ne sait pas » ;
- Logique tri-valuée d'une certaine manière ;
- Le « tiers exclu » n'est pas admis dans cette logique.

# Systèmes de preuves

## Plusieurs systèmes

- Systèmes à la Frege-Hilbert ;
- Systèmes à la Gentzen :
  - ▶ Dédution naturelle ;
  - ▶ Calcul des séquents.

## Adéquation vis-à-vis de la sémantique

- Correction et complétude par rapport à la sémantique ;
- Correction : si je trouve une preuve de  $P$  alors  $P$  est vraie ;
- Complétude : si  $P$  est vraie alors il existe une preuve de  $P$  ;
- Preuve  $\equiv$  moyen syntaxique de vérifier la validité d'une formule.

# Calcul des séquents intuitionniste (LJ)

## Règles

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash A} \text{ax}$$

$$\frac{\Gamma, A, A \vdash B}{\Gamma, A \vdash B} \text{cont}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \Rightarrow B \vdash C} \Rightarrow_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \Rightarrow_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \Leftrightarrow B \vdash C} \Leftrightarrow_{\text{left1}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash B \quad \Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \Leftrightarrow B \vdash C} \Leftrightarrow_{\text{left2}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma, B \vdash A}{\Gamma \vdash A \Leftrightarrow B} \Leftrightarrow_{\text{right}}$$



# Calcul des séquents intuitionniste (LJ)

## Règles

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \wedge_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \wedge_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vee B \vdash C} \vee_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee_{\text{right1}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee_{\text{right2}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, \neg A \vdash B} \neg_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} \neg_{\text{right}}$$

$$\frac{}{\Gamma, \perp \vdash A} \perp_{\text{left}}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \top} \top_{\text{right}}$$

# Calcul des séquents intuitionniste (LJ)

## Règles

$$\frac{\Gamma, A(t) \vdash B}{\Gamma, \forall x. A(x) \vdash B} \forall_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(x)}{\Gamma \vdash \forall x. A(x)} \forall_{\text{right}}, x \notin \Gamma$$

$$\frac{\Gamma, A(x) \vdash B}{\Gamma, \exists x. A(x) \vdash B} \exists_{\text{left}}, x \notin \Gamma, B$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(t)}{\Gamma \vdash \exists x. A(x)} \exists_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash B} \text{cut}$$

# Calcul des séquents classique ( $\text{LJ}_{\text{em}}$ )

## Règles

$$\frac{\Gamma, A(t) \vdash B}{\Gamma, \forall x. A(x) \vdash B} \forall_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(x)}{\Gamma \vdash \forall x. A(x)} \forall_{\text{right}}, x \notin \Gamma$$

$$\frac{\Gamma, A(x) \vdash B}{\Gamma, \exists x. A(x) \vdash B} \exists_{\text{left}}, x \notin \Gamma, B$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(t)}{\Gamma \vdash \exists x. A(x)} \exists_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash B} \text{cut}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg A}{\Gamma \vdash A} \text{em}$$

# Calcul des séquents classique (LK)

## Règles

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash \Delta, A} \text{ ax}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, B} \text{ cut}$$

$$\frac{\Gamma, A, A \vdash \Delta}{\Gamma, A \vdash \Delta} \text{ cont}_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, A}{\Gamma \vdash \Delta, A} \text{ cont}_{\text{right}}$$

# Calcul des séquents classique (LK)

## Règles

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \Rightarrow B \vdash \Delta} \Rightarrow_{\text{left}} \qquad \frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \Rightarrow B} \Rightarrow_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B \quad \Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \Leftrightarrow B \vdash \Delta} \Leftrightarrow_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B \quad \Gamma, B \vdash \Delta, A}{\Gamma \vdash \Delta, A \Leftrightarrow B} \Leftrightarrow_{\text{right}}$$

# Calcul des séquents classique (LK)

## Règles

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta} \wedge_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B} \wedge_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta} \vee_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B} \vee_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta} \neg_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A} \neg_{\text{right}}$$

$$\frac{}{\Gamma, \perp \vdash \Delta} \perp_{\text{left}}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \Delta, \top} \top_{\text{right}}$$

# Calcul des séquents classique (LK)

## Règles

$$\frac{\Gamma, A(t) \vdash \Delta}{\Gamma, \forall x.A(x) \vdash \Delta} \forall_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A(x)}{\Gamma \vdash \Delta, \forall x.A(x)} \forall_{\text{right}}, x \notin \Gamma, \Delta$$

$$\frac{\Gamma, A(x) \vdash \Delta}{\Gamma, \exists x.A(x) \vdash \Delta} \exists_{\text{left}}, x \notin \Gamma, \Delta$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A(t)}{\Gamma \vdash \Delta, \exists x.A(x)} \exists_{\text{right}}$$

# Exemple de preuve propositionnelle dans LJ/LK

## Une preuve simple

▸ Règles LJ

$$A, B \vdash A \quad A, B \vdash B$$

$$A, B \vdash A \wedge B$$

$$A \vdash B \Rightarrow A \wedge B$$

$$\vdash A \Rightarrow B \Rightarrow A \wedge B$$



# Exemple de preuve propositionnelle dans LJ/LK

## Une preuve simple

▸ Règles LJ

$$\frac{\begin{array}{c} A, B \vdash A \quad A, B \vdash B \\ A, B \vdash A \wedge B \\ A \vdash B \Rightarrow A \wedge B \end{array}}{\vdash A \Rightarrow B \Rightarrow A \wedge B} \Rightarrow_{\text{right}}$$

# Exemple de preuve propositionnelle dans LJ/LK

## Une preuve simple

▸ Règles LJ

$$\frac{\frac{A, B \vdash A \quad A, B \vdash B}{A, B \vdash A \wedge B} \Rightarrow_{\text{right}}}{\frac{A \vdash B \Rightarrow A \wedge B}{\vdash A \Rightarrow B \Rightarrow A \wedge B} \Rightarrow_{\text{right}}}$$

# Exemple de preuve propositionnelle dans LJ/LK

## Une preuve simple

▸ Règles LJ

$$\frac{\frac{\frac{A, B \vdash A \quad A, B \vdash B}{A, B \vdash A \wedge B} \wedge_{\text{right}}}{A \vdash B \Rightarrow A \wedge B} \Rightarrow_{\text{right}}}{\vdash A \Rightarrow B \Rightarrow A \wedge B} \Rightarrow_{\text{right}}$$

# Exemple de preuve propositionnelle dans LJ/LK

## Une preuve simple

▸ Règles LJ

$$\frac{\frac{\frac{}{A, B \vdash A} \text{ax} \quad A, B \vdash B}{A, B \vdash A \wedge B} \wedge_{\text{right}}}{\frac{A \vdash B \Rightarrow A \wedge B}{\vdash A \Rightarrow B \Rightarrow A \wedge B} \Rightarrow_{\text{right}}} \Rightarrow_{\text{right}}$$

# Exemple de preuve propositionnelle dans LJ/LK

## Une preuve simple

▸ Règles LJ

$$\frac{\frac{\frac{\overline{A, B \vdash A} \text{ ax} \quad \overline{A, B \vdash B} \text{ ax}}{A, B \vdash A \wedge B} \wedge_{\text{right}}}{A \vdash B \Rightarrow A \wedge B} \Rightarrow_{\text{right}}}{\vdash A \Rightarrow B \Rightarrow A \wedge B} \Rightarrow_{\text{right}}$$

# Exemple de preuve au premier ordre dans LJ/LK

## Négation et quantificateurs

### ▸ Règles LJ

$$\begin{aligned} &P(x) \vdash P(x) \\ &P(x) \vdash \exists x.P(x) \\ &\neg \exists x.P(x), P(x) \vdash \perp \\ &\neg \exists x.P(x) \vdash \neg P(x) \\ &\neg \exists x.P(x) \vdash \forall x.\neg P(x) \\ &\vdash \neg(\exists x.P(x)) \Rightarrow \forall x.\neg P(x) \end{aligned}$$

# Exemple de preuve au premier ordre dans LJ/LK

## Négation et quantificateurs

### ▸ Règles LJ

$$P(x) \vdash P(x)$$

$$P(x) \vdash \exists x.P(x)$$

$$\neg \exists x.P(x), P(x) \vdash \perp$$

$$\neg \exists x.P(x) \vdash \neg P(x)$$

$$\frac{\neg \exists x.P(x) \vdash \forall x.\neg P(x)}{\vdash \neg(\exists x.P(x)) \Rightarrow \forall x.\neg P(x)} \Rightarrow_{\text{right}}$$

# Exemple de preuve au premier ordre dans LJ/LK

## Négation et quantificateurs

### ▸ Règles LJ

$$\begin{array}{c} P(x) \vdash P(x) \\ P(x) \vdash \exists x.P(x) \\ \neg \exists x.P(x), P(x) \vdash \perp \\ \hline \neg \exists x.P(x) \vdash \neg P(x) \\ \hline \neg \exists x.P(x) \vdash \forall x.\neg P(x) \quad \forall_{\text{right}} \\ \hline \vdash \neg(\exists x.P(x)) \Rightarrow \forall x.\neg P(x) \quad \Rightarrow_{\text{right}} \end{array}$$



# Exemple de preuve au premier ordre dans LJ/LK

## Négation et quantificateurs

### ▸ Règles LJ

$$\begin{array}{c} P(x) \vdash P(x) \\ P(x) \vdash \exists x.P(x) \\ \hline \frac{\neg \exists x.P(x), P(x) \vdash \perp}{\neg \exists x.P(x) \vdash \neg P(x)} \neg_{\text{right}} \\ \hline \frac{\neg \exists x.P(x) \vdash \neg P(x)}{\neg \exists x.P(x) \vdash \forall x.\neg P(x)} \forall_{\text{right}} \\ \hline \vdash \neg(\exists x.P(x)) \Rightarrow \forall x.\neg P(x) \Rightarrow_{\text{right}} \end{array}$$

# Exemple de preuve au premier ordre dans LJ/LK

## Négation et quantificateurs

### ▸ Règles LJ

$$\begin{array}{c} P(x) \vdash P(x) \\ \hline P(x) \vdash \exists x.P(x) \\ \hline \neg \exists x.P(x), P(x) \vdash \perp \quad \neg_{\text{left}} \\ \hline \neg \exists x.P(x) \vdash \neg P(x) \quad \neg_{\text{right}} \\ \hline \neg \exists x.P(x) \vdash \forall x.\neg P(x) \quad \forall_{\text{right}} \\ \hline \vdash \neg(\exists x.P(x)) \Rightarrow \forall x.\neg P(x) \quad \Rightarrow_{\text{right}} \end{array}$$

# Exemple de preuve au premier ordre dans LJ/LK

## Négation et quantificateurs

### ► Règles LJ

$$\frac{\frac{\frac{P(x) \vdash P(x)}{P(x) \vdash \exists x.P(x)} \exists_{\text{right}}}{\neg \exists x.P(x), P(x) \vdash \perp} \neg_{\text{left}}}{\neg \exists x.P(x) \vdash \neg P(x)} \neg_{\text{right}} \quad \frac{\neg \exists x.P(x) \vdash \neg P(x)}{\neg \exists x.P(x) \vdash \forall x.\neg P(x)} \forall_{\text{right}} \quad \frac{\neg \exists x.P(x) \vdash \forall x.\neg P(x)}{\vdash \neg(\exists x.P(x)) \Rightarrow \forall x.\neg P(x)} \Rightarrow_{\text{right}}$$

# Exemple de preuve au premier ordre dans LJ/LK

## Négation et quantificateurs

► Règles LJ

$$\frac{\frac{\frac{\overline{P(x) \vdash P(x)}}{P(x) \vdash \exists x.P(x)} \text{ax}}{\neg \exists x.P(x), P(x) \vdash \perp} \exists_{\text{right}}}{\neg \exists x.P(x) \vdash \neg P(x)} \neg_{\text{left}} \quad \neg_{\text{right}} \quad \forall_{\text{right}} \quad \Rightarrow_{\text{right}}$$
$$\frac{\neg \exists x.P(x) \vdash \forall x.\neg P(x)}{\vdash \neg(\exists x.P(x)) \Rightarrow \forall x.\neg P(x)}$$

# Logiques classique/intuitionniste

## Sémantique du « il existe »

- En logique classique :  $\exists x.P(x) \equiv$  il existe  $n$  termes  $t_1, t_2, \dots, t_n$  tels que  $P(t_1) \vee P(t_2) \vee \dots \vee P(t_n)$  est vraie (théorème de Herbrand) ;
- En logique intuitionniste :  $\exists x.P(x) \equiv$  il existe un terme  $t$  tel que  $P(t)$  est vraie.

On doit construire un témoin  $t$  qui vérifie  $P$  et en avoir l'intuition.  
D'où le nom de logique « intuitionniste » ou « constructive ».

## Logique classique

- La logique classique est une logique assez « exotique » ;
- On peut démontrer une formule  $\exists x.P(x)$  sans jamais montrer un seul témoin qui fonctionne (c'est-à-dire qui vérifie  $P$ ) !
- De ce fait, c'est plus facile de faire des preuves en logique classique qu'en logique intuitionniste.

# Exemple de preuve en logique classique

## Petit théorème mathématique

- Il existe  $a$  et  $b$  irrationnels tels que  $a^b$  est rationnel ;
- Preuve :
  - ▶ Utilisation du tiers exclu :  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  est rationnel ou non ; deux cas :
    - ★ Si  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  est rationnel, alors le théorème est vrai ;
    - ★ Si  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  est irrationnel, alors  $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$ , qui est rationnel.

## En logique intuitionniste

- Le théorème est vrai en logique intuitionniste ;
- Mais on doit montrer un  $a$  et  $b$  qui fonctionnent ;
- Plusieurs pages de théorie des nombres non triviales !

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

Démontrer :  $\exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$ .

Cette formule est-elle valide ?

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

### ▸ Règles LK

$$\begin{array}{l} \Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b) \quad \Gamma \vdash P(b), P(a) \wedge P(b) \\ \Gamma = P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b) \\ P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b) \\ P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b) \\ \vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b) \\ \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b) \\ \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b) \end{array}$$



# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

### ▸ Règles LK

$$\Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b) \quad \Gamma \vdash P(b), P(a) \wedge P(b)$$

$$\Gamma = P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)$$

$$P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$$

$$P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$$

$$\vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$$

$$\frac{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \text{cont}_{\text{right}}$$

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

### ▸ Règles LK

$$\Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b) \quad \Gamma \vdash P(b), P(a) \wedge P(b)$$

$$\Gamma = P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)$$

$$P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$$

$$P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$$

$$\vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$$

$$\frac{\vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}$$
$$\frac{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \text{cont}_{\text{right}}$$

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

### ▸ Règles LK

$$\Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b) \quad \Gamma \vdash P(b), P(a) \wedge P(b)$$

$$\Gamma = P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)$$

$$P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$$

$$P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$$

$$\frac{\vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}}$$

$$\frac{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}$$

$$\frac{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \text{cont}_{\text{right}}$$

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

### ► Règles LK

$$\Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b) \quad \Gamma \vdash P(b), P(a) \wedge P(b)$$

$$\Gamma = P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)$$

$$P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$$

$$\frac{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}$$

$$\frac{\vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}}$$

$$\frac{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}} \text{ cont}_{\text{right}}$$

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

### ► Règles LK

$$\begin{array}{c} \Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b) \quad \Gamma \vdash P(b), P(a) \wedge P(b) \\ \hline \frac{\Gamma = P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)}{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}} \\ \hline \frac{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}} \\ \hline \frac{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}} \\ \hline \frac{\vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}} \\ \hline \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b) \quad \text{cont}_{\text{right}} \end{array}$$

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

### ► Règles LK

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b)}{\Gamma = P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)}{\Rightarrow_{\text{right}}} \quad \frac{\Gamma \vdash P(b), P(a) \wedge P(b)}{\wedge_{\text{right}}}}{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \quad \exists_{\text{right}}}{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}}}{\vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \text{cont}_{\text{right}}}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}$$

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

### ► Règles LK

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b)}{\Gamma \vdash P(a), P(b)} \text{ ax}}{\Gamma \vdash P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)} \text{ } \wedge_{\text{right}}}{\Gamma \vdash P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}}}{\Gamma \vdash P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}}{\Gamma \vdash P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x. P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}}}{\Gamma \vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x. P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}}{\Gamma \vdash \exists x. P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x. P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \text{cont}_{\text{right}}}{\Gamma \vdash \exists x. P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}$$

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

### ► Règles LK

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b)}{\Gamma \vdash P(a), P(b)} \text{ ax}}{\Gamma = P(a), P(b)} \text{ ax}}{\Gamma = P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)} \wedge_{\text{right}}}{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}}}{P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}}{\vdash P(a) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}}}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \text{cont}_{\text{right}}$$



# Une preuve classique un peu plus complexe

## Paradoxe (pas si paradoxal) des buveurs

Énoncé : « Il y a quelqu'un dans un bar tel que, s'il boit alors tout le monde dans le bar boit ».

$$\begin{aligned} P(x), P(y) &\vdash P(y), \forall y.P(y) \\ P(x) &\vdash P(y), P(y) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ P(x) &\vdash P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ P(x) &\vdash \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ &\vdash P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ &\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ &\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \end{aligned}$$

# Une preuve classique un peu plus complexe

## Paradoxe (pas si paradoxal) des buveurs

Énoncé : « Il y a quelqu'un dans un bar tel que, s'il boit alors tout le monde dans le bar boit ».

► Règles LK

$$\begin{array}{l} P(x), P(y) \vdash P(y), \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash P(y), P(y) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \vdash P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \end{array}$$

# Une preuve classique un peu plus complexe

## Paradoxe (pas si paradoxal) des buveurs

Énoncé : « Il y a quelqu'un dans un bar tel que, s'il boit alors tout le monde dans le bar boit ».

► Règles LK

$$\begin{array}{c} P(x), P(y) \vdash P(y), \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash P(y), P(y) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \vdash P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \hline \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \end{array} \text{cont}_{\text{right}}$$
$$\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)$$

# Une preuve classique un peu plus complexe

## Paradoxe (pas si paradoxal) des buveurs

Énoncé : « Il y a quelqu'un dans un bar tel que, s'il boit alors tout le monde dans le bar boit ».

► Règles LK

$$\begin{array}{c} P(x), P(y) \vdash P(y), \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash P(y), P(y) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \hline \vdash P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \hline \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \hline \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \exists_{\text{right}} \\ \text{cont}_{\text{right}} \end{array}$$

# Une preuve classique un peu plus complexe

## Paradoxe (pas si paradoxal) des buveurs

Énoncé : « Il y a quelqu'un dans un bar tel que, s'il boit alors tout le monde dans le bar boit ».

► Règles LK

$$\begin{array}{c} P(x), P(y) \vdash P(y), \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash P(y), P(y) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \hline \frac{P(x) \vdash \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)}{\vdash P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \Rightarrow_{\text{right}} \\ \hline \frac{\vdash P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \exists_{\text{right}} \\ \hline \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \quad \text{cont}_{\text{right}} \end{array}$$

# Une preuve classique un peu plus complexe

## Paradoxe (pas si paradoxal) des buveurs

Énoncé : « Il y a quelqu'un dans un bar tel que, s'il boit alors tout le monde dans le bar boit ».

► Règles LK

$$\begin{array}{c} P(x), P(y) \vdash P(y), \forall y.P(y) \\ P(x) \vdash P(y), P(y) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \hline P(x) \vdash P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \\ \hline P(x) \vdash \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \quad \forall_{\text{right}} \\ \hline \vdash P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \quad \Rightarrow_{\text{right}} \\ \hline \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \quad \exists_{\text{right}} \\ \hline \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y) \quad \text{cont}_{\text{right}} \end{array}$$

# Une preuve classique un peu plus complexe

## Paradoxe (pas si paradoxal) des buveurs

Énoncé : « Il y a quelqu'un dans un bar tel que, s'il boit alors tout le monde dans le bar boit ».

► Règles LK

$$\frac{\frac{\frac{P(x), P(y) \vdash P(y), \forall y.P(y)}{P(x) \vdash P(y), P(y) \Rightarrow \forall y.P(y)} \quad \exists_{\text{right}}}{P(x) \vdash P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \quad \forall_{\text{right}}}{P(x) \vdash \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \quad \Rightarrow_{\text{right}}}{\vdash P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \quad \exists_{\text{right}}}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \quad \text{cont}_{\text{right}}}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)}$$

# Une preuve classique un peu plus complexe

## Paradoxe (pas si paradoxal) des buveurs

Énoncé : « Il y a quelqu'un dans un bar tel que, s'il boit alors tout le monde dans le bar boit ».

► Règles LK

$$\frac{\frac{\frac{P(x), P(y) \vdash P(y), \forall y.P(y)}{P(x) \vdash P(y), P(y) \Rightarrow \forall y.P(y)} \Rightarrow_{\text{right}}}{P(x) \vdash P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \exists_{\text{right}}}{P(x) \vdash \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \forall_{\text{right}}}{\vdash P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \Rightarrow_{\text{right}}}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y), \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \exists_{\text{right}}}{\vdash \exists x.P(x) \Rightarrow \forall y.P(y)} \text{cont}_{\text{right}}$$





# Exercices en logique propositionnelle

## Propositions à démontrer dans LJ et LK

- ❶  $A \Rightarrow B \Rightarrow A$
- ❷  $(A \Rightarrow B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow B) \Rightarrow A \Rightarrow C$
- ❸  $A \wedge B \Rightarrow B$
- ❹  $B \Rightarrow A \vee B$
- ❺  $(A \vee B) \Rightarrow (A \Rightarrow C) \Rightarrow (B \Rightarrow C) \Rightarrow C$
- ❻  $A \Rightarrow \perp \Rightarrow \neg A$
- ❼  $\perp \Rightarrow A$
- ❽  $(A \Leftrightarrow B) \Rightarrow A \Rightarrow B$
- ❾  $(A \Leftrightarrow B) \Rightarrow B \Rightarrow A$
- ❿  $(A \Rightarrow B) \Rightarrow (B \Rightarrow A) \Rightarrow (A \Leftrightarrow B)$

# Exercices en logique du premier ordre

## Propositions à démontrer dans $LJ_{(em)}$ et LK

- ❶  $\forall x.P(x) \Rightarrow \exists y.P(y) \vee Q(y)$
- ❷  $(\exists x.P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow (\exists x.P(x)) \vee (\exists x.Q(x))$
- ❸  $(\forall x.P(x)) \wedge (\forall x.Q(x)) \Rightarrow \forall x.P(x) \wedge Q(x)$
- ❹  $(\forall x.P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\forall x.P(x)) \wedge (\forall x.Q(x))$
- ❺  $(\forall x.\neg P(x)) \Rightarrow \neg(\exists x.P(x))$
- ❻  $\neg(\forall x.P(x)) \Rightarrow \exists x.\neg P(x)$

# Outil d'aide à la preuve Coq

## Caractéristiques

- Développement par l'équipe Inria  $\pi r^2$  ;
- Preuve de programmes fonctionnels ;
- Théorie des types (calcul des constructions inductives) ;
- Isomorphisme de Curry-Howard (objets preuves).

## Implantation

- Premières versions milieu des années 80 ;
- Implantation actuelle en OCaml ;
- Preuve interactive (peu d'automatisation) ;
- En ligne de commande ou avec l'interface graphique CoqIDE ;
- Installation : <https://coq.inria.fr/>.

# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Implication :

```
Coq < Parameter A : Prop.
```

```
A is assumed
```

```
Coq < Goal A -> A.
```

```
1 subgoal
```

```
=====
```

```
A -> A
```

# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Implication :

```
Coq < intro.
```

```
1 subgoal
```

```
H : A
```

```
=====
```

```
A
```

## Exemples de preuves

- Implication :

```
Coq < assumption.
```

```
No more subgoals.
```

```
Coq < Save my_thm.
```

```
intro.
```

```
assumption.
```

```
my_thm is defined
```

# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Application (modus ponens) :

```
Coq < Parameters A B : Prop.
```

```
A is assumed
```

```
B is assumed
```

```
Coq < Goal (A -> B) -> A -> B.
```

```
1 subgoal
```

```
=====
```

```
(A -> B) -> A -> B
```



# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Application (modus ponens) :

```
Coq < intros.
```

```
1 subgoal
```

```
H : A -> B
```

```
H0 : A
```

```
=====
```

```
B
```

```
Coq < apply (H H0).
```

```
No more subgoals.
```

## Exemples de preuves

- Connecteurs  $\wedge$  et  $\vee$  :

```
Coq < Parameters A B : Prop.
```

```
A is assumed
```

```
B is assumed
```

```
Coq < Goal A /\ B -> A.
```

```
1 subgoal
```

```
=====
```

```
A /\ B -> A
```

# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Connecteurs  $\wedge$  et  $\vee$  :

```
Coq < intro.
```

```
1 subgoal
```

```
H : A /\ B
```

```
=====
```

```
A
```

# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Connecteurs  $\wedge$  et  $\vee$  :

```
Coq < elim H.
```

```
1 subgoal
```

```
H : A /\ B
```

```
=====
```

```
A -> B -> A
```

# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Connecteurs  $\wedge$  et  $\vee$  :

```
Coq < intros.
```

```
1 subgoal
```

```
H : A /\ B
```

```
H0 : A
```

```
H1 : B
```

```
=====
```

```
A
```

```
Coq < assumption.
```

```
No more subgoals.
```

# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Connecteurs  $\wedge$  et  $\vee$  :

```
Coq < Parameters A B : Prop.
```

```
A is assumed
```

```
B is assumed
```

```
Coq < Goal A -> A  $\vee$  B.
```

```
1 subgoal
```

```
=====
```

```
A -> A  $\vee$  B
```

# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Connecteurs  $\wedge$  et  $\vee$  :

Coq < intro.

1 subgoal

H : A

=====

A  $\vee$  B

## Exemples de preuves

- Connecteurs  $\wedge$  et  $\vee$  :

```
Coq < left.
```

```
1 subgoal
```

```
H : A
```

```
=====
```

```
A
```

```
Coq < assumption.
```

```
No more subgoals.
```



# Logique propositionnelle

## Exemples de preuves

- Connecteurs  $\neg$  :

```
Coq < Parameters A B : Prop.
```

```
A is assumed
```

```
B is assumed
```

```
Coq < Goal A -> ~A -> False.
```

```
1 subgoal
```

```
=====
```

```
A -> ~ A -> False
```

## Exemples de preuves

- Connecteurs  $\neg$  :

```
Coq < intros.
```

```
1 subgoal
```

```
H : A
```

```
H0 : ~ A
```

```
=====
```

```
False
```

```
Coq < apply (H0 H).
```

```
No more subgoals.
```

## Propositions à démontrer en Coq

- ❶  $A \Rightarrow B \Rightarrow A$
- ❷  $(A \Rightarrow B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow B) \Rightarrow A \Rightarrow C$
- ❸  $A \wedge B \Rightarrow B$
- ❹  $B \Rightarrow A \vee B$
- ❺  $(A \vee B) \Rightarrow (A \Rightarrow C) \Rightarrow (B \Rightarrow C) \Rightarrow C$
- ❻  $A \Rightarrow \perp \Rightarrow \neg A$
- ❼  $\perp \Rightarrow A$
- ❽  $(A \Leftrightarrow B) \Rightarrow A \Rightarrow B$
- ❾  $(A \Leftrightarrow B) \Rightarrow B \Rightarrow A$
- ❿  $(A \Rightarrow B) \Rightarrow (B \Rightarrow A) \Rightarrow (A \Leftrightarrow B)$

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\forall$  :

```
Coq < Parameter E : Set.
```

```
E is assumed
```

```
Coq < Parameter P : E -> Prop.
```

```
P is assumed
```

```
Coq < Goal forall x : E, (P x) -> (P x).
```

```
1 subgoal
```

```
=====
```

```
forall x : E, P x -> P x
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\forall$  :

```
Coq < intros.
```

```
1 subgoal
```

```
  x : E
```

```
  H : P x
```

```
=====
```

```
  P x
```

```
Coq < assumption.
```

```
No more subgoals.
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\forall$  :

```
Coq < Parameter E : Set.
```

```
E is assumed
```

```
Coq < Parameter a : E.
```

```
a is assumed
```

```
Coq < Parameter P : E -> Prop.
```

```
P is assumed
```

```
Coq < Goal (forall x : E, (P x)) -> (P a).
```

```
1 subgoal
```

```
=====
(forall x : E, P x) -> P a
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\forall$  :

```
Coq < intro.
```

```
1 subgoal
```

```
H : forall x : E, P x
```

```
=====
```

```
P a
```

```
Coq < apply H.
```

```
No more subgoals.
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\exists$  :

```
Coq < Parameter E : Set.
```

```
E is assumed
```

```
Coq < Parameter a : E.
```

```
a is assumed
```

```
Coq < Parameter P : E -> Prop.
```

```
P is assumed
```

```
Coq < Goal (P a) -> exists x : E, (P x).
```

```
1 subgoal
```

```
=====
```

```
P a -> exists x : E, P x
```



# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\exists$  :

```
Coq < intro.
```

```
1 subgoal
```

```
H : P a
```

```
=====
```

```
exists x : E, P x
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\exists$  :

Coq < exists a.

1 subgoal

H : P a

=====

P a

Coq < assumption.

No more subgoals.

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\exists$  :

```
Coq < Parameter E : Set.
```

```
E is assumed
```

```
Coq < Parameter a : E.
```

```
a is assumed
```

```
Coq < Parameter P : E -> Prop.
```

```
P is assumed
```

```
Coq < Goal (exists x : E, ~(P x)) ->  
          ~(forall x : E, (P x)).
```

```
1 subgoal
```

```
=====
```

```
(exists x : E, ~ P x) -> ~ (forall x : E, P x)
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\exists$  :

```
Coq < intros.
```

```
1 subgoal
```

```
H : exists x : E, ~ P x
```

```
=====
```

```
~ (forall x : E, P x)
```

```
Coq < red.
```

```
1 subgoal
```

```
H : exists x : E, ~ P x
```

```
=====
```

```
(forall x : E, P x) -> False
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\exists$  :

```
Coq < intro.
```

```
1 subgoal
```

```
H : exists x : E, ~ P x
```

```
H0 : forall x : E, P x
```

```
=====
```

```
False
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\exists$  :

```
Coq < elim H.
```

```
1 subgoal
```

```
H : exists x : E, ~ P x
```

```
H0 : forall x : E, P x
```

```
=====
```

```
forall x : E, ~ P x -> False
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\exists$  :

```
Coq < intros.
```

```
1 subgoal
```

```
H : exists x : E, ~ P x
```

```
H0 : forall x : E, P x
```

```
x : E
```

```
H1 : ~ P x
```

```
=====
```

```
False
```

# Logique du premier ordre

## Exemples de preuves

- Quantificateur  $\exists$  :

```
Coq < apply H1.
```

```
1 subgoal
```

```
H : exists x : E, ~ P x
```

```
H0 : forall x : E, P x
```

```
x : E
```

```
H1 : ~ P x
```

```
=====
```

```
P x
```

```
Coq < apply H0.
```

```
No more subgoals.
```



## Propositions à démontrer en Coq

- ❶  $\forall x. P(x) \Rightarrow \exists y. P(y) \vee Q(y)$
- ❷  $(\exists x. P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow (\exists x. P(x)) \vee (\exists x. Q(x))$
- ❸  $(\forall x. P(x)) \wedge (\forall x. Q(x)) \Rightarrow \forall x. P(x) \wedge Q(x)$
- ❹  $(\forall x. P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\forall x. P(x)) \wedge (\forall x. Q(x))$
- ❺  $(\forall x. \neg P(x)) \Rightarrow \neg(\exists x. P(x))$
- ❻  $\neg(\forall x. P(x)) \Rightarrow \exists x. \neg P(x)$

# Guide de survie du petit Coq-uin

## Correspondance LJ/Coq

Logique propositionnelle		Logique du premier ordre	
Règle LJ	Tactique Coq	Règle LJ	Tactique Coq
ax	assumption	$\forall_{\text{right}}$	intro
cut	cut	$\forall_{\text{left}}$	apply
$\Rightarrow_{\text{right}}$	intro	$\exists_{\text{right}}$	exists
$\Rightarrow_{\text{left}}$	apply	$\exists_{\text{left}}$	elim
$\Leftrightarrow_{\text{right}}$	split		
$\Leftrightarrow_{\text{left}}$	elim		
$\wedge_{\text{right}}$	split		
$\wedge_{\text{left}}$	elim		
$\vee_{\text{right1}}$	left		
$\vee_{\text{right2}}$	right		
$\vee_{\text{left}}$	elim		
$\neg_{\text{right}}$	intro		
$\neg_{\text{left}}$	elimtype False + apply		
$\top_{\text{right}}, \perp_{\text{left}}$	auto		