

Tema

Specială*

Exercițiul 1

Din șirul primelor 1000 de numere naturale se alege la întâmplare un număr. Fie A evenimentul ca numărul ales să fie divizibil cu 2, B evenimentul ca numărul ales să fie divizibil cu 3 iar C evenimentul ca numărul ales să se termine cu cifra zero. Ce reprezintă evenimentele:

- a) $C \cap (A \cup B)$
- b) $(A \cap B) \cup C$
- c) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

Exercițiul 2

- a) Care este probabilitatea ca din 13 cărți oarecare 6 să fie de pică ?
- b) S-a amestecat un pachet de 36 de cărți de joc numerotate $1, 2, \dots, 36$. Care este probabilitatea ca deasupra să fie cartea 1 ?

Exercițiul 3

În urma unei anchete efectuate în rândul studenților anului 2 s-a constatat că probabilitatea ca unui student să îi placă disciplina *Probabilități și Statistică* este 0.8, respectiv disciplina *Geometrie Computațională* este 0.7, iar probabilitatea ca un student oarecare să îndrăgească ambele discipline este 0.6. Care este probabilitatea ca un student oarecare:

- să îndrăgească cel puțin una dintre cele două discipline
- să nu îi placă niciuna
- să îi placă disciplina *Probabilități și Statistică* și nu *Geometrie Computațională*

Exercițiul 4

Se aruncă la întâmplare patru zaruri. Să se determine:

- a) Probabilitatea ca o anumită față să apară cel puțin o dată.
- b) Probabilitatea de a obține o anumită față o singură dată.

Exercițiul 5

Într-o urnă sunt 24 de bile albe și 9 bile negre. Se extrag pe rând trei bile fără întoarcere. Care este probabilitatea ca bilele să fie extrase în ordinea alb, alb, negru ? Dar alb, negru, alb ? Dar negru, alb, alb ? Dar probabilitatea ca două din cele trei bile extrase să fie albe ?

*Această temă este destinată în special studenților care nu au predat nicio temă până în acest moment și poate valora până la **2.5 puncte**. Cu toate acestea îi încurajez și pe ceilalți studenți să o facă, aceștia din urmă pot cumula cu temele trimise anterior până la un maxim de **3.5 puncte** (proporțional).

Exercițiul 6

Într-o fabrică lucrează trei mașini care realizează respectiv 30%, 25% și 45% din producție. Din producția primei mașini 1% sunt piese defecte, din producția celei de-a doua mașini 2% sunt piese defecte iar din producția ultimei mașini sunt 4% defecte. Se extrage la întâmplare o piesă. Care este probabilitatea ca piesa extrasă să fie defectă ?

Exercițiul 7

Două variabile aleatoare independente au repartițiile:

$$X \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}; Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0.6 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Să se scrie:

- repartiția sumei $X + Y$
- repartiția produsului XY .

Exercițiul 8

Variabila aleatoare X are repartiția

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Să se scrie repartițiile variabilelor $2X + 3$, X^2 , X^3 , $X + X^2$ și să se calculeze $\mathbb{P}(X > -\frac{1}{3})$, $\mathbb{P}(X < \frac{1}{4} | X \geq -\frac{1}{2})$.

Exercițiul 9

Fie v.a. independente

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix}; Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}$$

- Să se determine $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$.
- Să se afle v.a. $Z = XY$ și să se calculeze $\mathbb{E}[Z]$.
- Ce relație există între valorile medii ale v.a. X , Y și Z ?

Exercițiul 10

Se consideră v.a.

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}.$$

Să se afle constantele a și b astfel încât variabila $Y = aX + 3b$ să aibă media 0 și varianța 1.

Exercițiul 11

a) Fie X o v.a. a cărei densitate este

$$f(x) = \begin{cases} c \ln\left(\frac{a}{x}\right), & 0 < x < a, a > 0 \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

Să se determine constanta c astfel încât f să fie densitate de probabilitate.

b) Să se determine constanta c din intervalul $(0, 1)$ astfel încât funcția

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \in [1 - c, 1 + c] \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

să fie densitate de probabilitate.

Exercițiul 12

Se consideră v.a. X cu densitatea de probabilitate

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x^2 e^{-kx}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, k > 0.$$

a) Să se determine constanta α .

b) Să se afle funcția de repartiție.

c) Să se calculeze $\mathbb{P}(0 < X < k^{-1})$.

Exercițiul 13

Există v.a. X pentru care $\mathbb{V}[X] = \sigma^2$ și $\mathbb{P}(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0.6$?

Exercițiul 14

Fie X și Y două variabile aleatoare cu repartițiile date de

$$X \sim \begin{pmatrix} 2.5 & 4 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \text{ și } Y \sim \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ p_1 & p_2 \end{pmatrix}, \text{ cu } p_1, p_2 \in (0, 1).$$

a) Aflați p_1 și p_2 știind că $\mathbb{P}(X = 2.5, Y = -1) = 0.2$ și $\mathbb{E}[X|Y = -1] = 3$.

b) Considerând valorile lui p_1 și p_2 aflate anterior, calculați coeficientul de corelație al lui X și Y .

Exercițiul 15

Fie cuplul de v.a. (X, Y) cu densitatea de repartiție $f_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, unde

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \begin{cases} k(x + y + 1), & x \in [0, 1], y \in [0, 2] \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}.$$

a) Să se determine constanta k .

b) Să se determine densitățile marginale.

- c) Să se verifice dacă X și Y sunt independente.
- d) Să se afle funcțiile de repartiție marginale și funcția de repartiție a vectorului (X, Y) .
- e) Să se determine densitățile v.a. $X|Y = y$ și $Y|X = x$.

Exercițiul 16

De câte ori trebuie aruncată o monedă pentru ca să putem spune cu o probabilitate de 0.6 că abaterea frecvenței de apariție a stemei de la probabilitatea $p = 0.5$ este mai mică decât 0.01 ?

Exercițiul 17

Nivelul de zgomot al unei mașini de spălat este o v.a. de medie 44 dB și de abatere standard 5 dB. Admițând aproximarea normală care este probabilitatea să găsim o medie a zgomotului superioară la 48 dB într-un eșantion de talie 10 mașini de spălat ?

Exercițiul 18

O telecabină are o capacitate de 100 de persoane. Știind că greutatea populației (țării) este o v.a. de medie 66.3 Kg și o abatere standard de 15.6 Kg și presupunând că persoanele care au urcat în telecabină au fost alese în mod aleator din populație, care este probabilitatea ca greutatea totală acestora să depășească 7000 Kg ?