

# Probabilità Appunti

Giovanni Palma e Alex Basta

# Contents

## Chapter 1

**Introduzione preliminare** \_\_\_\_\_ **Page** \_\_\_\_\_

- 1.1 richiami teoria degli insiemi  
Leggi di de morgan — • proprietà distributive di intersezione e unione —

## Chapter 2

**Spazi di probabilità discreti** \_\_\_\_\_ **Page** \_\_\_\_\_

- 2.1 Concetti introduttivi

# Chapter 1

## Introduzione preliminare

### 1.1 richiami teoria degli insiemi

Dato un insieme  $\Omega$  e due sottoinsiemi  $A, B \subseteq \Omega$ , si useranno tali notazioni per le diverse operazioni tra insiemi

$$\begin{aligned}A \cup B &:= \{\omega \in \Omega : \omega \in A \vee \omega \in B\}, \\A \cap B &:= \{\omega \in \Omega : \omega \in A \wedge \omega \in B\}, \\A^c &:= \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}, \\A \setminus B &:= A \cap B^c, \\A \Delta B &:= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B),\end{aligned}$$

Andiamo inoltre a definire  $\mathcal{P}(\Omega) = \{A \subset \Omega\}$  come l'insieme delle parti di  $\Omega$  e sia  $|A|$  la cardinalità di  $A$ , ovvero il suo numero di elementi

#### Example 1.1.1

Sia  $\Omega = \{a, b, c\}$  allora  $\mathcal{P}(\Omega) = \{\Omega, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$

Si noti poi questa interessante proposizione

#### Proposition 1.1.1

Sia  $\Omega$  un insieme finito allora si ha:

$$|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|}$$

*Dimostrazione:* Fare



Le nozioni di unione e intersezione si estendono in modo naturale a una famiglia arbitraria  $(A_i)_{i \in I}$  di sottoinsiemi di  $\Omega$ :

$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &:= \{\omega \in \Omega : \exists i \in I \text{ tale che } \omega \in A_i\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &:= \{\omega \in \Omega : \forall i \in I \text{ si ha che } \omega \in A_i\}\end{aligned}$$

#### Example 1.1.2 (Intersezione e unione in un insieme di riferimento numerabile $I = \mathbb{N}$ )

Sia  $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$  una successione di insiemi

1.  $\Omega = \mathbb{R}, A_n = \{n\}, n \in \mathbb{N}$

Si ha

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}$$

$$\bigcap_{n=1} A_n = \emptyset$$

Giustamente  $\{1\} \neq \{2\} \neq \{3\} \neq \dots$  pertanto l'unione è vuota

$$2. \Omega = \mathbb{R}, A_n = \left[0, \frac{1}{n}\right], n \in \mathbb{N}$$

$$\bigcup_{n=1} A_n = [0, 1]$$

L'intervallo  $[0, 1]$  è quello che "contiene" tutti gli altri, pertanto, per come è definita l'unione, è ovvio che sia lui il risultato di tale operazione

$$\bigcap_{n=1} A_n = \{0\}$$

L'intersezione è un insieme con solo 0, l'unico numero contenuto in tutti gli insiemi di intervalli

### 1.1.1 Leggi di de morgan

#### Theorem 1.1.1 Leggi di De Morgan

Queste proposizioni sono vere:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

che valgono, più in generale, per famiglie arbitrarie di insiemi:

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$$

**Dimostrazione:** Devo dimostrare che  $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c \wedge A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$  ovvero che  $w \in (A \cap B)^c \iff w \in (A^c \cup B^c)$   
ebbene:

$$\begin{aligned} \omega \in (A \cap B)^c &\iff \omega \notin A \cap B \\ &\iff \omega \notin A \text{ or } \omega \notin B \\ &\iff \omega \in A^c \text{ or } \omega \in B^c \\ &\iff \omega \in (A^c \cup B^c) \end{aligned}$$

È dato come esercizio per Bastiality la dimostrazione per le altre cose

☺

### 1.1.2 proprietà distributive di intersezione e unione

#### Theorem 1.1.2

è possibile dimostrare che valgono le seguenti leggi

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cup \left(\bigcap_{i=1}^n B_i\right) = \bigcap_{i=1}^n (A \cup B_i)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)$$

: Bonzo, la dimostri per esercizio

☺

## Chapter 2

# Spazi di probabilità discreti

### 2.1 Concetti introduttivi

Innanzitutto andiamo a definire che cosa intendiamo per *esperimento aleatorio*, *esito*, *probabilità*

Con la dicitura esperimento *aleatorio* indicheremo qualunque fenomeno (fisico, economico, sociale, ...) il cui esito non sia determinabile con certezza a priori. Il nostro obiettivo è di fornire una descrizione matematica di un esperimento aleatorio, definendo un modello probabilistico, un *esito* invece è un ipotetico risultato di un'esperimento aleatorio sulla base di un cosiddetto *spazio campionario* un insieme che contiene tutti gli esiti possibili dell'esperimento

#### Example 2.1.1

- **Esperimento aleatorio:** Lancio di un dado.
- **Spazio campionario:**  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .
- **Esito:** 4.

Adesso forniamo vere e proprie definizioni

#### Definition 2.1.1: evento

Si definisce **evento** un'affermazione riguardante l'ipotetico esito univoco dell'esperimento, di cui si può affermare con certezza se è vero o falso una volta noto l'esito

#### Example 2.1.2

Esper. aleatorio: Lancio del dado  
 $A = \text{"esce un numero pari"}$