

Guia de Medicamentos Padronizados

Este guia rápido padroniza concentrações e facilita cálculos de infusão para drogas vasoativas e sedoanalgesia em unidades de cuidados críticos, garantindo segurança na administração de medicamentos de alta vigilância.

DROGAS VASOATIVAS					
Droga	Concentração final	Diluição	Infusão	Dose	Montagem
Norepinefrina	32 mcg/mL	8 mL + SG 5% 242 mL	0,018–3,75 mL/kg/h	0,01–2 mcg/kg/min	2 ampolas + SG 5% 242 mL
Norepinefrina (Concentrada)	200 mcg/mL	20 mL + SG 5% 80 mL	0,003–0,6 mL/kg/h	0,01–2 mcg/kg/min	5 ampolas + SG 5% 80 mL
Vasopressina	0,2 U/mL	1 mL + SG 5% 99 mL	3–12 mL/h	0,01–0,04 U/min	1 ampola + SG/SF 99 mL
Vasopressina (Concentrada)	1 U/mL	1 mL + SG 5% 19 mL	0,6–2,4 mL/h	0,01–0,04 U/min	1 ampola + SG/SF 19 mL
Epinefrina	60 mcg/mL	6 mL + SF 0,9% 94 mL	0,06–12 mL/kg/h	0,01–0,2 mcg/kg/min	6 ampolas + SF 94 mL
Epinefrina (Push Dose)	—	1 mL + SF 0,9% 99 mL	0,5–2 mL a cada 2–5 min	5–20 mcg a cada 2–5 min	1 ampola + SF 99 mL
Dobutamina	1 mg/mL	20 mL + SG 5% 230 mL	0,15–1,2 mL/kg/h	2,5–20 mcg/kg/min	1 ampola + SG/SF 230 mL
Nitroprussiato	200 mcg/mL	2 mL + SG 5% 248 mL	0,09–3 mL/kg/min	0,3–10 mcg/kg/min	1 ampola + SG 248 mL
Nitroglicerina	200 mcg/mL	2 mL + SG 5% 240 mL	1,5–30 ml/kg/min	5–100 mcg/kg/min	2–5 ampolas + SG 240 mL
SEDOANALGESIA E BLOQUEADORES					
Fármaco	Concentração Montada	Diluição	Infusão (mL/kg/h)	Dose (mcg ou mg/kg/h)	Montagem
Fentanil	500 mcg	SF 0,9% 80 mL	0,5 – 1 mL/kg/h	0,5 – 1 mcg/kg/h	2 ampolas + 80 mL
Midazolam	100 mg	SF 0,9% 80 mL	0,03 – 0,12 mL/kg/h	0,03 – 0,12 mg/kg/h	2 ampolas + 80 mL
Propofol	1000 mg (100 mL)	Sem diluição	0,025 – 0,075 mL/kg/min	0,25 – 0,75 mcg/kg/min	5 ampolas

Orientações de Segurança e Boas Práticas

1

Dupla Checagem

Checagem dupla de medicamentos vasoativos e sedativos por dois profissionais antes da administração.

2

Identificação Clara

Rotulagem clara de seringas e bolsas: nome, concentração, data/hora e responsável.

3

Vias Exclusivas

Vias exclusivas (acesso central) para drogas vasoativas, evitando conexões em Y.

4

Monitorização Contínua

Monitorização hemodinâmica contínua durante uso de vasopressores/vasodilatadores. Ajuste gradual.

Trocas Programadas

Propofol: 12h
Outras drogas: 24h
Equipos: conforme protocolo

Armazenamento

Nitroprussiato: proteger da luz
Propofol: temp. ambiente
Demais: conforme bula

Contato Farmácia

Dúvidas (diluição, estabilidade, incompatibilidade):
Contatar farmácia clínica 24h.

Material de referência rápida – Unidade Assistencial. Revisão: 2024. Não substitui julgamento clínico individualizado.

Referencial Bibliográfico:

- [PCLAS](#).RUE.PSAFF.011 **PROTOCOLO DE SEDOANALGESIA**
- [PCLAS](#).RUE.PSAFF.012 **PROTOCOLO DE DROGAS VASOATIVAS**
- ABRAMEDE. *Tratado de Medicina de Emergência*.
- *Elaboração:* Hedine Costa / Mariana Sarlo Silva - Performa Saúde
- *Aprovação:* Eduardo Luna de Oliveira Torres