

DIETEVIT™ REFRESH

AYUDA A LA PREPARACIÓN DEL CELO
Y A LA REPRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN

Peso: 65 g - Diámetro: 25 mm - Largo: 77 mm.

COMPOSICIÓN

Óxido de magnesio, Fosfato de magnesio, Fosfato de monosodio, Estearato de magnesio.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Fósforo: 6,20%, Magnesio: 18,80%, Calcio: 0,50%, Sodio: 2,90%.

ADITIVOS

Oligoelementos	Por bolos 65 g	Por dosis (4 bolos)	Liberación promedio por día
Zinc (Zinc quelato)	650 mg	10,000 mg	130 mg
Cobre (Cobre quelato)	180 mg	2,770 mg	36 mg
Selenio (Selenometionina)	7.5 mg	115.5 mg	1.5 mg
Vitaminas			
3a672a Vitamina A	660,000 IU	10,153,850 IU	132,000 IU
3a700 Vitamina E	25,000 IU	38,465 IU	500 IU
3a160 Beta Caroteno	1,500 IU	23,080 mg	300 mg

INSTRUCCIONES DE USO

- Se recomienda el uso de un aplicador adecuado
- No se administra a animales no rumiantes ni a ganado de menos de 300 kg
- Conservar en un lugar seco a una temperatura entre 5°C y 25°C.

EMBALAJE


- Disponible en caja de 10 bolos.

OTRA INFORMACIÓN


- Antes de usar, se recomienda pedir los consejos de un veterinario o un nutricionista sobre el equilibrio de elementos traza en la ración diaria y el estado del resto de oligoelementos en la manada. Asegurarse que la ingesta máxima recomendada del aditivo no se supere teniendo en cuenta la ración diaria del animal.
- Bolutech™ REFRESH libera elementos traza y vitaminas por un periodo promedio de 10 días.
- El uso de Bolutech™ Refresh es recomendado en una ración con bajo contenido en beta caroteno y vitaminas (ensilaje de maíz, concentrado).

VIDA ÚTIL


- 18 meses.




Limpiar, desinfectar y enjuagar el aplicador antes del uso en cada grupo de animales. Introducir con cuidado el bolo en el cilindro del aplicador.



Abra la boca del animal e introduzca el aplicador con cuidado y suavemente hacia la parte superior de la cavidad bucal. Durante esta operación, la cabeza del animal debe mantenerse extendida con el cuello recto.



Continúe introduciendo cuidadosamente el aplicador. Con uno o dos dedos de la mano libre contacte con el interior de la mejilla para facilitar la operación.



Una vez el aplicador en la posición correcta, apriete suavemente el mango/émbolo para administrar los bolos. Si encuentra alguna resistencia durante esta operación, significa que la posición no es correcta. Extraiga el aplicador y repita la operación.



video of
practice

