Nutrizan I

La bebida fortificante ganadora

En polvo





Objetivos

- Rehidratación de los animales jóvenes
- Disminución del tránsito intestinal
- Mantener la mucosa intestinal íntegra



Características

| • Sodio | 5 % |
|--------------------------------------|--------------|
| • Potasio | 3 % |
| • Cloruros | 5 % |
| • Betaína | 21 300 mg/kg |
| • S.I.D. | 62 |
| • Total de azúcares | 23 % |
| • Lactosa | si |
| • Bicarbonato de Na | 7 % |
| • Pectinas | si |
| • Prebióticos | si |
| Vitamina A | 50 000 UI/kg |
| • Vitamina E | 1 250 UI/kg |
| Vitamina C | 2 500 mg/kg |
| Inmunoglobulinas | si |


¿Lo sabía usted?

Debido a la diarrea, las vellosidades intestinales del ternero pueden ser el lugar principal de la proliferación de bacterias. Estas vellosidades llegan a estallar y liberan sus contenidos Las fibras vegetales, debido a su inflamiento, disminuyen el tránsito intestinal y mantienen la intestinal íntegra.



Ventajas

- Polvo de huevo rico en inmunoglobulinas.
- Disminución del tránsito intestinal (pectinas).
- Energía de asimilación rápida (dextrosa, lactosa).
- Regeneración de la mucosa intestinal (vitaminas A, E, extractos vegetales).
- Desarrollo de la flora intestinal beneficiosa (prebióticos).
- Fácil absorción de agua y de sales minerales (betaína).





Meta

- En caso de deshidratación moderada, alternar los dos productos: Lactibiose/Nutrizan.
- Como medio de prevención, la acción de los Igg puede ser reforzada por un programa que integre el **NEOSTRUM** Ig.

Modo de empleo

Como medio preventivo : a partir del 2^{do} día de vida y debe ser diluido en leche o agua tibia durante 5 días.

- Terneros: 40 g (= 1 monodosis) en 2 L.
- Corderos, cabritos : 0,8 g/kg de peso vivo con cada comida, hasta 3 comidas al día.

En caso de trastornos digestivos (diarrea):

- Terneros: 80 g en 2 L de leche o agua tibia durante 1 a 3 días.
- Corderos, cabritos : 1,5 g/kg de peso vivo en cada comida (diluido en leche o agua tibia durante 1 a 3 días).



