

# BOLUTECH™ FLASH MG

Para un parto más fácil



## BENEFICIOS

- BAJO EL RIESGO DE HYPOMAGNESIA
- FACILITA EL PARTO

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Difusión rápida del bolo 6 horas
- 28% de magnesio de tres fuentes diferentes
- Vitamina E, C y extractos de plantas

## INSTRUCCIONES DE USO:

Vacas: 2 bolos antes del déficit de magnesio

- Al parto: 2 bolos por vaca y 2 bolos 30 días después
- Para el pastoreo de primavera : 2 bolos por vaca

## ¿USTED LO SABE?

*Retención de placenta (placenta no expulsada 12 horas después del parto) ocurre en el 8% de vacas.*


*Tiene un impacto económico importante, una menor fertilidad y un aumento de los partos a parto de 10 a 20 días y menor leche producción.*

*Después de un parto manual de placenta, del 15 al 26% las vacas contraerán metritis.*

*El tratamiento de la metritis cuesta de 100 € a 200 €.*



## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:



\* Mg: una porción en forma de quelatos

# BOLUTECH™ FLASH MG

Para un parto más fácil

## PRESENTACIÓN

Peso: 85 g - Diámetro: 25 mm

## COMPOSICIÓN

28% de magnesio de tres fuentes diferentes. Vitamina E, C y vegetal extractos.

## COMPONENTES ANALITICOS

Magnesio: 27,9 %      Fósforo : 2.6 %  
Calcio: 5 %              Sodio : 1.4 %

## ADDITIVES

Vitaminas	Per 2 bolos	Per kg
Vitamina E	2,800 mg	16,460 mg
Vitamina C	9,690 mg	57,000 mg

## INTERÉS TÉCNICO


En pastoreo: vaca con alto potencial de ordeño, vaca en celo o justo después de artificial.

### inseminación

Rebaños con alto riesgo de hipocalcemia o vacas alimentadas con bajo contenido de magnesio durante el período seco,

Cuando no se gestiona BACA

Rebaños con alta retención de placenta > 5%, a vacas que no nacen de 4 a 12 h post parto.



Absorción relativa de la fuente de magnesio

En rojo las fuentes de magnesio utilizada en Bolutech Flash MG

## EMBALAJE


- Disponible en caja de 10 bolos.

## OTHER PROVISIONS


- Se recomienda consultar a un nutricionista antes de usar.
- Asegúrese de que no se exceda la ingesta máxima de aditivos, teniendo en cuenta la ración diaria del animal.

## DURACIÓN


12 meses




Limpiar, desinfectar y enjuagar el aplicador antes del uso en cada grupo de animales. Introducir con cuidado el bolo en el cilindro del aplicador.



Abra la boca del animal e introduzca el aplicador con cuidado y suavemente hacia la parte superior de la cavidad bucal. Durante esta operación, la cabeza del animal se mantendrá extendida con el cuello recto.



Continúe introduciendo cuidadosamente el aplicador. Con uno o dos dedos de la mano libre, contacte con el interior de la mejilla para facilitar la operación.



Una vez el aplicador en la posición correcta, apriete suavemente el mango/embolo para administrar los bolos. Si encontrara alguna resistencia durante esta presión, significa que la posición del aplicador no es correcta. Extráigalo y repita la operación.

video de practica



INSTRUCCIONES DE USO



Elaborado por una planta certificada OQUALIM-RCNA-STNO.

NEOLAIT S.A.S. - BP1 - 22120 Yffiniac - France  
Tel. +33 (0)2 96 63 82 50 - Fax +33 (0)2 96 63 82 51  
www.neolait.com

neolait™