


EcoPlant

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η καλλιέργεια των σπαρμένων περιοχών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου ή μια συννεφιασμένη μέρα.



Η αναλογία αραιώσης EcoPlant / νερό ποικίλει ανάλογα τον στόχο που θέλουμε να πετύχουμε:

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΡΜΟΓΗΣ	EcoPlant /Νερό
ΘΡΕΨΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1 ΠΡΟΣ 100
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	1 ΠΡΟΣ 50
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ (ΕΝΤΟΜΑ, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΙΟΙ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΧ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ)	1 ΠΡΟΣ 25

Καλλιέργεια	Επεξεργασία σπόρων	Εφαρμογές στην καλλιεργητική περίοδο
Δημητριακά (Σιτάρι, κριθάρι, τритικάλε)	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 5 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Διπλός ψεκασμός: 1 - ψεκασμός στους 5 – 10 πόντους ύψος. 2 - ψεκασμός στη φάση της ανθοφορίας - η αρχή της γαλακτώδους ωρίμανσης. Κατανάλωση: 20 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Βρώμη	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 5 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Διπλός ψεκασμός: 1 - ψεκασμός στη φάση αδερφώματος 2- αρχή γαλακτώδους ωρίμανσης. Κατανάλωση: 20 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Καλαμπόκι	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Διπλός ψεκασμός: 1 - ψεκασμός στη φάση βλάστησης όταν εμφανίζονται 3 - 5 φύλλα. 2 - ψεκασμός στη φάση της ανθοφορίας. Κατανάλωση: 30 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Καλαμπόκι για ενσίρωση	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Τριπλός ψεκασμός: 1 - ψεκασμός στη φάση βλάστησης όταν εμφανίζονται 3 - 5 φύλλα. 2ος και 3ος ψεκασμός με μεσοδιάστημα 10 - 15 ημερών. Κατανάλωση: 30 λίτρα ανά 1 εκτάριο.

Σίκαλη	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 5 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Διπλός ψεκασμός: 1 - ψεκασμός στη φάση της διακλάδωσης - η αρχή της εκβλάστησης. 2 - ψεκασμός μετά από 10 - 14 ημέρες. Κατανάλωση: 30 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Ρύζι	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Πριν από την επόμενη πλήρωση των ελέγχων σε αναλογία 50 λίτρων ανά 1 εκτάριο, προσθέστε σε δόσεις στην είσοδο κατά τη διαδικασία άρδευσης.
Κεχρί	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Διπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός στη φάση του φρεζαρίσματος. 2 - ψεκασμός στη φάση της ανθοφορίας. Κατανάλωση: 30 λίτρα ανά 1 εκτάριο
Ζαχαροκάλαμο	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Διπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός στη φάση της αρχή της εξόδου στο σωλήνα, 2 - ψεκασμός στη φάση της ανθοφορίας. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο
Αρακάς	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Διπλός ψεκασμός: 1 - ψεκασμός στη φάση βλάστησης: 3 - 5 - φύλλα. 2 - ψεκασμός στη φάση 5 - 6 φύλλων (βλαστών). 3 - ψεκασμός στη φάση της ανθοφορίας. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο

Τριφύλλι	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Escoplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Τριπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός στη φάση της βλάστησης. 2 - ψεκασμός στη φάση της αναγέννησης των φυτών. 3 - ψεκασμός στη φάση καταδίωξης. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο
Μηδική	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Escoplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Τριπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός στη φάση της βλάστησης - αναγέννησης των φυτών. 2 - ψεκασμός στη φάση καταδίωξης. 3 - ψεκασμός στη φάση εκβλάστησης. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Συγκαλλιέργεια βίκου-βρώμης	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Escoplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Τριπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός στη φάση δενδρυλλίων. 2ος και 3ος ψεκασμός με μεσοδιάστημα 15 ημερών. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Χειμωνιάτικη και ανοιξιάτικη ελαιοκράμβη	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Escoplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Τριπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός στη φάση βλάστησης - εμφάνιση του πρώτου ζεύγους αληθινών φύλλων. 2 - ψεκασμός στη φάση της έναρξης του σχηματισμού μιας ροζέτας φύλλων - διακλάδωση · 3 - ψεκασμός στη φάση της έναρξης της εκβλάστησης. Κατανάλωση: 40 λίτρα ανά 1 εκτάριο

Ηλιοτρόπιο	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Escoplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Τριπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός στη φάση δενδρυλλίων. 2 - με 3 - 4 ζεύγη αληθινών φύλλων. 3 - ψεκασμός μετά από 10 - 15 ημέρες. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Σόγια	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Escoplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Τριπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός στη φάση δενδρυλλίων. σχηματισμός 2-3 αληθινών φύλλων. 2 - ψεκασμός στη φάση καταδίωξης (αρχή εκβλάστησης). 3 - ψεκασμός στη φάση της έναρξης της ανθοφορίας. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Αγγούρια, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, κολοκυθάκια, ντομάτες....	Εμβάπτιση των σπόρων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 15 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 5 λίτρα Escoplant σε 30 λίτρα νερό ανά 1 κιλό σπόρων.	30 - και πολλαπλός ψεκασμός φυτών: 1 - 2ος ψεκασμός στη φάση της εμφάνισης 2-4 αληθινών φύλλων. κάθε 6-7 ημέρες. 3ος-4ος ψεκασμός με μεσοδιάστημα 6-7 ημερών. Και κάθε 10-15 μέρες μέχρι το τέλος της σεζόν. Κατανάλωση: 50 -300 l 1 εκτάριο.
Λάχανο	Εμβάπτιση των σπόρων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 10 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 5 λίτρα Escoplant σε 30 λίτρα νερό ανά 1 κιλό σπόρων.	10 φορές ψεκασμός φυτών: 1- ψεκασμός 2-3 ημέρες μετά τη φύτευση δενδρυλλίων. 2- ψεκασμός στη φάση του στροβιλισμού των φύλλων (δέσιμο κεφαλών). 3- ψεκασμός 10-12 μετά το δεύτερο. Και κάθε 15 μέρες μέχρι το τέλος της σεζόν. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.

Κρεμμύδι γογγύλι	Μουλιάζοντας τους βολβούς στο διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 15 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 5 λίτρα Ecorplant σε 30 λίτρα νερό ανά 1 κιλό σπόρων.	10 - και πολλαπλός ψεκασμός φυτών: 1- ψεκασμός στη φάση της εμφάνισης 2-3 φύλλων. 2 και 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Και κάθε 10-15 μέρες μέχρι το τέλος της σεζόν: Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Κρεμμύδια για σπόρους	Μουλιάζοντας τους βολβούς στο διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 15 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 5 λίτρα Ecorplant σε 20 λίτρα νερό ανά 1 κιλό σπόρων.	10 - και πολλαπλός ψεκασμός φυτών: 1- ψεκασμός στη φάση της εμφάνισης 2-3 φύλλων. 2 και 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Και κάθε 10-15 μέρες μέχρι το τέλος της σεζόν: Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο
Λινάρι	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	4 φορές ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1- ψεκασμός στη φάση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. 2ος και 3ος-4ος ψεκασμός με μεσοδιάστημα 15-20 ημερών. Κατανάλωση: 50 l 1 εκτάριο.
Ζαχαρότευτλα	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 10 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Διπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1- ψεκασμός στη φάση της βλάστησης: 2-3 ζεύγη αληθινών φύλλων. 2- ψεκασμός στη φάση 4 ζευγών αληθινών φύλλων (κλείσιμο φυτών σε σειρές). Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.

Επιτραπέζιο παντζάρι	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 5 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	Διπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1- ψεκασμός στη φάση της βλάστησης: 2-3 ζεύγη αληθινών φύλλων. 2- ψεκασμός στη φάση 4 ζευγών αληθινών φύλλων (κλείσιμο φυτών σε σειρές). Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Καπνός	Εμβάπτιση σπόρων μαζί με τυχόν παράγοντες επικάλυψης πριν από τη σπορά. Κατανάλωση διαλύματος εργασίας: αναμείξτε 5 l Ecorplant σε 5 λίτρα νερού για 1 τόνο σπόρους.	5 - και πολλαπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός δενδρυλλίων 5 - 8 ημέρες πριν από τη δειγματοληψία. 2 - ψεκασμός 5 - 10 ημέρες μετά τη φύτευση δενδρυλλίων στο έδαφος. 3-4 ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 15-20 ημερών. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο
Πατάτα	Συνιστάται η εμβάπτιση των κονδύλων πριν από τη φύτευση. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 20 λίτρα ecorplant σε 80 λίτρα νερό για 0,5 τόνους σπόρους	5 - και πολλαπλοί ψεκασμοί των καλλιεργειών: 1- ψεκασμός στη φάση της εμφάνισης 5-7 φύλλων. 2 - ψεκασμός στη φάση εκβλάστησης. 3-4-5ος ψεκασμός με μεσοδιάστημα 15-20 ημερών. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.

Καρότο	Εμβάπτιση των σπόρων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 10 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 5 λίτρα Escoplant σε 30 λίτρα νερό ανά 1 κιλό σπόρων.	Ψεκάστε (νερό) 3 ή 4 φορές όταν εμφανιστούν βλαστοί. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Ραπανάκι	Εμβάπτιση των σπόρων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 10 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 5 λίτρα Escoplant σε 30 λίτρα νερό ανά 1 κιλό σπόρων.	Τριπλός ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - ψεκασμός στη φάση σχηματισμού 2-3 αληθινών φύλλων. 2ος και 3ος ψεκασμός με μεσοδιάστημα 10-15 ημερών. Κατανάλωση: 50 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Μηλιά, αχλαδιά, κεράσι, ακτινίδιο, δαμάσκηνο, κυδώνι, βερίκοκο, λωτός, σύκο, ρόδι,.....	Εμβάπτιση των ριζών των δενδρυλλίων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 24 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 10 λίτρα escoplant σε 100 λίτρα νερό. Συνιστάται: προσθέστε 1 λίτρο διαλύματος στον λάκκο φύτευσης	5 φορές ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: και μια φορά την άνοιξη ριζικό πότισμα 100 g escoplant ανά 10 λίτρα νερού ανά ρίζα ανά (ένα δέντρο). 1-2ος ψεκασμός πριν την ανθοφορία και 5-7 ημέρες μετά την ανθοφορία. 3- ψεκασμός στην αρχή της φυσιολογικής πτώσης των ωοθηκών. 4- ψεκασμός κατά την τοποθέτηση μπουμπουκιών ανθέων. 5- ψεκασμός κατά την περίοδο της εντατικής ανάπτυξης των καρπών. Κατανάλωση: 480 λίτρα ανά 1 εκτάριο.

Ακρόδρυα(καρυδιά,αμυγδαλιά, φουντουκιά, καστανιά κτλ)	Εμβάπτιση των ριζών των δενδρυλλίων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 24 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 10 λίτρα escoplant σε 100 λίτρα νερό. Συνιστάται: προσθέστε 1 λίτρο διαλύματος στον λάκκο φύτευσης	5 φορές ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: και μια φορά την άνοιξη ριζικό πότισμα 100 g escoplant ανά 10 λίτρα νερού ανά ρίζα ανά (ένα δέντρο). 1-2ος ψεκασμός πριν την ανθοφορία και 5-7 ημέρες μετά την ανθοφορία. 3- ψεκασμός στην αρχή της φυσιολογικής πτώσης των ωοθηκών. 4- ψεκασμός κατά την τοποθέτηση μπουμπουκιών ανθέων. 5- ψεκασμός κατά την περίοδο της εντατικής ανάπτυξης των καρπών. Κατανάλωση: 480 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Αμπέλι	Εμβάπτιση μοσχευμάτων αμπέλου πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 24 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 10 λίτρα escoplant σε 100 λίτρα νερό.	Τετραπλός ψεκασμός φυτών σταφυλιού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1- ψεκασμός στη φάση εκβλάστησης. 2- ψεκασμός πριν την ανθοφορία. 3 - ψεκασμός μετά την ανθοφορία. 4 - ψεκασμός στη φάση πλήρωσης μούρων. Κατανάλωση: 100 λίτρα ανά στρέμμα.
Καρπούζι	Εμβάπτιση των σπόρων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 18 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 5 λίτρα Escoplant σε 30 λίτρα νερό ανά 1 κιλό σπόρων.	4-πλάσιο πότισμα των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1 - στη φάση του σχηματισμού βλαστών. 2-3-4 - ψεκασμός φυτών 10-15 ημέρες. Κατανάλωση: 40 l 1 εκτάριο.

Πράσινες καλλιέργειες	Εμβάπτιση των σπόρων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 10 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 100 ml escoplant σε 10 λίτρα νερού ανά 1 κιλό σπόρων.	4 - x ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1-2-3-4 - ψεκασμός φυτών με μεσοδιάστημα 6-7 ημερών. Κατανάλωση: 20 λίτρα ανά 1 εκτάριο.
Βαμβάκι	Εμβάπτιση των σπόρων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 18 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 10 λίτρα Escoplant σε 10 λίτρα νερό ανά 1 τόνο σπόρων.	Ψεκασμός 2 φορές . 1 ^{ος} στο στάδιο της εκβλάστησης και 2 ^{ος} πάνω στα καρύδια. 40 λίτρα ανά εκτάριο.
	Εμβάπτιση των ριζών των δενδρυλλίων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 10-12 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 100 ml escoplant σε 10 λίτρα νερό. Συνιστάται: προσθέστε 0,5 l στον λάκκο φύτευσης.	5 φορές ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: και μια φορά την άνοιξη ριζικό επίδεσμο 100 g escoplant ανά 10 λίτρα νερού ανά ρίζα ανά (ένα δέντρο). 1-2ος ψεκασμός πριν την ανθοφορία και 5-7 ημέρες μετά την ανθοφορία. 3- ψεκασμός στην αρχή της φυσιολογικής πτώσης των ωοθηκών. 4- ψεκασμός κατά την τοποθέτηση μπουμπουκιών ανθέων. 5- ψεκασμός κατά την περίοδο της εντατικής ανάπτυξης των καρπών. Κατανάλωση: 480 λίτρα ανά 1 εκτάριο.

Ελιά	<p>Εμβάπτιση των ριζών των δενδρυλλίων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 10-12 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 100 ml ecorplant σε 10 λίτρα νερό. Συνιστάται: προσθέστε 0,5 l στον λάκκο φύτευσης.</p>	<p>5 φορές ψεκασμός των φυτών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: και μια φορά την άνοιξη ριζικό επίδεσμο 100 g ecorplant ανά 10 λίτρα νερού ανά ρίζα ανά (ένα δέντρο). 1-2ος ψεκασμός πριν την ανθοφορία και 5-7 ημέρες μετά την ανθοφορία. 3- ψεκασμός στην αρχή της φυσιολογικής πτώσης των ωοθηκών. 4- ψεκασμός κατά την τοποθέτηση μπουμπουκιών ανθέων. 5- ψεκασμός κατά την περίοδο της εντατικής ανάπτυξης των καρπών. Κατανάλωση: 480 λίτρα ανά 1 εκτάριο.</p>
Βιομηχανική Φαρμακευτική Κάνναβη	<p>Εμβάπτιση των σπόρων σε διάλυμα πριν από τη φύτευση. Χρόνος μουλιάσματος 10 ώρες. Κατανάλωση λύσης εργασίας: Αναμείξτε 100 ml ecorplant σε 10 λίτρα νερού ανά 1 κιλό σπόρων.</p>	<p>1ος ψεκασμός και ριζοπότισμα στα 2-3 πρώτα φύλλα και στη συνέχεια ριζοπότισμα ανά 7 ημέρες και ψεκασμός ανά 3 ημέρες. Αραίωση EcoPlant/ νερό 1/50.</p>