

# Estructuras algebraicas

Pedro Valero Mejía

8 de octubre de 2013

# 1. Grupos

Por definición, sea  $X$  un conjunto no vacío, podemos construir el conjunto de pares ordenados  $X \times X = \{(x, y) / x, y \in X\}$ . Vamos a fijar un conjunto  $X \neq \emptyset$  y una función  $\varphi: X \times X \rightarrow X$  que a cada par  $(x, y)$  le asocia un elemento  $\varphi(x, y) \in X$  que expresamos como  $x * y$ , siendo  $*$  cualquier operación.

*Definición 1.1* . Sea  $S$  un subconjunto no vacío de  $G$ , diremos que  $S$  es cerrado por  $\varphi$  si la combinación por  $\varphi$  de dos elementos de  $S$  da otro elemento del mismo.

Dados  $x, y, z \in X$  puede ser interesante el resultado  $x * y * z$  pero, por definición, esto no tiene sentido. Sin embargo, sí tendrían sentido  $(x * y) * z$  ó  $x * (y * z)$ . Estas operaciones podrían tener, o no, el mismo resultado. Queremos un conjunto con una operación donde no tengamos que preocuparnos por la colocación de los paréntesis. Para ello debemos buscar una operación asociativa.

Dado  $G \neq \emptyset$  y  $\varphi: G \times G \rightarrow G$ , diremos que  $G$  es un grupo si:

1.  $(G, *)$  es asociativa
2.  $\exists e \in G$  t.q.  $\forall x \in G: x * e = x$
3.  $\forall x \in G \exists x' \in G$  t.q.  $x * x' = x' * x = e$

En todo grupo se cumplen las propiedades de unicidad del elemento neutro y del inverso. La demostración de estas propiedades es bastante trivial.

Sean dos elementos  $e$  y  $e'$  dos elementos neutros de nuestro grupo  $G$ , se cumple que  $e * e' = e'$ , pero también se cumple que  $e' * e = e$ . Esto implica que  $e' = e$ .

Por otro lado, si suponemos la existencia de dos elementos inversos  $a', a'' \in G$ , entonces  $e = a * a' = a * a''$ . Si multiplicamos por  $a$  en ambos lados de la ecuación tenemos:  $a * (a * a') = (a * a') * a''$ , pudiendo reordenar los paréntesis por la propiedad asociativa. Así pues, obtenemos  $a' = a''$ . En esta última demostración nos hemos apoyado en la propiedad cancelativa, que sólo se presenta cuando trabajamos en un grupo.

*Definición 1.2* . Transformaciones lineales rígidas son aquellas que conservan las distancias. (En  $\mathbb{R}^2$  sólo están las simetrías y giros).

La representación geométrica de un grupo consiste en la descripción de los elementos geométricos que lo constituyen. En el caso del ejemplo, consistiría en indicar qué giros y simetrías constituyen el grupo. La representación abstracta o algebraica de un grupo suele realizarse por medio de una tabla, o una serie de restricciones sobre las operaciones de combinación de los elementos del grupo, sin necesidad de indicar qué es realmente cada elemento.

**Definición 1.3** . Se dice que un elemento  $a \in G$ , siendo  $G$  un grupo, tiene orden finito si  $\exists k \in \mathbb{N} \text{ t.q. } a^k = e$

**Definición 1.4** . Dado un elemento de orden finito, decimos que su orden es el menor entero positivo con el que se cumple  $a^k = e$

## 1.1. Subgrupos

Sea  $G$  un conjunto y  $\varphi$  la operación con la que forma un grupo, vamos a ver cuando un subconjunto de  $G$  es un grupo de forma natural, esto es lo que denominaremos subgrupo.

**Definición 1.5** . Diremos que un subconjunto no vacío  $S$  es un subgrupo si:

1.  $S$  es cerrado por la operación
2.  $e \in S$
3.  $s \in S \Rightarrow s^{-1} \in S$ .

**Teorema 1.6.** *Dados  $S_1, S_2$  subgrupos de  $G \Rightarrow S_1 \cap S_2$  es un subgrupo de  $G$ .*

Este teorema también puede aplicarse con una intersección numerable de grupos.

**Definición 1.7** . Fijado un elemento  $g \in G$ , definimos el grupo generado por  $g$  como:  
 $\langle g \rangle = \{ \dots, g^{-2}, g^{-1}, e, g, g^2, \dots \}$ . Este grupo es un subgrupo de  $G$

**Teorema 1.8.** *Si  $H$  es un subgrupo de  $G$  y  $g \in H \Rightarrow \langle g \rangle \subset H$ .*

A partir de un conjunto  $C = \{g_1, g_2, g_3 \dots g_s\}$ , contenido en  $G$ , vamos a buscar el menor subgrupo que lo contiene.  $\langle g_1, g_2, g_3 \dots g_s \rangle = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{ a_1 * a_2 * a_3 \dots a_k / (a_i \in C) \vee (a_i \in C^{-1}) \}$ . Es un subgrupo que contiene a todos los elementos de  $C$ .

Si  $H$  es un subgrupo que contiene a los elementos de  $C$ , el grupo generado por esos elementos se contiene en  $H$ .

**Notación:**  $H < G$  denota  $H$  subgrupo de  $G$

*Definición 1.9* . Dado  $H < G$  se dice que  $H$  es cíclico si existe  $g \in G$  t.q.  $H = \langle g \rangle$

**Teorema 1.10.** Si  $G$  es un grupo finito y  $S \subset G$  es un subconjunto no vacío  $\Rightarrow S$  es un subgrupo  $\Leftrightarrow S$  es cerrado por la operación.

**Demostración.** La implicación hacia la derecha es obvia por la propia definición de subgrupo. Para la implicación hacia la izquierda partimos de que  $S$  es cerrado y finito. Por tanto  $\exists d \in S$  t.q.  $\text{ord}(d) = n$  y  $\langle d \rangle \subset S \Rightarrow d^n = e \in S$  y  $d^{n-1} = d^{-1} \in S \Rightarrow S$  es un grupo  $\square$

Dentro de los grupos podríamos realizar una clasificación según fueran finitos o infinitos, por ejemplo. No obstante, nos resultará más interesante la clasificación de grupos según sean abelianos o no.

*Definición 1.11* . Un grupo es abeliano si cumple la propiedad conmutativa.

**Lema 1.12.** Todo subgrupo cíclico de un grupo  $G$  es abeliano. Por tanto un grupo no abeliano no puede ser cíclico.

**Teorema 1.13.** En un grupo finito  $G$  todo elemento tiene orden finito. Además si  $g \in G$  tiene  $\text{ord}(g) = k \Rightarrow \langle g \rangle$  tiene  $k$  elementos.

*Definición 1.14* . Un retículo de subgrupos es aquel retículo (estructura algebraica parcialmente ordenada) formado por subgrupos de un determinado grupo con una relación de contención. En este retículo, la unión de dos subgrupos es el subconjunto generado por su conexión.

**Teorema 1.15** (Teorema de Lagrange). Si  $G$  es un grupo finito y  $H$  un subgrupo de  $G$ , entonces el número de elementos de  $H$  divide el número de elementos de  $G$ .

**Lema 1.16.** Sea  $\varphi : G \rightarrow G$ , son equivalentes:

1.  $\varphi$  es inyectiva.
2.  $\varphi$  es biyectiva.
3.  $\varphi$  es sobreyectiva.

La demostración de este teorema es totalmente trivial. Con apoyarnos en que el conjunto  $G$  es finito, puede observarse que una de esas propiedades implica directamente las demás.

**Lema 1.17.** Si  $\varphi$  es un biyección y  $A, B$  son subconjuntos de  $G$ :

1.  $\text{card}(A) = \text{card}(\varphi(A))$
2.  $A = B \Leftrightarrow \varphi(A) = \varphi(B)$
3.  $\varphi(A \cap B) = \varphi(A) \cap \varphi(B)$

**Lema 1.18.** Sea  $G$  un grupo finito y  $g \in G$ .  $\varphi_g(x) = g * x$ . Además, por la propiedad cancelativa, podemos ver que  $\varphi_g$  es inyectiva. Además, por ser  $G$  finito, sabemos que  $\varphi_g$  es biyectiva.

También podemos definir  $\varphi_g = \{g * h \mid h \in H\}$

**Lema 1.19.**  $H < G \Rightarrow H$  es subconjunto de  $G$ .

**Notación:**  $gH = \varphi_g(H)$

**Corolario 1.20.** Extraemos las siguientes conclusiones:

1.  $g \in gH$
2.  $\text{card}(H) = \text{card}(gH)$
3.  $H = gH \Leftrightarrow g \in H$

*Demostración.*

1.  $e \in H$ . Por tanto  $g * e \in gH$ .  $g * e = g \in gH$
2. Se puede ver apoyándonos en los lemas anteriores puesto que  $H$  es finito.
3.  $\Rightarrow: e \in H \Rightarrow e = gh$  con  $h \in H \Rightarrow h = g^{-1}e \in H \Rightarrow g \in H$ .  
 $\Leftarrow: g \in H \Rightarrow g^{-1} \in H$  y todo elemento  $h \in H$  cumple  $h = g(g^{-1}h) \in H$ .

□

**Proposición 1.21.** Dados  $g_1, g_2 \in G$  y  $H < G \Rightarrow g_1H = g_2H \vee g_1H \cap g_2H = \emptyset$

*Demostración.*  $g_1H \cap g_2H \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists h_1, h_2 \text{ t.q. } g_1h_1 = g_2h_2 \Rightarrow h_1 = g_1^{-1}g_2h_2 \Rightarrow h_2^{-1}h_1 = g_1^{-1}g_2 \in H \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2H = H \Rightarrow g_2H = g_1H$  □

## 1.2. Particiones

**Definición 1.22 Relación de equivalencia.** Fijado un conjunto  $G \neq \emptyset$ . Una relación  $R$  en  $G$  es de equivalencia si:

1.  $\forall x \in G \ xRx$
2.  $\forall x, y \in G \ xRy \Leftrightarrow yRx$
3.  $\forall x, y, z \in G \ xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$

**Definición 1.23 Partición.** Familia de subconjuntos disjuntos dos a dos tales que su unión constituye el total.

Una partición define una relación de equivalencia y viceversa. Si  $R$  es una relación de equivalencia en un grupo  $G$ , definimos una partición en la que los subconjuntos son de la forma:  $S_x = \{y \in G \mid xRy\}$

**Demostración.** [Volvamos a demostrar la proposición 1.22]

Definimos una relación de equivalencia  $R$  en  $G$  a partir del grupo  $H$ .  $g_1 R g_2 \Leftrightarrow g_1^{-1} g_2 \in H$  y comprobamos que, efectivamente, esta relación es de equivalencia. Tenemos  $S_e = H$ . Así  $S_g$  o ya cubre junto con  $H$  todo  $G$ , o cojo otro  $g'$  y repito el proceso con  $S_{g'}$ . Así formare una serie de grupos de la forma  $S_x$  disjuntos dos a dos y cuya unión me da  $G$ .

De esta forma podemos ver que  $\text{card}(G) = \text{card}(H) \cdot s$  □

**Corolario 1.24** (Teorema de Lagrange). Dado  $g \in G$ , siendo  $G$  un grupo finito  $\Rightarrow \text{ord}(g)$  divide a  $|G|$  (cardinal de  $G$ ). Así, suponiendo  $|G|=p$  primo, los únicos subgrupos que tiene  $G$  son los triviales:  $\langle 1 \rangle, G$

**Teorema 1.25.** Si  $|G|=p$  primo  $\Rightarrow G$  es cíclico. Además, si  $|G|=n$ ,  $\forall g \text{ ord}(g) \text{ divide a } n \Rightarrow g^n = e$

**Teorema 1.26.** Si  $|G|=p^2$  con  $p$  primo  $\Rightarrow \exists g \in G \mid \text{ord}(g) = p$

**Demostración.** Tomamos  $g \in G \wedge g \neq e \Rightarrow \text{ord}(g) = p$  ó  $\text{ord}(g) = p^2$ . En el primer caso ya lo tenemos, vamos a por el segundo.  $\text{ord}(g)=p^2 \Rightarrow \text{ord}(g^p) = p$  □

**Teorema 1.27** (Teorema de Lagrange Bis). *Dados  $H < G \exists a_1, \dots, a_r \in G \setminus H$  /  $G = a_1H \cup a_2H \dots \cup a_rH \wedge a_iH \cap a_jH = \emptyset \forall i, j$ . Es decir,  $|G| = r|H|$*

Definimos ahora otra relación a partir de  $H < G$ :  $cd' \Leftrightarrow cd^{-1} \in H$ . La comprobación de que esto es una relación la omitiremos por ser trivial. En esta partición, el conjunto de elementos relacionados con  $d$  es:  $Hd = \{hd/h \in H\}$

**Definición 1.28**. Decimos que  $H < G$  es un subgrupo normal si  $aH = Ha \forall a$ . Por tanto, si  $G$  es un grupo abeliano,  $H$  también lo será y cualquier subgrupo será normal. Un subgrupo normal se expresa como  $H \triangleleft G$

Si  $H \triangleleft G$  podemos definir una estructura de grupo en el subconjunto de clases. Dados  $g_1H$  y  $g_2H$  podemos formar el conjunto  $\{h_1 * h_2 \setminus h_1 \in g_1H \wedge h_2 \in g_2H\}$ . Si operamos  $g_1H * g_2H = (g_1 * g_2)H$  que es otra clase. Por tanto el grupo de clases es cerrado. El neutro sería la caja  $H$  puesto que  $gH = gH$  para cualquier  $g$  que escojamos. Además el inverso de  $gH$  es  $g^{-1}H$ . Por último, vemos que  $(g_1H * g_2H) * g_3H = g_1H * g_2H * g_3H = g_1H * Hg_2 * g_3H = g_1H * Hg_3 * g_2H$ , por ser  $G$  asociativo. Queda probado pues, que el conjunto de las clases de equivalencia, forma un grupo.

**Teorema 1.29**. *Si definimos  $[G:H] = n^2$  de cajas=índice, tenemos:  $H < G \wedge [G:H] = 2 \Rightarrow H \triangleleft G$ .*

**Demostración.** Por un lado tenemos que  $g \notin H \Rightarrow gH = H^c$ . Por otro lado, si tomamos la otra relación de equivalencia, a partir de  $g \notin H$  obtenemos  $Hg = H^c$ . Uniendo estos dos ejemplos, donde mantenemos  $H$  como una mitad en ambos, tenemos  $Hg = gH$ . Por tanto  $H$  es un subgrupo normal □

**Lema 1.30.** Dadas dos particiones formadas por los subconjuntos  $aH$  y  $Ha$  para un elemento  $a \in G$  y con  $H < G$ , podemos definir dos aplicaciones  $\pi$  y  $\pi'$  que lleven cada elemento de  $G$  a su respectiva caja:

$$\pi : G \mapsto G/H$$

$$\pi' : G \mapsto G/H$$

Tenemos entonces que:

$$H \text{ subgrupo normal} \Rightarrow \text{la partición izquierda coincide con la derecha } (a_i H = H a_i)$$

$$H \text{ subgrupo normal} \Rightarrow \pi = \pi'$$

Además, si  $H$  es normal

1. Podemos definir una operación en el conjunto cociente.
2.  $\pi : G \mapsto G/H$  es compatible con las operaciones.

**Definición 1.31** . Llamamos centro del grupo  $G$  al grupo formado por todos los elementos que conmutan con todos los elementos de  $G$ :

$$Z(G) = \{a \in G \mid a * g = g * a \ \forall g \in G\}$$

Además, tenemos que:  $aZ(G) = Z(G)a \Rightarrow Z(G) \triangleleft G$



Dados un grupo  $G$  y un subconjunto no vacío  $S$ , defino  $S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$ .  
 Dados  $S_1, S_2 < G$ , defino  $(S_1 * S_2)^{-1} = \{s_1 * s_2 \mid s_1 \in S_1 \wedge s_2 \in S_2\} = \{s_1^{-1} * s_2^{-1} \mid s_1 \in S_1 \wedge s_2 \in S_2\} = \{s_1^{-1} * s_2^{-1} \mid s_1^{-1} \in S_1^{-1} \wedge s_2^{-1} \in S_2^{-1}\} = S_2^{-1} * S_1^{-1}$ .  
 Sea  $H$  un subgrupo de  $G$ , entonces  $H^{-1} = H$ .

**Teorema 1.32.** *Fijado un grupo  $G$  y  $H_1, H_2$  subgrupos de  $G$  entonces:  $H_1 \triangleleft G \Rightarrow H_1 * H_2 < G$ .*

*Demostración.* Sabemos que  $H_1 * H_2 = H_2 * H_1$ . Para ver que  $H_1 * H_2 < G$  hay que:

1. Cerrado por la operación:  $(H_1 * H_2) * (H_2 * H_1) = H_1 * (H_2 * H_1) * H_1 = H_1 * H_1 * H_2 * H_2 = H_1 * H_2$
2. Todo elemento, tiene inverso, es decir:  $\alpha \in H_1 * H_2 \Rightarrow \alpha^{-1} \in H_1 * H_2$ . Pero entonces tenemos:  $\alpha^{-1} \in (H_1 * H_2)^{-1} = H_2^{-1} * H_1^{-1} = H_2 * H_1 = H_1 * H_2 \supset \alpha$

□

**Teorema 1.33.**  *$H$  es un subgrupo normal si  $H < G$*

1.  $\forall a \in G, aH = Ha, aHa^{-1} = H$
2.  $\forall a \in G, aHa^{-1} \subset H$

*Demostración.*  $1 \iff 2$

$\forall a \in G, aHa^{-1} \subset H$  **COMPLETAR**

□

**Definición 1.34.** Sea  $f : (G_1, \cdot) \mapsto (G_2, *)$

La función  $f$  es un homomorfismo de grupos si  $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$

**Propiedades.** Si  $f : G_1 \mapsto G_2$  es un homomorfismo de grupos.

1.  $f(e_1) = e_2$  con  $e_1$  neutro de  $G_1$  y  $e_2$  neutro de  $G_2$
2.  $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$

*Demostración.*

1)  $e_1 \cdot e_1 = e_1$

$f(e_1) = f(e_1 \cdot e_1) = f(e_1) * f(e_1) \Rightarrow f(e_1) = e_2$

$$2) f(x \cdot x^{-1}) = f(e_1) = e_2$$

$$f(x) * f(x^{-1}) = e_2 \Rightarrow f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$$

□

**Teorema 1.35.**  $N(f)$  y  $Img(f)$  son subgrupos de  $G_1$  y  $G_2$  respectivamente. Con  $N(f)$  el núcleo de la aplicación y  $Img(f)$  la imagen de la misma.

*Demostración.*

$$1) N(f) < G$$

$$e_1 \in N(f)$$

$$x, y \in N(f) \Rightarrow xy^{-1} \in N(f)$$

$$f(xy^{-1}) = \underbrace{f(x)}_{e_2} \underbrace{f(y)^{-1}}_{e_2^{-1}} = e_2$$

$$2) Img(f) < G_2$$

$$i) e_2 \in Img(f) \Rightarrow e_2 = f(e_1)$$

$$ii) a \in Img(f) \Rightarrow a^{-1} \in Img(f)$$

$$\exists \alpha \in G_1 / a = f(\alpha) \Rightarrow a^{-1} = (f(\alpha))^{-1} = f(\alpha^{-1})$$

□

**Obsevación:**  $\underbrace{f(a) * f(a) * \dots * f(a)}_{t \text{ veces}} = f(\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{t \text{ veces}}) = f(e_1) = e_2$

Si  $G$  es un grupo finito  $\Rightarrow ord(f(a)) \mid ord(a) \forall a \in G_1$

**Obsevación:** El único homomorfismo de grupos de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  en  $\mathbb{Z}$  es el trivial.

**Lema 1.36.** La composición de dos homomorfismos de grupos es un homomorfismo de grupos.

*Definición 1.37 . Dado  $f : G_1 \mapsto G_2$  el núcleo de  $f$  se define como*

$$N(f) = \{a \in G_1 / f(a) = \underbrace{e_2}_{\text{Núcleo de } G_2}\}$$

Además  $N(f) = \{e_1\} \iff f$  es inyectiva.

*Definición 1.38 . Sea  $f : G_1 \mapsto G_2$  un homomorfismo de grupos*

*Diremos que  $f$  es un epimorfismo si  $Img(f) = G_2$*

*Diremos que  $f$  es un monomorfismo si  $N(f) = \{e_1\}$*

**Lema 1.39.** Cuando  $f$  es un homomorfismo de grupos

$$N(f) \triangleleft G_1$$

**Demostración.**  $\forall a \in G_1 \ aHa^{-1} \subset H$   
 $\forall a \in G_1 \ aN(f)a^{-1} = \{aha^{-1} \mid h \in N(f)\} \subset N(f)$

□

$$\underbrace{f(a) * f(a) * \dots * f(a)}_{t \text{ veces}} = f(\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{t \text{ veces}}) = f(e_1) = e_2$$

Si  $G$  es un grupo finito  $\Rightarrow \text{ord}(f(a)) \mid \text{ord}(a) \ \forall a \in G_1$

El único homomorfismo de  $\mathbb{Z}/n$  en  $\mathbb{Z}$ , y en general de un grupo finito a los enteros, es el trivial. Esto se debe a que dado  $a \in \mathbb{Z}/n$ ,  $\text{ord}(a)=\alpha$ , pero  $\text{ord}(f(a))$  será infinito, salvo que  $f(a)=0$ .

**Definición 1.40 .** Un homomorfismo  $f : G_1 \mapsto G_2$  es inyectivo si su núcleo es el 0. Estos homomorfismos se denominan monomorfismos

**Definición 1.41 .** Un homomorfismo  $f : G_1 \mapsto G_2$  es sobreyectivo si  $\text{Im}(f)=G_2$ . Estos homomorfismos se denominan epimorfismos

**Lema 1.42.**  $f : G_1 \mapsto G_2 \Rightarrow N(f) \triangleleft G_1$  .

**Demostración.** Basta con probar que  $aHa^{-1} \subset H$ , que equivale a decir  $aHa^{-1} = H$ .  
 Esto es:  $\forall a \in G_1 \ aN(f)a^{-1} \subset N(f)$ .  
 Tomamos  $f(aN(f)a^{-1}) = f(a)f(N(f))f(a^{-1}) = \alpha e_2 \alpha^{-1} = e_2$

□

Si  $N \triangleleft G$ , entonces  $G/N$  tiene estructura de grupo y  $\pi : G \mapsto G/N$  (homomorfismo que manda cada elemento a su 'caja' es un epimorfismo.

Dado  $f : G_1 \mapsto G_2 \ N=N(f)$ ,  $N \triangleleft G$ , entonces:  
 $b \in aN \Leftrightarrow a^{-1}b \in N \Leftrightarrow f(a^{-1}b) = e_2 \Leftrightarrow f(a)^{-1}f(b) = e_2 \Leftrightarrow f(a) = f(b)$

**Definición 1.43 .** Un homomorfismo de grupos  $f : G_1 \mapsto G_2$  es un isomorfismo si existe un homomorfismo de grupos  $g : G_2 \mapsto G_1$  tal que  $g \circ f = \text{id}_{G_1}$  y  $f \circ g = \text{id}_{G_2}$ .

**Obsevación:** Dados dos grupos  $G_1$  y  $G_2$

$f : G_1 \mapsto G_2$   $f$  es un isomorfismo de grupos  $\iff \left. \begin{array}{l} f \text{ es un homomorfismo} \\ f \text{ es una biyección de conjuntos} \end{array} \right\}$

**Lema 1.44.** Sea  $f : G_1 \longrightarrow G_2$ , entonces:

1. Si  $H_1$  es un subgrupo de  $G_1 \Rightarrow f(H_1) < G_2$
2. Si  $H_2 < G_2 \Rightarrow f^{-1}(H_2) < G_1$
3. Si  $H_2 \triangleleft G_2 \Rightarrow f^{-1}(H_2) \triangleleft G_1$
4. Si  $f$  es sobreyectiva y  $H_1 \triangleleft G_1 \Rightarrow f(H_1) \triangleleft G_2$

*Demostración.*

1.  $e_2 \in f(H_1)$   
 $x, y \in f(H_1) \Rightarrow xy^{-1} \in f(H_1)$   
 $x = f(a); y = f(b); a, b \in H_1$   
 $xy^{-1} = f(a)f(b)^{-1} = \underbrace{f(ab^{-1})}_{H_1} \in f(H_1)$
2.  $e_1 \in f^{-1}(H_2)$   
 $a, b \in f^{-1}(H_2) \Rightarrow ab^{-1} \in f^{-1}(H_2)$   
 $f(a) \in H_2$  y  $f(b) \in H_2 \Rightarrow \underbrace{f(ab^{-1})}_{f(a)f(b)^{-1}} \in H_2$
3.  $f^{-1}(H_2) = N(\pi \circ f)$  Como  $f^{-1}(H_2)$  es el núcleo de  $h$  de  $g$  entonces  $f^{-1}(H_2) \triangleleft G_1$

□