Fracturi, lovituri și entorse

Fracturile, loviturile și entorsele sunt printre cele mai frecvente leziuni apărute în urma accidentelor, căderilor sau mișcărilor bruște. Acestea pot varia de la forme ușoare până la situații grave, care necesită intervenție medicală imediată.

Cunoașterea modului de recunoaștere și acordare a primului ajutor este esențială pentru a preveni agravarea leziunilor și pentru o recuperare mai rapidă.

Ce sunt fracturile, loviturile și entorsele

- O fractură reprezintă ruperea totală sau parțială a unui os. Aceasta poate fi închisă sau deschisă, în funcție de afectarea pielii.
- Loviturile (contuziile) sunt leziuni ale țesuturilor moi, fără afectarea osului, apărute în urma unui impact direct.
- Entorsele apar atunci când ligamentele unei articulații sunt întinse sau rupte, de obicei în urma unei mișcări bruște sau a unei răsuciri. Cele mai frecvente sunt entorsele de gleznă.

Semne și simptome

Fracturile se manifestă prin durere intensă, deformarea zonei afectate, imposibilitatea de mișcare și umflături. Uneori pot apărea sângerări sau poziții anormale ale membrului.

Loviturile se manifestă prin durere locală, umflare și apariția vânătăilor.
Entorsele se caracterizează prin durere la nivelul articulației, umflare, dificultate la mișcare și uneori instabilitate a articulației.

Pericolele acestor leziuni

Fracturile pot deveni periculoase dacă sunt mișcate, putând afecta vasele de sânge sau nervii. În cazul fracturilor deschise există și risc de infecție.

Entorsele netratate pot duce la slăbirea articulației și la accidente repetate. Chiar dacă par mai ușoare, acestea necesită atenție. Loviturile pot ascunde leziuni mai grave, mai ales dacă durerea persistă.

Primul ajutor în caz de fracturi

În cazul unei fracturi, zona afectată trebuie imobilizată imediat, folosind atele sau obiecte rigide. Persoana nu trebuie mișcată inutil.

Dacă există sângerare, aceasta trebuie oprită prin aplicarea unui pansament. Este necesară solicitarea ajutorului medical cât mai rapid.

Primul ajutor în caz de lovituri

Zona afectată trebuie menținută în repaus. Aplicarea unei comprese reci ajută la reducerea durerii și a inflamației. Este importantă monitorizarea evoluției. Dacă simptomele se agravează, trebuie consultat un medic.

Primul ajutor în caz de entorse

În cazul entorselor, este important să se evite sprijinirea pe articulația afectată. Se recomandă repausul și aplicarea de comprese reci pentru a reduce umflătura. Articulația poate fi bandajată elastic pentru susținere, iar membrul afectat trebuie menținut ridicat, dacă este posibil.

Ce trebuie evitat

Nu trebuie încercată repoziționarea oaselor în cazul fracturilor. De asemenea, nu trebuie aplicată căldură imediat după accident, deoarece aceasta poate agrava inflamația.