

Теория автоматов и формальных языков

Регулярные языки

Лектор: Екатерина Вербицкая

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

13 сентября 2016г.

- Формальные языки повсюду. Язык — множество строк над алфавитом
- Существует множество способов описать язык
- Задачи теории формальных языков
 - ▶ Как представить язык?
 - ▶ Какие есть характеристики у разных представлений языка?
 - ▶ Как определить, принадлежит ли строка данному языку?

В предыдущей серии

- Формальная грамматика
 - ▶ \langle Терминалы, Нетерминалы, Правила, Стартовый нетерминал \rangle
 - ▶ Однозначность (любая строка имеет единственный вывод) и неоднозначность
- Вывод: транзитивное и рефлексивное замыкание отношения выводимости
 - ▶ Левосторонний (на каждом шаге заменяем самый левый нетерминал) и правосторонний
- Дерево вывода
 - ▶ Дерево: листья соответствуют терминалам, внутренние вершины — нетерминалам; для каждого внутреннего узла существует правило грамматики, правая часть которого совпадает с метками детей узла
- Контекстно-свободная грамматика
 - ▶ все правила имеют вид $A \rightarrow \alpha$

Регулярная грамматика

Праволинейная грамматика — грамматика, все правила которой имеют следующий вид:

- $A \rightarrow aB$ или $A \rightarrow a$, где $A, B \in V_N, a \in V_T$

Левوليнейная грамматика — грамматика, все правила которой имеют следующий вид:

- $A \rightarrow Ba$ или $A \rightarrow a$, где $A, B \in V_N, a \in V_T$

Регулярная грамматика

Праволинейная грамматика — грамматика, все правила которой имеют следующий вид:

- $A \rightarrow aB$ или $A \rightarrow a$, где $A, B \in V_N, a \in V_T$

Левوليнейная грамматика — грамматика, все правила которой имеют следующий вид:

- $A \rightarrow Ba$ или $A \rightarrow a$, где $A, B \in V_N, a \in V_T$

Теорема

Пусть L — формальный язык.

$\exists G_r$ — праволинейная грамматика, т.ч. $L = L(G_r) \Leftrightarrow \exists G_l$ — левوليнейная грамматика, т.ч. $L = L(G_l)$

Регулярная грамматика

Праволинейная грамматика — грамматика, все правила которой имеют следующий вид:

- $A \rightarrow aB$ или $A \rightarrow a$, где $A, B \in V_N, a \in V_T$

Левوليнейная грамматика — грамматика, все правила которой имеют следующий вид:

- $A \rightarrow Ba$ или $A \rightarrow a$, где $A, B \in V_N, a \in V_T$

Теорема

Пусть L — формальный язык.

$\exists G_r$ — праволинейная грамматика, т.ч. $L = L(G_r) \Leftrightarrow \exists G_l$ — левوليнейная грамматика, т.ч. $L = L(G_l)$

Регулярная грамматика — праволинейная или левوليнейная грамматика


Конечный автомат — $\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

- $Q \neq \emptyset$ — конечное множество состояний
- Σ — Конечный входной алфавит
- δ — отображение типа $Q \times \Sigma \rightarrow Q$
- $q_0 \in Q$ — начальное состояние
- $F \subseteq Q$ — множество конечных состояний

Пример конечного автомата

$Q = \{0, 1, 2, 3\}, \Sigma = \{0, 1, -\}, q_0 = 0, F = \{1, 2\}$

$\delta(0, 0) = 1; \delta(0, 1) = 2; \delta(0, -) = 3; \delta(3, 1) = 2; \delta(2, 0) = 2; \delta(2, 1) = 2$




Путь в конечном автомате

- Путь — кортеж $\langle q_0, e_1, q_1, \dots, e_n, q_n \rangle$
 - ▶ $n \geq 0$
 - ▶ $\forall i. e_i = \langle q_{i-1}, w_i, q_i \rangle \in \delta$
 - ▶ q_0 — **начало** пути
 - ▶ q_n — **конец** пути
 - ▶ w_0, w_1, \dots, w_n — **метка** пути
 - ▶ n — **длина** пути
- Путь **успешен**, если q_0 — начальное состояние, а $q_n \in F$
- Состояние q **достижимо** из состояния p , если существует путь из состояния p в состояние q

Пример пути

$\langle 0, \langle 0, ' - ', 3 \rangle, 3, \langle 3, ' 1 ', 2 \rangle, 2, \langle 2, ' 1 ', 2 \rangle, 2, \langle 2, ' 0 ', 2 \rangle, 2 \rangle$ — успешный путь с меткой “-110” длины 4



Такт работы КА (шаг)

- Конфигурация (Мгновенное описание) КА — $\langle q, \omega \rangle$, где $q \in Q, \omega \in \Sigma^*$
- Такт работы — бинарное отношение \vdash : если $\langle p, x, q \rangle \in \Delta$ и $\omega \in \Sigma^*$, то $\langle p, x\omega \rangle \vdash \langle q, \omega \rangle$
- Бинарное отношение \vdash^* — рефлексивное, транзитивное замыкание \vdash

- Цепочка ω **распознается** КА, если \exists успешный путь с меткой ω
- **Язык, распознаваемый конечным автоматом:**
 $\{\omega \in \Sigma^* \mid \exists p \text{ — успешный путь с меткой } \omega\}$

Теорема

Рассмотрим конечный автомат $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$. Слово $\omega \in \Sigma^$ принадлежит языку $L(M) \Leftrightarrow \exists q \in F. \langle q_0, \omega \rangle \vdash^* \langle q, \varepsilon \rangle$.*

Распознавание слова конечным автоматом

Обобщаем функцию перехода:

- $\delta'(q, \varepsilon) = q$
- $\delta'(q, xa) = \delta(\delta'(q, x), a)$, где $x \in \Sigma^*$, $a \in \Sigma$

Теорема

Цепочка ω *распознается* КА $\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle \Leftrightarrow \exists p \in F. \delta'(q_0, \omega) = p$

Язык, распознаваемый конечным автоматом:

$$\{\omega \in \Sigma^* \mid \exists p \in F. \delta'(q_0, \omega) = p\}$$

Свойство конкатенации строк

Теорема

$$\langle q_1, \alpha \rangle \vdash^* \langle q_2, \varepsilon \rangle, \langle q_2, \beta \rangle \vdash^* \langle q_3, \varepsilon \rangle \Rightarrow \langle q_1, \alpha\beta \rangle \vdash^* \langle q_3, \varepsilon \rangle$$

- Конечные автоматы A_1 и A_2 эквивалентны, если распознают один и тот же язык
- Как проверить что автоматы эквиваленты?

- Запустить обход в ширину

- **Минимальный конечный автомат** — автомат, имеющий наименьшее число состояний, распознающий тот же язык, что и данный

Классы эквивалентности

Отношение эквивалентности — рефлексивное, симметричное, транзитивное отношение

- $xRx; xRy \Leftrightarrow yRx; xRy, yRz \Rightarrow xRz$

Теорема

$\forall R$ — отношение эквивалентности на множестве S

Можно разбить S на k непересекающихся подмножеств $I_1 \dots I_k$, т.ч.

$$aRb \Leftrightarrow a, b \in I_j$$

Множества $I_1 \dots I_k$ называются **классами эквивалентности**

Эквивалентные состояния

- $\omega \in \Sigma^*$ различает состояния q_i и q_j , если $\delta'(q_i, \omega) = t_1, \delta'(q_j, \omega) = t_2 \Rightarrow (t_1 \notin F \Leftrightarrow t_2 \in F)$
- q_i и q_j эквивалентны ($q_i \sim q_j$), если $\forall \omega \in \Sigma^*. \delta'(q_i, \omega) = t_1, \delta'(q_j, \omega) = t_2 \Rightarrow (t_1 \in F \Leftrightarrow t_2 \in F)$
 - Является отношением эквивалентности

Лемма

$\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle, p_1, p_2, q_1, q_2 \in Q, q_i = \delta(p_i, c)$
 $\omega \in \Sigma^*$ различает q_1 и q_2 . Тогда $c\omega$ различает p_1 и p_2

Доказательство

$$\delta'(p_i, c\omega) = \delta'(\delta(p_i, c), \omega) = \delta'(q_i, \omega) = t_i$$





















