

# Неделя 3

21 September 2023

11:35

## Уравнение переноса

$$\partial_t \rho + u(t, x) \partial_x \rho = 0,$$

где функция  $u(t, x)$  задана, а функция  $\rho \equiv \rho(t, x)$  - неизвестная плотность.

Рассмотрим траектории  $x(t)$ , на которых плотность остается постоянной:

$$\rho(t, x(t)) = \text{Const}$$

Продифференцируем  $\rho(t, x(t)) = \text{Const}$  по времени:

$$\partial_t \rho + \partial_x \rho \cdot d_t x = 0$$

$$d_t x = -\frac{\partial_t \rho}{\partial_x \rho} = u(t, x)$$

Например,  $u(t, x) = c$

$$d_t x(t) = c,$$

$$x(t) = ct + x_0$$

Например,  $u(t, x) = ax + b$

$$d_t x(t) = ax + b$$

$$\frac{dx}{ax + b} = dt$$

$$\frac{1}{a} \log|ax + b| = t + C$$

$$ax + b = \pm e^{at+ac}$$

$$x(t) = C_1 e^{at} - \frac{b}{a}$$

$$x(0) = x_0$$

$$x(t) = C_1 - \frac{b}{a} = x_0 \Rightarrow C_1 = x_0 + \frac{b}{a}$$

$$x(t) = \left(x_0 + \frac{b}{a}\right) e^{at} - \frac{b}{a}$$

## Уравнение неразрывности

$$\partial_t \rho + u(t, x) \partial_x \rho = -\rho \partial_x u(t, x)$$

Характеристики:

$$d_t x = u(t, x)$$

Плотность вдоль "вот этих самых" характеристик:  $\rho(t, x(t))$

Продифференцируем плотность вдоль характеристик по времени:

$$\partial_t \rho + \partial_x \rho \cdot d_t x = \partial_t \rho + \partial_x \rho \cdot u(t, x)$$

А значит:

$$d_t \rho = -\rho \partial_x u(t, x)$$

$$\frac{d_t \rho}{\rho} = -\partial_x u(t, x)$$

$$\log \left| \frac{\rho}{\rho_0} \right| = - \int_0^t \partial_x u(s, x(s)) ds$$

$$\rho(t) = \rho_0 \cdot e^{-\int_0^t \partial_x u(s, x(s)) ds}$$