



Parazitoze cutanate

Scabia



- Sarcoptes scabiae - acarian
- Ciclu cutanat:
(Femela fecundata-paraziteaza tegumentul uman (animal), sapă un tunel unidirectional în stratul cornos, depune ouăle, →larve, nimfe, → suprafata tegumentului, fecundare, masculul moare)

Scabia



- Afectiune ubiquitara, incidenta crește în cicluri de 20-25 ani, (chiar in conditii de igiena foarte bune)
- Transmitere contact direct (contact intim), indirect (obiecte infestate) în care parazitul traieste 3-4 zile
- Copii si adulti
- Conditii precare de igienă
- Incubatia: 3-4 saptamâni

Scabia

Clinic: adult: papule
eritematoase pruriginoase cu
topografie tipica:

- interdigital, zona metacarpiana anterioara, axile, torace, abdomen, fata interna a coapselor, zona subfesiera, teaca penisului
- Respecta fața!!!



Scabia

Șanțul acarian:

- 2-5 mm, liniar
- vezicula perlată,
- intens pruriginoasă



Scabia

Sugari si copii mici:
leziuni palmare, plantare,
fața și spate



Scabia



- **Pruritul** este caracteristic cu accentuare vesperală
- Diagnosticul clinic susținut de ancheta epidemiologica: aparitia pruritului nocturn în familie sau colectivitate

Forme clinice particulare de scabie:

- **Scabia incognita:** persoane cu igiena foarte buna si leziuni minimale, tratate anterior cu dermocorticoizi, necesita proba terapeutica
- **Scabia norvegiana:** forma intens contagioasa, imunodeprimati, cruste purulente groase, leziuni diseminate, acral, scalp, trunchi

Noduli post-scabioși

- Adulți: teaca penisului, papule sau noduli persistenți, discret pruriginosi după un episod de scabie
- copii
- Reacția imunologică la prezența cutanată a parazitului
- Dermocorticoizi/antihistaminice



Tratament

- Local: unguent cu sulf 5-10%, lindan 1% (adulti), Benzoat de benzil 25% (adulti si copii) 2 aplicatii consecutive seara
- Recent: permetrine: (Elimite 5% crema) o aplicatie seara si Crotamiton 10% (Eurax): 3 aplicatii zilnice consecutive
- Dezinsectia lenjeriei si efectelor personale (lindan /spalare 60 grade/ aerisire 4-5 zile)
- Evitarea aplicatiilor de dermatocorticoizi in cazuri neclare!!!

Pediculoza



- Pediculus hominis: variante P. capitis, P. vestimenti și Phtirus pubis
- Insecte hematofage, 1-2 mm lungime, culoare galben-gri, mobile
- Pediculoza **scalpului**
- Pediculoza **corpului**
- Pediculoza **pubiana**

Pediculoza scalpului

- Transmitere: contact direct sau indirect
- Colectivitati de copii (vacante)
- Zona occipitala, papulo-vezicule eritematoase, prurit intens, leziuni de grataj impetiginizate
- Lindini (structuri aderente de firul de par, chitinoase, conțin ouăle parazitului)





Pediculoza de corp



- Adulti, conditii de viata precare, catastrofe naturale, refugiați
- Vector pentru alte infectii: tifos exantematic
- Paraziteaza hainele si temporar tegumentul (hrănire)
- Papulo-vezicule pruriginoase gratate, ceafa, umeri si spate, suprainfectie secundara


Pediculoza pubiană

- Adulti, contact sexual (BTS minoră)
- Zona pubiana, prurit, papulo-vezicule gratate, macule cerulee, lindini, parazitul fixat de firele de par



Pediculoza pubiana

- Fara tratament: extensie zona abdominala, torace, barba, mustata, gene, sprâncene
- Copii: gene, sprâncene!!!



Tratamentul pediculozelor

Tratament local:

- Lindan 1% -3% : parazitul adult: 3 zile consecutiv, repetat după o saptamina, nu are efect ovocid
- permetrine sau malathion: o singura aplicatie, ovocide (Pedex 3% sau Paraplus)
- Uleiuri volatile/silicon
- Indepartarea lindinilor (apa acidulata cu acid acetic, pieptene des)
- Igiena riguroasa, schimbarea hainelor