

离散数学作业 Problem Set 10

Problem 1

证明：如果 n 是一个大于 6 的整数，则 $3^n < n!$ 。

Problem 2

试证明：正整数 n 和 n^5 的最后一位必相同。

Problem 3

通过数学归纳法证明：当 $n > 3$ 时， n 边凸多边形的对角线数目为 $\frac{1}{2}n(n-3)$ 。

Problem 4

用强归纳法证明：任意正整数 n 都可以写成 2 的不同幂次之和，即可以写成整数的一个子集 $2^0 = 1, 2^1 = 2, 2^2 = 4$ 等的和。（提示：对归纳步骤，分别考虑 $k+1$ 是偶数和奇数时的情况。当 $k+1$ 是偶数时，注意 $(k+1)/2$ 是整数）

Problem 5

- 给出计算位串 s 中 1 的个数的函数 $ones(s)$ 的递归定义。
- 用结构归纳法证明 $ones(s \cdot t) = ones(s) + ones(t)$ 。（其中 $s \cdot t$ 表示位串 s 和位串 t 的连接）

Problem 6

- a) 对于表示十进制数字的非空字符串 s , 给出计算 s 中最小数字的函数 $m(s)$ 的递归定义。
- b) 用结构归纳法证明 $m(s \cdot t) = \min(m(s), m(t))$ 。(其中 $s \cdot t$ 表示位串 s 和位串 t 的连接)

Problem 7

正整数 n 的分拆是把 n 写成正整数之和的方式。例如, $7 = 3 + 2 + 1 + 1$ 是 7 的分拆。设 P_m 等于 m 的不同分拆的数目, 其中和式里项的顺序无关紧要, 并设 $P_{m,n}$ 是用不超过 n 的正整数之和来表示 m 的不同方式数。

- a) 证明: $P_{m,m} = P_m$ 。
- b) 证明: 下面的 $P_{m,n}$ 的递归定义是正确的。

$$P_{m,n} = \begin{cases} 1 & m = 1 \\ 1 & n = 1 \\ P_{m,m} & m < n \\ 1 + P_{m,m-1} & m = n > 1 \\ P_{m,n-1} + P_{m-n,n} & m > n > 1 \end{cases}$$

- c) 用这个递归定义求出 5 和 6 的拆分数。

Problem 8

定义二元集合 $M \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:

- a) $(3, 2) \in M$ 。
- b) 如果 $(x, y) \in M$, 则 $(3x - 2y, x) \in M$ 。

集合 M 仅包含上述步骤生成的元素。

使用结构归纳证明 M 中的元素可以用 $(2^{k+1} + 1, 2^k + 1)$ 的形式表示, 其中

k 是一个自然数。

Problem 9 (请自学5.4节后尝试解答)

给出字符串的倒置的递归算法。(一个字符串的倒置 (反转), 是由原字符串里的符号以相反顺序组成的字符串。把字符串 w 的倒置表示为 w^R 。)