

Практическое занятие №49. Решение систем уравнений

Уравнения и системы уравнений с двумя переменными. *Уравнение с двумя переменными* x и y записывается в виде $f(x, y) = 0$, где f — выражение с переменными x и y . *Решением* такого *уравнения* называется упорядоченная пара чисел $(x_0; y_0)$, при подстановке которых в данное уравнение получается верное числовое равенство $f(x_0; y_0) = 0$.

Уравнение с двумя переменными имеет бесконечное множество решений.

Система уравнений с двумя переменными в общем виде записывается так:

$$\begin{cases} f(x, y) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

Решением системы уравнений называется упорядоченная пара чисел, являющихся решением каждого из уравнений, входящих в систему.

Две системы уравнений называются *равносильными*, если множества решений этих систем совпадают.

Рассмотрим четыре системы:

$$1) \begin{cases} x^2 + y^2 = 25, \\ x - y = 1; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ x^2 + y = 3; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{3}{y} = 2, \\ xy = 3; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} 2x + 3y = 4xy, \\ x + y = \frac{3}{2}xy. \end{cases}$$

1. Метод подстановки

Второе уравнение в системах можно решить относительно y , т. е. преобразовать к виду $y = f(x)$:

$$1) x - y = 1 \Leftrightarrow y = x - 1;$$

$$2) x^2 + y = 3 \Leftrightarrow y = 3 - x^2;$$

$$3) xy = 3 \Leftrightarrow y = \frac{3}{x};$$

$$4) x + y = \frac{3}{2}xy \Leftrightarrow y = \frac{x}{\frac{3}{2}x - 1}.$$

Подставляя $y = f(x)$ в первое уравнение систем, получим уравнение с одним неизвестным:

$$1) x^2 + (x - 1)^2 = 25;$$

$$2) x^2 + (3 - x^2)^2 = 5;$$

$$3) \frac{1}{x} + x = 2;$$

$$4) 2x + \frac{3x}{\frac{3}{2}x - 1} = 4x \frac{x}{\frac{3}{2}x - 1}.$$

Решая уравнение, находим его корни — значения неизвестного x , а затем для каждого из них — соответствующее значение y по формуле $y = f(x)$:

$$1) \begin{cases} x_1 = 4, \\ y_1 = 3; \end{cases} \begin{cases} x_2 = -3, \\ y_2 = -4; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x_1 = 1, \\ y_1 = 2; \end{cases} \begin{cases} x_2 = -1, \\ y_2 = 2; \end{cases}$$


$$\begin{cases} x_3 = 2, \\ y_3 = -1; \end{cases} \begin{cases} x_4 = -2, \\ y_4 = -1; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x = 1, \\ y = 3; \end{cases}$$


$$4) \begin{cases} x_1 = 0, \\ y_1 = 0; \end{cases} \begin{cases} x_2 = 1, \\ y_2 = 2. \end{cases}$$

2. Использование графика. Каждое из уравнений системы можно рассматривать как уравнение кривой. Поэтому решения системы двух уравнений с двумя неизвестными можно интерпретировать как координаты точек пересечения двух кривых.


1)




2)



3)



4)



3. Линейные системы. В математике и ее приложениях большую роль играют системы линейных уравнений. Любую такую систему можно решить способом подстановки. Выражая из одного уравнения системы одно неизвестное и подставляя в другие уравнения системы, мы уменьшим число уравнений и неизвестных системы, сохраняя ее линейность.

4. Симметричные системы. Система уравнений называется симметричной, если она составлена из выражений, симметричных относительно неизвестных:

- 1) $x^2 + y^2$;
- 2) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$;
- 3) $(x - y)^2$;
- 4) $x^3 + y^3$;
- 5) $\frac{x-1}{y} + \frac{y-1}{x}$;
- 6) $x + y + z$;
- 7) $xy + yz + zx$;
- 8) xyz и т. д.

Возьмем две буквы x и y .

Два выражения — их сумма $u = x + y$ и произведение $v = xy$ — являются основными симметричными выражениями относительно x и y .

Другие симметричные выражения можно выразить через u и v :

- 1) $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = u^2 - 2v$;
- 2) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy} = \frac{u}{v}$;
- 3) $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 + y^2 - xy) = u(u^2 - 3v)$.

2. Системы показательных уравнений. Решение систем показательных уравнений основано на свойствах показательной и логарифмической функций. При этом часто используются метод подстановки и алгебраическое сложение. Рассмотрим несколько примеров решения систем показательных уравнений.

Пример 2.13

Решить систему
$$\begin{cases} 3^x \cdot 5^y = 75, \\ 3^y \cdot 5^x = 45. \end{cases}$$

Решение

Перепишем данную систему в виде

$$\begin{cases} 3^x \cdot 5^y = 3 \cdot 5^2, \\ 3^y \cdot 5^x = 3^2 \cdot 5. \end{cases}$$

Перемножив уравнения системы, получим

$$(3^{x+y} \cdot 5^{x+y} = 3^3 \cdot 5^3) \Leftrightarrow (15^{x+y} = 15^3) \Leftrightarrow (x + y = 3).$$

Разделив первое уравнение на второе, получим

$$(3^{x-y} \cdot 5^{y-x} = 3^{-1} \cdot 5) \Leftrightarrow ((3/5)^{x-y} = (3/5)^{-1}) \Leftrightarrow (x - y = -1).$$

Решение данной системы сводится к решению равносильной ей системы

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = -1. \end{cases}$$

В результате получаем $x = 1, y = 2$.

Решить систему $\begin{cases} 3^x \cdot 3^y = 27, \\ 3^x + 3^y = 12. \end{cases}$

$$\begin{cases} 9^{x+y} = 729, \\ 3^{x-y-1} = 1; \end{cases}$$

а) $\begin{cases} x + y = \pi, \\ \cos x - \cos y = 1; \end{cases}$

в) $\begin{cases} x + y = \pi, \\ \sin x + \sin y = 1; \end{cases}$

а) $\begin{cases} 2\sqrt{x} - \sqrt{y} = 5, \\ \sqrt{x}\sqrt{y} = 3; \end{cases}$

в) $\begin{cases} \sqrt{x} + 3\sqrt{y} = 10, \\ \sqrt{x}\sqrt{y} = 8; \end{cases}$

Глава 12 «Элементы теории вероятности и математической статистики», учебник Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учеб. для студ. учреждений сред.проф. образования/ М.И. Башмаков. – 4-е изд.,стер. – М. : ИЦ «Академия», 2017, - 256 с.

В случае отсутствия печатного издания, Вы можете обратиться к Электронно-библиотечной системе.

Список использованных интернет-ресурсов:

1. <https://urait.ru/>
2. <https://23.edu-reg.ru/>