



UNIVERSIDAD NACIONAL
**TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS**



CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE NEMÁTODOS FITOPARÁSITOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE ROCOTO (*Capsicum pubescens*) EN RODRÍGUEZ DE MENDOZA Y CHACHAPOYAS, AMAZONAS.


Docente: FLAVIO LOZANO ISLA

Ingeniería Agrónoma, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza De Amazonas (UNTRM), Perú.

Autor de correspondencia: Santillan Puerta Alexander

2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

El rocoto (*Capsicum pubescens*) es una planta herbácea perenne originaria de la región andina del Perú, donde crece tanto en estado silvestre como cultivado, principalmente en la sierra y selva alta, a diferencia de otras especies del género *Capsicum*, el rocoto se distingue por sus flores de color púrpura y sus semillas negras, este fruto; caracterizado por su intenso picor (Hernández-Amasifuen et al., 2021).



En la provincia de Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, en la región de Amazonas, el cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) enfrenta serios problemas debido a la presencia de nemátodos fitoparásitos.

Este problema no solo afecta a los productores, sino también a la economía local, ya que el rocoto es una fuente clave de ingresos para las familias de la zona.

¿Cuál es la caracterización morfológica de los nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, Amazonas?

3. OBJETIVO GENERAL

Caracterizar e identificar morfológicamente los principales nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, Amazonas y determinar su impacto en el desarrollo de este cultivo.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- ❑ Identificar y caracterizar morfológicamente los géneros de nemátodos fitoparásitos presentes en el cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) mediante técnicas microscópicas.
- ❑ Determinar la incidencia de los nemátodos fitoparásitos en las parcelas de rocoto (*Capsicum pubescens*) a partir de muestreos aleatorios.
- ❑ Evaluar el impacto de los nemátodos fitoparásitos sobre el desarrollo radicular de rocoto (*Capsicum pubescens*) mediante pruebas de patogenicidad en plantas inoculadas bajo condiciones controladas, midiendo parámetros como longitud radicular.



4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN


Los nemátodos fitoparásitos son organismos microscópicos que, aunque de tamaño diminuto, tienen un impacto significativo en la agricultura. Se encuentran distribuidos globalmente y son responsables de pérdidas importantes en cultivos agrícolas debido a su capacidad para infectar las raíces, lo que afecta la absorción de agua y nutrientes, y en algunos casos incluso puede llevar a la muerte de las plantas, entre los nemátodos más relevantes se encuentran los géneros *Meloidogyne*, *Pratylenchus*, *Rodopholus*, y *Heterodera*, los cuales son conocidos para causar agallas, necrosis y deformaciones en las raíces de diversas plantas (Crozzoli P., 2014).

Un estudio realizado por Coyne et al. (2007), en el que se abordaron diversas especies de nemátodos fitoparásitos, destacó la dificultad en la identificación de estos organismos en campo, debido a que los daños que ocasiona son a menudo inespecíficos y pueden confundirse con otros problemas bióticos o abióticos, este estudio señaló que la reducción global de la producción agrícola atribuida a los nemátodos es cercana al 11% lo que refleja la magnitud del problema.



4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN


En la región occidental de Nicaragua, estudios han identificado la presencia y dinámica poblacional de nemátodos fitoparásitos en el cultivo de tomate Salazar Antón & Guzmán Hernández (2013) llevaron a cabo un estudio en los departamentos de León y Chinandega durante el ciclo agrícola 2010 - 2011, donde muestrearon cinco plantaciones por departamento. Se realizaron ocho muestreos en cada plantación, totalizando 80 muestras. Los resultados revelaron que las especies más frecuentes por cada 100 gramos de suelo fueron *Meloidogyne* spp. con 739 individuos, *Pratylenchus* con 555, *Tylenchorhynchus* con 386 y *Helicotylenchus* con 252.



En un estudio realizado por Caballero Mairesse et al. (2021) en el departamento de Cordillera, Paraguay, se identificaron varios nemátodos fitoparásitos asociados a solanáceas cultivadas, como tomate, tomate cherry y pimiento. A través de la extracción de muestras de suelo y el análisis de la diversidad de nemátodos, se detectaron diez géneros de fitonemátodos, entre ellos *Meloidogyne*, *Tylenchorhynchus*, *Helicotylenchus*, y *Pratylenchus*, siendo *Tylenchorhynchus* el más frecuente, con una alta abundancia de hasta 784 individuos por 100 cm³ de suelo.

4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En su estudio, Guzmán Piedrahita et al. (2012) describen los principales nemátodos fitoparásitos y los síntomas que ocasionan en cultivos de importancia económica, incluyendo los daños a las raíces y los tejidos aéreos de diversas plantas. Según los autores, los nematodos fitoparásitos son responsables de importantes pérdidas económicas en cultivos como papa, tomate, banano, yuca y varios frutales, causando entre un 11% y un 14% de pérdidas anuales.



El cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en la provincia de Oxapampa, Perú, enfrenta desafíos significativos debido a la presencia de plagas, como los ácaros (*Tetranychus sp.*) y nemátodos (*Meloidogyne spp.* y *Pratylenchus spp.*), que afectan las raíces y el crecimiento de las plantas, estos problemas, junto con el uso extendido de agroquímicos como piretroides y fungicidas, han generado preocupaciones sobre la acumulación de metales pesados, como plomo y cadmio, en los frutos, lo que podría comprometer la salud humana (Soto Pecho et al., 2023).

4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En la región Amazonas, estudios sobre nematodos fitoparásitos han revelado su impacto en diversos cultivos agrícolas, entre ellos el café y la piña. En particular, la investigación realizada en la provincia de Rodríguez de Mendoza ha identificado varios géneros de nematodos asociados al cultivo de piña, destacando *Helicotylenchus* como el más frecuente tanto en suelos como en raíces, seguido por *Pratylenchus* y *Meloidogyne* (Vera et al., 2017).



Por otro lado, en el distrito de Cuispes, provincia de Bongará, se ha llevado a cabo un estudio centrado en el café (*Coffea arabica*), donde se identificaron diez géneros de nematodos fitoparásitos, entre ellos, *Meloidogyne* y *Pratylenchus* fueron los más prevalentes, con *Meloidogyne* presentando las mayores densidades poblacionales, además, se observó que la textura del suelo influye significativamente en la población de estos nematodos, destacando los suelos franco arenosos como los más favorables para el crecimiento de *Meloidogyne* (Heredia, et al., 2015).

5. HIPÓTESIS

Se plantea que en el cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en la provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas, existen diferentes géneros de nemátodos fitoparásitos asociados, los cuales afectan el desarrollo y productividad del cultivo, por lo tanto, se espera identificar y caracterizar morfológicamente estos nemátodos para comprender su presencia e impacto en la zona de estudio.



6. METODOLOGÍA

6.1. Área de estudio

La presente investigación involucrará actividades en campo en la provincia de Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, como también en el Laboratorio de Investigación en Sanidad Vegetal (LABISANV),



6.2. Población, muestra y muestreo

Población: compuesta por todas las parcelas de rocoto (*Capsicum pubescens*) productivas no menor de cinco años del anexo de Izcuchaca (Molinopampa – Chachapoyas), los distritos de San Antonio y San José (Rodríguez de Mendoza)

Muestra: Estará compuesta por 25 plantas de rocoto (*Capsicum pubescens*) por parcela.

Muestreo: Para la identificación de nematodos fitoparásitos se realizará un muestreo aleatorio, donde se recolectarán muestras de plantas que no estén al borde del perímetro, recolectando un total de 25 muestras por parcela.

METODOLOGÍA

6.3. Variable del estudio

Variable independiente

- Parcelas de rocoto
- Géneros de nemátodos fitoparásitos.

Variable dependiente

- Incidencia de nemátodos.
- Caracteres morfológicos de nematodos.
- Crecimiento radicular.
- Altura de planta.
- Número de hojas.
- Diámetro del tallo.
- Número de raíces.
- Longitud de raíces.



6.4. Métodos

6.4.1. Tipo y nivel de la investigación

Este trabajo corresponde a una investigación prospectiva, ya que se orienta a la observación de la dinámica de los nemátodos fitoparásitos en el cultivo de rocoto y su impacto en el desarrollo y rendimiento de la planta. Se pretende predecir y analizar los efectos futuros de la presencia de estos organismos en las parcelas a lo largo del tiempo, permitiendo la identificación de patrones y evaluación de posibles estrategias de manejo.

METODOLOGÍA

6.4. Métodos

6.4.2. Diseño de la investigación

Para desarrollar el objetivo tres, determinar el impacto de nemátodos fitoparásitos en el desarrollo radicular de la planta mediante prueba de patogenicidad, el estudio empleará un Diseño de Bloques Completos Aleatorios (DBCA) para analizar las plántulas de rocoto infectadas con nemátodos.

6.4.3. Patogenicidad

Para evaluar la patogenicidad de los nemátodos fitoparásitos, se llevará a cabo un postulado de Koch en macetas con plántulas de rocoto en la etapa inicial de crecimiento.

Se inocularán las plántulas con los nemátodos identificados y se monitoreará la aparición de síntomas característicos de la infección, tales como agallas en las raíces, necrosis o reducción del crecimiento.



METODOLOGÍA

6.4. Métodos

6.4.4. Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos

Método y técnica: Para desarrollar el estudio, se realizará un muestreo que será aleatorio, para determinar el porcentaje de incidencia de daño que están causando los nemátodos fitoparásitos en el cultivo de rocoto en Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas.

6.4.5. Procedimiento e instrumentos para recopilación de datos

Primera fase: Recolección de muestras

El presente estudio tiene como objetivo la recolección de 25 muestras de raíces y suelos de cada parcela de rocoto cultivadas en los distritos de San José y San Antonio, Rodríguez de Mendoza, y en el anexo de Izcuchaca, (Molinopampa), Chachapoyas Amazonas.

Segunda fase: Extracción y observación de nemátodos en laboratorio

Una vez recolectadas las muestras, estas serán trasladadas al Laboratorio de Investigación en Sanidad Vegetal (LABISANV), donde se procederá al procesamiento y análisis.

METODOLOGÍA

6.4.5. Procedimiento e instrumentos para recopilación de datos

Tercera fase: Inoculación de nemátodos

✓ Preparación de sustrato

El sustrato para establecer las plántulas de rocoto que se van a inocular con nemátodos, será un sustrato franco, preparado con turba, materia orgánica y arena con una proporción 1:1:1 respectivamente.

✓ Evaluación de las variables de estudio

Incidencia de nemátodos

Caracteres morfológicos de nematodos

Altura de planta (cm)

Diámetro del tallo (cm)

Número de raíces

Longitud de raíces (cm)

METODOLOGÍA

6.5. Diseño experimental

El diseño experimental se basará en un Diseño de Bloques Completos Aleatorios (DBCA), adecuado para evaluar los efectos de los nemátodos fitoparásitos en el crecimiento de las plántulas de rocoto. El experimento consistirá en dos grupos de plántulas: un grupo control (sin inoculación de nemátodos) y un grupo experimental (con inoculación de nemátodos), para esto se utilizarán 20 macetas con plántula de rocoto para cada género de nemátodos encontrados.

6.6. Análisis de datos

El análisis de los datos recopilados se realizará utilizando el programa excel, y R, el cual permitirá realizar el análisis de varianza (ANOVA)

Además, se utilizarán pruebas de normalidad, como Shapiro-Wilk, para verificar si los datos siguen una distribución normal antes de realizar las pruebas paramétricas.

Se generarán gráficos y tablas para visualizar los resultados, y se usarán técnicas estadísticas descriptivas para resaltar las principales tendencias en los datos obtenidos.

7. REFERENCIAS

- Arias Gonzáles, J. L. (2021). Guía para elaborar la operacionalización de variables. *Espacio I+D: Innovación Más Desarrollo*, 10(28).
- Caballero Mairesse, G., Valiente Raidán, H., Enciso-Maldonado, G., & Pedrozo Fleitas, L. (2021). Nemátodos fitoparásitos asociados a solanáceas cultivadas en el departamento de Cordillera, Paraguay. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/354172843>
- Castaño Zapata, J., Villegas Estrada, B., & Adrian Guzman, O. (2011). Principales nemátodos fitoparásitos y síntomas ocasionadas en cultivos de importancia económica. <https://www.researchgate.net/publication/271203100>
- Coyne, D., Nicol, J., & Cobe, B. (2009). Nematología práctica: Una guía de campo y laboratorio. SP-IPM Secretariat, International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Cotonou, Benin. https://www.researchgate.net/publication/237249582_Nematologia_practica_Una_guia_de_campo_y_laboratorio
- Crozzoli, P. (2014). La nematología agrícola en Venezuela. Universidad Nacional de Venezuela. https://www.researchgate.net/publication/301200556_La_Nematologia_Agricola_en_Venezuela

REFERENCIAS

- Guevara, E. (2016). Nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de café (*Coffea arabica* L.) en el distrito de Cuispes, Bongará, Amazonas. Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. <file:///C:/Users/Asus/Downloads/NEMA%20EN%20CAF%C3%89.pdf>
- Hernández-Amasifuen, A. D., Argüelles Curaca, A., Cortez Lázaro, A. A., & Díaz Pillasca, H. B. (2021). INDUCCIÓN IN VITRO DE CALLOS A PARTIR DE EXPLANTES FOLIARES EN ROCOTO (*Capsicum pubescens* Ruiz & Pav.). LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida, 34(2), 131-140. <https://doi.org/10.17163/lgr.n34.2021.09>
- Hernández-Amasifuen, A. D., Pineda-Lázaro, A. J., Díaz-Pillasca, H. B., Hernández-Amasifuen, A. D., Pineda-Lázaro, A. J., & Díaz-Pillasca, H. B. (2022). Cultivo in vitro de anteras de rocoto (*Capsicum pubescens* Ruiz & Pav.). Idesia (Arica), 40(1), 115-121. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292022000100115>
- Noling, W. (2019). Nematode Management in Tomatoes, Peppers, and Eggplant. IFAS Extension. University of Florida. <file:///C:/Users/Asus/Downloads/NG032.pdf>

REFERENCIAS

- Piedrahita, Ó. A., Castaño Zapata, J., & Villegas Estrada, B. (2012). Principales nematodos fitoparásitos y síntomas ocasionados en cultivos de importancia económica. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/271203100>
- Salazar Antón, W., & Guzmán Hernández, T. (2013). Nematodos fitoparásitos asociados al tomate en la zona occidental de Nicaragua. Obtenido de Scielo: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-13212013000100003#:~:text=Los%20principales%20nematodos%20asociados%20al,Shurtleff%20y%20Averre%20III%202000).
- Soto Pecho, B. V., Inga Ortiz, J. H., Buendía Quispe, B. F., Álvarez Rodríguez, F. J., Bernal Marcelo, A. R., & Vásquez Garay Torres, P. (2023). EVALUACIÓN DEL CULTIVO DE ROCOTO (*Capsicum pubescens*) EN OXAPAMPA PERÚ PARA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. En Estudios Agroecológicos: O avanço da ciência no Brasil—Volume 2 (1.^a ed., pp. 139-156). Editora Científica Digital. <https://doi.org/10.37885/231014820>
- Vera, N., Maicelo, J., Guevara, E., & Oliva, S. (2017). Plant parasitic nematodes associated with pineapple cultivation (*Ananas comosus*) in Amazonas, Peru. Scientia Agropecuaria, 8, 79-84. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2017.01.08>

An aerial photograph of a university campus, featuring several large, multi-story academic buildings, green lawns, and a winding path. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

¡Gracias!