

# Mathematik (Master) für Informatik Skript

erstellt von Prof. Dr. Preisenberger  
transkribiert von Niklas Stich, Alexander Walk

SoSe 2021

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Komplexe Zahlen und komplexwertige Funktionen</b>	<b>1</b>
1.1 Historisches . . . . .	1

# 1 Komplexe Zahlen und komplexwertige Funktionen

## 1.1 Historisches

16. Jahrhundert: Lösung algebraischer Gleichungen

Gegeben:  $a_k \in \mathbb{Q}$ ,  $k = 0, \dots, n \in \mathbb{N}_0$

**Satz 1.1**

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0, \quad a_n \neq 0 \quad (1)$$

$$\sum_{k=0}^n a_k^k = 0 \quad (2)$$

$$\underbrace{p(x)}_{\text{Polynom } n\text{-ten Grades}} = 0, \quad p \in \mathbb{Q}[x] \quad (3)$$

Gesucht: Lösung von (1.1) zunächst für  $n \leq 3$   
bekannt war:

$$(i) \quad n = 1, \quad a_1 x + a_0 = 0, \quad x = -\frac{a_0}{a_1}$$

$$\begin{aligned} (ii) \quad n = 2: \quad a_2 x^2 + a_1 x + a_0 &= 0 \\ a_2 \neq 0, \quad x^2 + \frac{a_1}{a_2} x + \frac{a_0}{a_2} &= 0 \\ x^2 + 2 \frac{a_1}{2a_2} x &= -\frac{a_0}{a_2} \\ x^2 + 2 \frac{a_1}{2a_2} x + \left(\frac{a_1}{2a_2}\right)^2 &= \left(\frac{a_1}{2a_2}\right)^2 - \frac{a_0}{a_2} \\ \left(x + \frac{a_1}{2a_2}\right)^2 &= \left(\frac{a_1}{2a_2}\right)^2 - \frac{a_0}{a_2} \\ x + \frac{a_1}{2a_2} &= \pm \sqrt{\frac{a_1^2}{4a_2^2} - \frac{4a_2 a_0}{4a_2^2}} \\ x_{1/2} &= -\frac{a_1}{2a_2} \pm \frac{\sqrt{a_1^2 - 4a_0 a_2}}{2a_2} \end{aligned}$$

$$\Delta = a_1^2 - 4a_0 a_2 < 0 \Rightarrow \text{keine reelle Lösung}$$

$$\text{Falls } \Delta = 0 \Rightarrow \text{genau eine Lösung}$$

$$\Delta > 0 \Rightarrow \text{genau zwei Lösungen}$$

Die Lösungen sind die Schnittpunkte einer Parabel mit der x-Achse. Die Schnittpunkte existieren für Parabeln mit  $\Delta \geq 0$ . Aber für  $a_2 = 1$ ,  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = -2$  ergibt sich:  $x_{1/2} = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

Folge: Erweiterung von  $\mathbb{Q}$  zu  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ .  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  ist ein Körper, in dem wie in  $\mathbb{Q}$  gerechnet werden kann und in dem die Lösungen von  $x^2 = 2$  existieren.

- (iii) Für Gleichungen 3. Grades keine allgemeine Lösungsformel, jedoch für spezielle Gleichungen  
Carolano: [WTF???]  
Für bestimmte Gleichungen 3. Grades können alle ihre reellen Lösungen mit Lösungen von  $x^3 = \alpha$  und  $x^2 = \beta = -1$  beschreiben, [... to be continued]