

Содержание

1	Линейное пространство	2
2	Скалярное произведение, норма	2
3	Метрика	3
4	Скалярное произведение, норма, метрика в \mathbb{R}^m	3
<hr/>		
Конец II семестра ↓		
5	Определения в \mathbb{R}^m , покоординатная сходимость, двойной и повторный предел	4
6	Бесконечно малое отображение, $o(h)$, отображение дифференцируемое в точке	6
7	Комплексная дифференцируемость, единственность производной	6
8	Дифференцируемость координатных функций, частная производная	7
9	Матрица якоби, необходимое, достаточное условия дифференцируемости, правила дифференцирования	8
<hr/>		
III семестр ↓		
10	Правила дифференцирования	9
11	Градиент, производная по вектору, по направлению, экстремальное свойство градиента . .	11
12	Производные высших порядков, их независимость от порядка дифференцирования, класс $C^r(E)$, мультииндекс, полиномиальная формула	12
13	Лемма о дифференцировании «сдвига», формула Тейлора, n -ый дифференциал	14
14	Последовательность функций, поточечная и равномерная сходимость, теорема Стокса-Зайделя	15
15	Полнота пространства непрерывных функций на компакте, предельный переход под знаком интеграла для последовательностей, правило Лейбница	17

1 Линейное пространство

Определение 1: Множество X называется **линейным пространством** (или векторным) над полем K , если заданы две операции

Сложение: $X \times X \rightarrow X \quad ((x, y) \mapsto x + y)$
 Умножение на скаляр: $K \times X \rightarrow X \quad ((\alpha, x) \mapsto \alpha \cdot x)$, удовлетворяющие аксиомам:

$(X, +)$ — абелева группа по сложению

1. $\forall x, y \in X \quad x + y = y + x$ (коммутативность сложения)
2. $\forall x, y, z \in X \quad (x + y) + z = x + (y + z)$ (ассоциативность сложения)
3. $\forall x \in X \quad \exists 0_X : x + 0_X = x$ (существование нейтрального элемента по сложению)
4. $\forall x \in X \quad \exists (-x) : x + (-x) = 0_X$ (существование обратного элемента по сложению)
5. $\forall x \in X, \forall \alpha, \beta \in K \quad (\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$
6. $\forall x, y \in X, \forall \alpha \in K \quad \alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$
7. $\forall x \in X, \forall \alpha, \beta \in K \quad (\alpha\beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x)$
8. $\forall x \in X \quad 1_X \cdot x = x$, где $1_X \in K$ — нейтральный элемент по умножению

2 Скалярное произведение, норма

Определение 2: Пусть X — линейное пространство над \mathbb{R} . Отображение $X \times X \rightarrow \mathbb{R} \quad ((x, y) \mapsto \langle x, y \rangle)$ называется **скалярным произведением**, если оно удовлетворяет аксиомам:

1. $\forall x, y \in X \quad \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (симметричность)
2. $\forall x, y, z \in X, \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \langle x + \alpha \cdot y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \alpha \langle y, z \rangle$ (линейность)
3. $\forall x \in X \quad \langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0_X$ (положительная определённость)

Определение 3: Отображение $X \rightarrow \mathbb{R} \quad (x \mapsto \|x\|)$ называется **нормой** (X — линейное пространство над \mathbb{R}), если оно удовлетворяет аксиомам:

1. $\forall x \in X \quad \|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_X$ (положительная определённость)
2. $\forall x \in X, \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \|\alpha \cdot x\| = |\alpha| \|x\|$ (положительная однородность)
3. $\forall x, y \in X \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника для нормы)

Утверждение 1: Отображение $X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle}$ — норма (X — линейное пространство над \mathbb{R})

Доказательство: проверка аксиом нормы:

1. Аксиома 3 скалярного произведения
2. По аксиоме 2 скалярного произведения $\sqrt{\langle \alpha \cdot x, \alpha \cdot x \rangle} = \sqrt{\alpha^2 \langle x, x \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle x, x \rangle}$
3. Нужно доказать, что $\forall x, y \in X \quad \sqrt{\langle x + y, x + y \rangle} \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} + \sqrt{\langle y, y \rangle}$. Обе части положительные, поэтому это неравенство равносильно неравенству

$$\begin{aligned} \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle &\leq \langle x, x \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} + \langle y, y \rangle \\ \langle x, y \rangle &\leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} \end{aligned}$$

Рассмотрим функцию $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (\alpha \mapsto \langle x + \alpha \cdot y, x + \alpha \cdot y \rangle)$.

$$\begin{aligned} \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad f(\alpha) &= \langle x, x + \alpha \cdot y \rangle + \langle \alpha \cdot y, x + \alpha \cdot y \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, \alpha \cdot y \rangle + \langle \alpha \cdot y, x \rangle + \langle \alpha \cdot y, \alpha \cdot y \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle + 2\alpha \langle x, y \rangle + \alpha^2 \langle y, y \rangle \end{aligned}$$

Также $f(\alpha) \geq 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$ (по аксиоме 3 скалярного произведения) \Rightarrow дискриминант ≤ 0 :
 $(2\langle x, y \rangle)^2 - 4\langle y, y \rangle \langle x, x \rangle \leq 0$, то есть $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$ или $|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$

□

Следствие 1: Из доказательства утв. 1 следует неравенство Коши-Буняковского. Разные виды его записи:

1. $|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$
2. $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$
3. $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$
4. $\left(\sum_{i=1}^m x_i y_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^m x_i^2 \sum_{i=1}^m y_i^2 \quad (\text{при } x, y \in \mathbb{R}^m)$
5. $\left| \sum_{i=1}^m x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^m x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^m y_i^2} \quad (\text{при } x, y \in \mathbb{R}^m)$

3 Метрика

Определение 4: Пусть X — множество. Отображение $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **метрикой**, если оно удовлетворяет аксиомам:

1. $\forall x, y \in X \quad \rho(x, y) = \rho(y, x)$ (симметричность)
2. $\forall x, y \in X \quad \rho(x, y) \geq 0, \quad \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (невырожденность)
3. $\forall x, y, z \in X \quad \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ (неравенство треугольника для метрики)

Утверждение 2: Пусть X — линейное пространство над \mathbb{R} . Отображение $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \forall x, y \in X$
 $\rho(x, y) = \|x - y\|$ — метрика

Доказательство: проверка аксиом метрики:

1. $\forall x, y \in X \quad \|x - y\| = \|(-1) \cdot (y - x)\| = |-1| \|y - x\| = \|y - x\|$
2. Аксиома 1 нормы
3. По 3 аксиоме нормы $\forall x, y, z \in X \quad \|x - y\| = \|x - y + z - z\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\|$

□

4 Скалярное произведение, норма, метрика в \mathbb{R}^m

Определение 5: $\mathbb{R}^m = \underbrace{\{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}\}}_{m \text{ раз}} = \{(x_1, x_2, \dots, x_m) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$

Утверждение 3: \mathbb{R}^m — линейное пространство над \mathbb{R} с покомпонентным сложением и покомпонентным умножением на скаляр

Доказательство: Очевидно.

□

Утверждение 4: Отображение $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \sum_{i=1}^m x_i y_i$ — скалярное произведение в \mathbb{R}^m

Доказательство: проверка аксиом скалярного произведения:

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}^m \quad \sum_{i=1}^m x_i y_i = \sum_{i=1}^m y_i x_i$
2. $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^m, \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \sum_{i=1}^m (x_i + \alpha y_i) z_i = \sum_{i=1}^m (x_i z_i + \alpha y_i z_i) = \sum_{i=1}^m x_i z_i + \alpha \sum_{i=1}^m y_i z_i$
3. $\forall x \in \mathbb{R}^m \quad \sum_{i=1}^m x_i^2 \geq 0, \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^m x_i^2 = 0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad x_i^2 = 0 \Leftrightarrow x_i = 0 \Leftrightarrow x = 0$

□

Следствие 2: По утв. 1 $\forall x \in \mathbb{R}^m \quad \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^m x_i^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_m^2}$ — норма в \mathbb{R}^m

Следствие 3: По утв. 2 $\forall x, y \in \mathbb{R}^m \quad \rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m (x_i - y_i)^2}$ — метрика в \mathbb{R}^m

5 Определения в \mathbb{R}^m , покоординатная сходимость, двойной и повторный предел

Напоминание определений: т.к. \mathbb{R}^m — метрическое пространство, можно определить ($a \in \mathbb{R}^m, r \in \mathbb{R}$)

6: Шар (открытый) с центром в точке a и радиусом r — $B(a, r) = \{x \mid \|x - a\| < r\}$

7: Сфера с центром в точке a и радиусом r — $S(a, r) = \{x \mid \|x - a\| = r\}$

8: Замкнутый шар с центром в точке a и радиусом r — $\overline{B}(a, r) = \{x \mid \|x - a\| \leq r\}$

9: ε -окрестность точки a — это $B(a, \varepsilon)$ ($\varepsilon \in \mathbb{R}$)

10: Проколота ε -окрестность точки a — это $\dot{B}(a, \varepsilon) = B(a, \varepsilon) \setminus \{a\}$

11: Множество $G \subset \mathbb{R}^m$ называется **открытым**, если $\forall x \in G \exists \varepsilon_a \in \mathbb{R} : B(a, \varepsilon_a) \subset G$. Если множество G — открытое, то $G = \bigcup_{a \in G} B(a, \varepsilon_a)$:

$G \subset \bigcup_{a \in G} B(a, \varepsilon_a)$: Пусть $x \in G$, тогда, т.к. G — открытое $\exists B(x, r) \subset G$, т.е. $x \in \bigcup_{a \in G} B(a, \varepsilon_a)$

$G \supset \bigcup_{a \in G} B(a, \varepsilon_a)$: Пусть $x \in \bigcup_{a \in G} B(a, \varepsilon_a)$, тогда $\exists a : x \in B(a, \varepsilon_a) \subset G$ □

12: Точка x называется **предельной точкой** множества $D \subset \mathbb{R}^m$, если $\forall \varepsilon > 0 \dot{B}(a, \varepsilon) \cap D \neq \emptyset$

13: Множество $F \subset \mathbb{R}^m$ называется **замкнутым**, если оно содержит все свои предельные точки
 $\Leftrightarrow \exists G$ — открытое множество : $F = \mathbb{R}^m \setminus G$

\Rightarrow Пусть $x \in \mathbb{R}^m \setminus F$, тогда $\exists \varepsilon > 0 : B(a, \varepsilon) \cap F = \emptyset$, то есть дополнение F открыто

\Leftarrow Пусть x — предельная точка F и $x \notin F$, тогда $x \in G$ и любая ε -окрестность x пересекается с F , то есть G не открыто — противоречие □

14: Точка $a \in \mathbb{R}^m$ называется **пределом последовательности** $x^{(n)}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad \|x^{(n)} - a\| < \varepsilon$$

15: Точка $L \in \mathbb{R}^n$ называется **пределом отображения** $f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ при $x \rightarrow a \in \mathbb{R}^m$, a — предельная точка D , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in D \text{ если } 0 < \|x - a\| < \delta, \text{ то } \|f(x) - L\| < \varepsilon$$

Равносильное определение (по Гейне):

$$\forall \text{ последовательности } x^{(k)} : \begin{matrix} x^{(k)} \rightarrow a \\ x^{(k)} \neq a \\ x^{(k)} \in D \end{matrix} \quad \text{выполнено } f(x^{(k)}) \rightarrow L$$

Утверждение 5: Сходимость последовательности в \mathbb{R}^m равносильна покоординатной сходимости

$$x^{(n)} \rightarrow a \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad x_i^{(n)} \rightarrow a_i$$

Доказательство:

$$\Rightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad |x_i^{(n)} - a_i| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^m (x_j^{(n)} - a_j)^2} = \|x^{(n)} - a\| \text{ и } \|x^{(n)} - a\| \rightarrow 0 \Rightarrow x_i^{(n)} \rightarrow a_i$$

$$\Leftarrow \text{ Пусть } \alpha^{(n)} = \max_{j=1,2,\dots,m} |x_j^{(n)} - a_j|, \text{ тогда } \alpha^{(n)} \rightarrow 0 \text{ и } \|x^{(n)} - a\| = \sqrt{\sum_{j=1}^m (x_j^{(n)} - a_j)^2} \leq \\ \leq \max_{j=1,2,\dots,m} |x_j^{(n)} - a_j| \sqrt{m} = \sqrt{m} \alpha^{(n)} \rightarrow 0 \Rightarrow \|x^{(n)} - a\| \rightarrow 0$$

□

Следствие 4: Из определения предела отображения по Гейне $f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = L_i$$

Ещё напоминание определений:

- 16: $f: D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$; $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ $f_i(x)$ называются координатными функциями функции $f(x)$
- 17: Метрическое пространство X называется **компактным**, если из любого покрытия открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие:

$\forall \{G_\alpha\}$ — открытое покрытие $\exists G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, \dots, G_{\alpha_n}$ — открытое подпокрытие X

Подмножество $D \subset \mathbb{R}^m$ — компактно $\Leftrightarrow D$ — замкнуто и ограничено $\Leftrightarrow D$ — секвенциально компактно $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists$ конечная ε -сеть (D — свержограничено) и замкнуто

- D называется ограниченным, если $\exists B(a, r) \subset \mathbb{R}^m : D \subset B(a, r)$
- D называется секвенциально компактным, если из любой последовательности элементов этого множества можно выбрать сходящуюся подпоследовательность (к элементу этого множества)
- $N \subset D$ называется ε -сетью, если $\forall x \in D \exists y \in N : \rho(x, y) < \varepsilon$ (конечной ε -сетью, если N — конечно)
- Последовательность $x^{(n)}$ — фундаментальная, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m, k > N \rho(x^{(m)}, x^{(k)}) < \varepsilon$
- Метрическое пространство X называется полным, если в нём любая фундаментальная последовательность сходится. В \mathbb{R}^m полное \Leftrightarrow замкнутое

Определение 18: $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}$, a_1 — предельная точка D_1 , a_2 — предельная точка D_2 , $D \subset \mathbb{R}^2$ — множество : $(D_1 \setminus \{a_1\}) \times (D_2 \setminus \{a_2\}) \subset D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

1. Пусть $\varphi(x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow a_2} f(x_1, x_2)$ (если этот предел существует), тогда $\lim_{x_1 \rightarrow a_1} \varphi(x_1)$ называется **повторным пределом**
2. Пусть $\psi(x_2) = \lim_{x_1 \rightarrow a_1} f(x_1, x_2)$ (если этот предел существует), тогда $\lim_{x_2 \rightarrow a_2} \psi(x_2)$ тоже называется **повторным пределом**
3. $L = \lim_{\substack{x_1 \rightarrow a_1 \\ x_2 \rightarrow a_2}} f(x_1, x_2)$ называется **двойным пределом**, если

$\forall U(L)$ — окрестность точки $L \exists V_1(a_1)$ — окрестности : если $x_1 \in V_1(a_1) \cap D_1$, то $f(x_1, x_2) \in U(L)$
 $V_2(a_2)$ точек a_1, a_2 $x_2 \in V_2(a_2) \cap D_2$

Определение 19: Отображение $f: D \subset X \rightarrow Y$ X, Y — метрические пространства, $G \subset D$, a — предельная точка G . Предел сужения отображения $\lim_{x \rightarrow a} f|_G(x)$ называется **пределом по множеству**
 Если $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ и $C \subset \mathbb{R}^2$ — кривая, то $\lim_{x \rightarrow a} f|_C(x)$ называется **пределом по кривой**.

Утверждение 6: Пусть $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}$, a_1 — предельная точка D_1 , a_2 — предельная точка D_2 , $D \subset \mathbb{R}^2$ — множество : $(D_1 \setminus \{a_1\}) \times (D_2 \setminus \{a_2\}) \subset D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, тогда

1. Из того, что \forall кривой $C \in C^1(D) : C' \neq 0 \exists \lim_{x \rightarrow a} f|_C(x) = L$ следует $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
2. Из того, что \forall кривой $C \in C^2(D) : C' \neq 0 \exists \lim_{x \rightarrow a} f|_C(x) = L$ не следует $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

Доказательство: Его нету. □

Теорема 1 (О двойном и повторном пределе):

Пусть $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}$, a_1 — предельная точка D_1 , a_2 — предельная точка D_2 , $D \subset \mathbb{R}^2$ — множество : $(D_1 \setminus \{a_1\}) \times (D_2 \setminus \{a_2\}) \subset D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, \exists двойной предел $\lim_{\substack{x_1 \rightarrow a_1 \\ x_2 \rightarrow a_2}} f(x_1, x_2) = A \in \mathbb{R}$, и $\forall x_1 \in D_1 \setminus \{a_1\} \exists$ конечный $\varphi(x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow a_2} f(x_1, x_2)$, тогда \exists повторный предел $\lim_{x_1 \rightarrow a_1} \varphi(x_1) = A$

Доказательство: Пусть $A \in \mathbb{R}$. Так как существует двойной предел, выполнено:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists V_1(a_1) \text{ — окрестности : если } x_1 \in \dot{V}_1(a_1) \cap D_1, \text{ то } \|f(x_1, x_2) - A\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$V_2(a_2) \quad \text{точек } a_1, a_2 \quad x_2 \in \dot{V}_2(a_2) \cap D_2$$

Делая предельный переход в последнем неравенстве при $x_2 \rightarrow a_2$ получаем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists V_1(a_1) \text{ — окрестность : если } x_1 \in \dot{V}_1(a_1) \cap D_1, \text{ то } \|\varphi(x_1) - A\| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

$$\text{точки } a_1$$

Аналогично при $A = \pm\infty$

□

6 Бесконечно малое отображение, $o(h)$, отображение дифференцируемое в точке

Определение 20: Отображение $\varphi: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется **бесконечно малым** в точке $x_0 \in \text{Int } E$, если $\varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0_{\mathbb{R}^n}$

Определение 21: Пусть $E \subset \mathbb{R}^m : 0_{\mathbb{R}^m} \in \text{Int } E$, $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $h \in E$. Говорят, что **$\varphi(h) = o(h)$** при $h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^m}$, если $\frac{\varphi(h)}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^m}} 0_{\mathbb{R}^n}$ (бесконечно малое в точке $0_{\mathbb{R}^m}$).

Определение в \mathbb{R} было: $f, g: E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка E , говорят, что $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$, если $\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ ($g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки x_0)

Определение 22: Отображение $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется **дифференцируемым** в точке $a \in \text{Int } E$, если \exists линейный оператор из \mathbb{R}^m в \mathbb{R}^n с матрицей L и \exists бесконечно малое отображение в точке $0_{\mathbb{R}^m}$ $\alpha: U(0_{\mathbb{R}^m}) \rightarrow \mathbb{R}^n$ такие, что

$$f(a + h) = f(a) + Lh + \alpha(h) \cdot \|h\| \quad \text{при } h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^m}$$

или

$$f(x) = f(a) + L(x - a) + \alpha(x - a) \cdot \|x - a\| \quad \text{при } x \rightarrow a$$

Этот линейный оператор (с матрицей L) называется **производным оператором** отображения f в точке a , обозначается $f'(a)$. Получается, что отображение f' действует из \mathbb{R}^m в пространство линейных операторов.

Определение в \mathbb{R} было: Функция $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $a \in \langle a, b \rangle$, если \exists число $A \in \mathbb{R}$ такое, что

$$f(a + h) = f(a) + Ah + o(h) \quad \text{при } h \rightarrow 0$$

В определении в \mathbb{R}^m можно писать $o(h)$ вместо $\alpha(h) \cdot \|h\|$ и $o(x - a)$ вместо $\alpha(x - a) \cdot \|x - a\|$

7 Комплексная дифференцируемость, единственность производной

Определение 23: Отображение $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ (Ω — открытое множество) называется **комплексно дифференцируемым** в точке $a \in \Omega$, если \exists число $\lambda \in \mathbb{C}$ такое, что

$$f(a + h) = f(a) + \lambda h + o(h) \quad \text{при } h \rightarrow 0$$

или

$$\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = \lambda$$

Замечание 1: Отображение $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ вещественно дифференцируемое (т.е. как в опр. 22) будет комплексно дифференцируемым как отображение $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ только если матрица его производного оператора будет имеет вид $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, т.к. в опр. 23 $\lambda h = (\lambda_1 + \lambda_2 i)(h_1 + h_2 i) = (\lambda_1 h_1 - \lambda_2 h_2) + (\lambda_1 h_2 + \lambda_2 h_1)i$, т.е. $\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 h_1 - \lambda_2 h_2 \\ \lambda_1 h_2 + \lambda_2 h_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & -\lambda_2 \\ \lambda_2 & \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$

Утверждение 7: В определении дифференцируемости отображения $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ (опр. 22) оператор $f'(a)$ определён однозначно

Доказательство: Пусть $h = t \cdot u$, $u \in \mathbb{R}^m$, $t \in \mathbb{R}$, тогда определение можно записать

$$f(a + t \cdot u) = f(a) + t Lu + o(t \cdot u) \quad \text{при } t \rightarrow 0$$

Так как u — фиксированный вектор, $o(t \cdot u) = o(t)$. Можно выразить Lu , перенеся остальное в другую часть и сделав предельный переход при $t \rightarrow 0$:

$$Lu = \frac{f(a + t \cdot u) - f(a)}{t} + \frac{o(t)}{t}, \quad t \rightarrow 0$$

$$Lu = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t \cdot u) - f(a)}{t}$$

□

Замечание 2: Определение дифференцируемости (опр. 22) при $n = 1$ (тогда $L = (l_1, l_2, \dots, l_m)$):

$$f((x_1, x_2, \dots, x_m)) = f((a_1, a_2, \dots, a_m)) + (l_1(x_1 - a_1) + l_2(x_2 - a_2) + \dots + l_m(x_m - a_m)) + o(x - a)$$

8 Дифференцируемость координатных функций, частная производная

Лемма 1 (о дифференцируемости отображения и дифференцируемости его координатных функций):

$f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a \in \text{Int } E$, $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$, тогда

1. Отображение f дифференцируемо \Leftrightarrow все f_i дифференцируемы
2. Строки матрицы оператора $f'(a)$ это матрицы операторов $f'_1(a), f'_2(a), \dots, f'_m(a)$

Доказательство:

1. \Rightarrow Из опр. 22

$$\begin{pmatrix} f_1(a + h) \\ f_2(a + h) \\ \dots \\ f_n(a + h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(a) \\ f_2(a) \\ \dots \\ f_n(a) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} l_{11}h_1 + l_{12}h_2 + \dots + l_{1m}h_m \\ l_{21}h_1 + l_{22}h_2 + \dots + l_{2m}h_m \\ \dots \\ l_{n1}h_1 + l_{n2}h_2 + \dots + l_{nm}h_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_1(h) \cdot \|h\| \\ \alpha_2(h) \cdot \|h\| \\ \dots \\ \alpha_m(h) \cdot \|h\| \end{pmatrix}$$

В первой строке записано определение дифференцируемости f_1 , во второй — f_2 и т.д.

\Leftarrow Если сначала написать определения дифференцируемости координатных функций f_1, f_2, \dots, f_m , и потом записать их в одну формулу как в предыдущем пункте, то получится определение дифференцируемости f

2. Матрицы операторов $f'_1(a), f'_2(a), \dots, f'_m(a)$ имеют размер $1 \times m$, т.е. строки. Они записаны во втором слагаемом выше и вместе образуют оператор матрицы $f'(a)$.

□

Замечание 3:

1. Если $f = \text{const}$, то $f' \equiv 0_{m \times n}$ и $o(h) \equiv 0_{\mathbb{R}^n}$
2. Если $\mathcal{A}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейное отображение с матрицей A , тогда $\forall x \in \mathbb{R}^m \quad \mathcal{A}'(x) = A$ (т.к. из-за линейности $\mathcal{A}(x+h) = \mathcal{A}(x) + \underbrace{\mathcal{A}h}_{A(h)} + 0$ — то есть A это и есть производная по опр. 22)
3. Если $\mathcal{A}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, A — его матрица, и отображение задано так: $x \mapsto u + Ax$ — называется аффинное отображение (линейное со сдвигом), то тоже $\mathcal{A}'(x) = A$ (т.к. $\mathcal{A}(x+h) = u + A(x+h) = u + Ax + Ah = \mathcal{A}(x) + Ah + 0$)

Определение 24: Пусть $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Int } E$, $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\varphi_k: U(a_k) \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi_k(u) = f(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, u, a_{k+1}, \dots, a_m)$, тогда $\varphi'_k(a_k) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(a_k + t) - \varphi(a_k)}{t}$ (если этот предел существует) называется **k -ой частной производной** функции f в точке a . Обозначение: $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$

Замечание 4: Пусть $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — дифференцируемо в точке a , тогда f — непрерывно в точке a (т.е. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$). Т.к. переходя к пределу в определении дифференцируемости при $h \rightarrow 0$ получаем $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$. Но если существуют все частные производные, то функция может быть не непрерывной, например

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\text{Здесь } \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+t) - f(0, 0)}{t} = 0, \text{ но}$$

предел в точке 0 вдоль прямой $y = x$: $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t) = 1$, а вдоль прямой $y = 2x$: $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, 2t) = \frac{4}{5}$. То есть у f не существует предела в нуле.

9 Матрица якоби, необходимое, достаточное условия дифференцируемости, правила дифференцирования

Определение 25: Матрица оператора $f'(a)$, $a \in \text{Int } E$ отображения $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ (если f — дифференцируемо) называется **матрицей якоби** отображения f в точке a .

Теорема 2 (необходимое условие дифференцируемости):

Пусть отображение $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — дифференцируемо в точке $a \in \text{Int } E$, тогда существуют все частные производные всех его координатных функций и

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix} \text{ — матрица якоби отображения } f \text{ в точке } a$$

Доказательство: $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ рассмотрим координатную функцию f_i .

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_i}{\partial x_k} &\stackrel{\text{опр. 24}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_i(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_k + t, a_{k+1}, \dots, a_m) - f_i(a)}{t} = \\ &\stackrel{\text{зам. 2}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_i(a) + l_k(a_k + t - a_k) - f_i(a) + o(t)}{t} = l_k \end{aligned}$$

$k \in \{1, 2, \dots, m\}$, l_k — k -ая компонентна матрицы якоби функции f_i (размер матрицы — $1 \times m$). То есть компонентами l_k матриц якоби координатных функций f_i в точке a являются соответствующие частные производные $\frac{\partial f_i}{\partial x_k}$ координатных функций f_i в точке a . И по лемме 1 строки матрицы якоби отображения f состоят из матриц якоби координатных функций. \square

Теорема 3 (достаточное условие дифференцируемости):

$f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Int } E$, $\exists r: \text{ в шаре } B(a, r) \subset E \exists \text{ все частные производные } \frac{\partial f}{\partial x_k}$ ($k \in \{1, 2, \dots, m\}$) и они непрерывны в точке a . Тогда функция f — дифференцируема в точке a

Доказательство: При $m = 2$.

$$f(x_1, x_2) - f(a_1, a_2) = (f(x_1, x_2) - f(x_1, a_2)) + (f(x_1, a_2) - f(a_1, a_2)) =$$

Пусть $g(x_2) = f(x_1, x_2)$, x_1 — фиксировано. Тогда $f(x_1, x_2) - f(x_1, a_2) = g(x_2) - g(a_2)$. Функция g — дифференцируема на $[a_2, x_2]$ ($g' = \frac{\partial f}{\partial x_2}$) \Rightarrow по теореме Лагранжа $\exists x_0$ между x_2 и $a_2: g(x_2) - g(a_2) = g'(x_0)(x_2 - a_2) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0)(x_2 - a_2)$. Поэтому:

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_0)(x_2 - a_2) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0, a_2)(x_1 - a_1) = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)(x_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_2 - a_2) + \\ &+ \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0, a_2) \right) (x_1 - a_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_0) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \right) (x_2 - a_2) \end{aligned}$$

Домножим и поделим на $\|x - a\|$ последнюю строку. $\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0, a_2) \right) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$, т.к. x_0 между x_1 и a_1 ; и $\left| \frac{x_1 - a_1}{\|x - a\|} \right| \leq 1$. Аналогично во втором слагаемом этой строки. Значит теперь в ней написано б.м. $\cdot \|x - a\|$, то есть $o(x - a)$. Получилось определение дифференцируемости f . \square

10 Правила дифференцирования

- Линейность:** $f, g: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — дифференцируемы в точке $a \in \text{Int } E$, тогда отображения $f + g$, λg — тоже дифференцируемы в точке a и их производные операторы равны: $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$, $(\lambda g)'(a) = \lambda g'(a)$.

Лемма 2 (об оценке нормы линейного оператора):

$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейное отображение с матрицей A . Тогда $\forall x \in \mathbb{R}^m \|Ax\| \leq C_A \|x\|$, где $C_A = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n,m} a_{ij}^2}$, a_{ij} — элементы матрицы A

Доказательство:

$$\|Ax\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} x_j \right)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^m x_j^2 \right)} = \|x\| \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n,m} a_{ij}^2}$$

□

2. **Дифференцируемость композиции:** $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^l$, $g: I \subset \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^n$, f — дифференцируемо в точке $a \in \text{Int } E$, g — дифференцируемо в точке $b = f(a) \in \text{Int } I$. Тогда отображение $g \circ f$ — дифференцируемо в точке a и его производный оператор $g(f(a))' = g'(f(a)) f'(a)$
Доказательство: определения дифференцируемости отображений f и g :

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \alpha(h) \|h\|, \quad \alpha(h) \xrightarrow[h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^m}]{} 0_{\mathbb{R}^l}$$

$$g(b+k) = g(b) + g'(b)k + \beta(k) \|k\|, \quad \beta(k) \xrightarrow[k \rightarrow 0_{\mathbb{R}^l}]{} 0_{\mathbb{R}^n}$$

Получаем, что отображение $g \circ f$ дифференцируемо по определению:

$$\begin{aligned} g(f(a+h)) - g(f(a)) &= g(\underbrace{f(a)}_b + \underbrace{f'(a)h + \alpha(h)\|h\|}_k) - g(f(a)) = \\ &= g(f(a)) + g'(f(a)) (f'(a)h + \alpha(h)\|h\|) + \beta(f'(a)h + \alpha(h)\|h\|) \|f'(a)h + \alpha(h)\|h\| - g(f(a)) = \\ &= g'(f(a)) f'(a)h + \underbrace{g'(f(a)) \alpha(h)\|h\|}_I + \underbrace{\beta(f'(a)h + \alpha(h)\|h\|) \|f'(a)h + \alpha(h)\|h\|}_{II} \\ \|I\| &= \|g'(f(a)) \alpha(h)\| \cdot \|h\| \stackrel{\text{лемма 2}}{\leq} \underbrace{\|\alpha(h)\|}_{\text{б.м. при } h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^m}} C_{g'(f(a))} \|h\| \\ \|II\| &= \|\beta(f'(a)h + \alpha(h)\|h\|)\| \cdot \|f'(a)h + \alpha(h)\|h\| \stackrel{\text{нер-во тр-ка}}{\leq} \|\beta(f'(a)h + \alpha(h)\|h\|)\| \cdot \|f'(a)h\| + \\ &\quad + \|\beta(f'(a)h + \alpha(h)\|h\|)\| \cdot \|\alpha(h)\|h\| \stackrel{\text{лемма 2}}{\leq} \text{б.м.} \cdot \|h\| C_{f'(a)} + \text{б.м.} \cdot \text{б.м.} \cdot \|h\| \quad \text{при } h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^m} \end{aligned}$$

Тогда $I + II$ это б.м. $\cdot \|h\| \Rightarrow$ получилось определение дифференцируемости отображения $g \circ f$.

3. **Дифференцирование произведений:** Отображения $f, g: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\lambda: E \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемы в точке $a \in \text{Int } E$. Тогда отображения $\lambda f(x) = \lambda(x)f(x)$ и $\langle f, g \rangle(x) = \langle f(x), g(x) \rangle$ дифференцируемы в точке a . Они действуют на вектор $h \in \mathbb{R}^m$ так:

- ① $(\lambda f)'(a) \cdot h = (\lambda'(a) \cdot h) \cdot f(a) + \lambda(a) \cdot f'(a) \cdot h$
- ② $\langle f, g \rangle'(a) \cdot h = \langle f'(a) \cdot h, g(a) \rangle + \langle f(a), g'(a) \cdot h \rangle$

Доказательство:

- ① $\lambda(a+h)f(a+h) \stackrel{\text{опр. 22}}{=} (\lambda(a) + \lambda'(a)h + o(h))(f(a) + f'(a)h + o(h)) = \lambda(a)f(a) + \lambda(a)f'(a)h + \lambda'(a)h f(a) + o(h)$ — определение дифференцируемости λf в точке a .
- ② $\langle f, g \rangle'(a) \cdot h = \left(\sum_{i=1}^n f_i g_i \right)'(a) \cdot h \stackrel{\text{линейн.}}{=} \sum_{i=1}^n (f_i g_i)'(a) \cdot h \stackrel{\text{①}}{=} \sum_{i=1}^n \underbrace{(f'_i(a) \cdot h)}_{i\text{-ая координата } F'(a) \cdot h} \cdot g_i(a) + f_i(a) \cdot g'_i(a) \cdot h =$
 $= \langle f'(a) \cdot h, g(a) \rangle + \langle f(a), g'(a) \cdot h \rangle$

Замечание 5: Общее правило дифференцирования функции одной переменной:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируема, задаётся формулой $f(x)$. $f(x) \rightsquigarrow F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, n — количество x -ов в формуле (т.е. нужно пронумеровать все x -ы). Тогда

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i}(x, x, \dots, x)$$

Доказательство: Определение дифференцируемости F :

$$\underbrace{F(x+h, \dots, x+h)}_{f(x+h)} = \underbrace{F(x, \dots, x)}_{f(x)} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i}(x, x, \dots, x) \cdot h}_{\text{число} \Rightarrow \text{это } f'(x)} + o(h) \quad \text{при } h \rightarrow 0$$

11 Градиент, производная по вектору, по направлению, экстремальное свойство градиента

Определение 26: Пусть функция $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируема в точке $a \in \text{Int } E$. Тогда матрица якоби функции f имеет размер $1 \times m$ (строка). Если её транспонировать и считать, что это вектор из \mathbb{R}^m , то определение дифференцируемости можно записать так:

$$f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + o(h), \quad \text{при } h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^m}$$

и тогда вектор $f'(a) \in \mathbb{R}^m$ называется **градиентом** функции f в точке a , обозначается $\text{grad } f(a)$.

Определение 27: Производной по вектору $h \in \mathbb{R}^m$ функции $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ в точке a называется

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t}$$

обозначение: $\frac{\partial f}{\partial h}(a)$. **Направлением** в \mathbb{R}^m называется вектор $l \in \mathbb{R}^m : \|l\| = 1$. Можно рассматривать производную по направлению.

Замечание 6: $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируема в точке $a \in \text{Int } E$, тогда

$$\frac{\partial f}{\partial h}(a) \stackrel{\text{опр. 27}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t} \stackrel{\text{опр. 22 и т. 2}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x_1}(a)th_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m}(a)th_m + o(t)}{t} = \langle \text{grad } f(a), h \rangle$$

Теорема 4 (Экстремальное свойство градиента):

Пусть $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируема в точке $a \in \text{Int } E$ и $\text{grad } f(a) \neq 0$. Тогда $l = \frac{\text{grad } f(a)}{\|\text{grad } f(a)\|}$ (направление в \mathbb{R}^m) — направление наискорейшего возрастания функции f , т.е.

$\forall h \in \mathbb{R}^m$ такого, что $\|h\| = 1$ выполнено:

$$-\|\text{grad } f(a)\| = -\frac{\partial f}{\partial l} \leq \frac{\partial f}{\partial h}(a) \leq \frac{\partial f}{\partial l} = \|\text{grad } f(a)\|$$

и равенство достигается при $h = l$ (справа) и $h = -l$ (слева)

Доказательство: Так как $\frac{\partial f}{\partial h} = \langle \text{grad } f(a), h \rangle$ (зам. 6), то из неравенства Коши-Буняковского (сл. 1) следует доказываемое неравенство: $-\|\text{grad } f(a)\| \cdot 1 \leq \langle \text{grad } f(a), h \rangle \leq \|\text{grad } f(a)\| \cdot 1$. Если в неравенстве Коши-Буняковского $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ $y = \alpha x$, то достигается равенство. В нашем случае, если $h = l$, то α это $1/\|\text{grad } f(a)\|$. \square

12 Производные высших порядков, их независимость от порядка дифференцирования, класс $C^r(E)$, мультииндекс, полиномиальная формула

Определение 28: $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $\exists k \in \{1, 2, \dots, m\}$ и $\exists U(a)$ — окрестность точки $a \in \text{Int } E$ такие, что можно определить функцию $g: U(a) \rightarrow \mathbb{R}$ так, что $g(x) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x)$. Тогда, если $\exists i \in \{1, 2, \dots, m\}$ такое, что $\exists \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$, то эта частная производная называется **частной производной**

II порядка функции f в точке a . Обозначение: $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_k}(a)$ или $f''_{x_k x_i}(a)$

По индукции определяется $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_n}}(a) = \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_2} \partial x_{i_3} \dots \partial x_{i_n}} \right)(a)$

Теорема 5 (о независимости частной производной от порядка дифференцирования):

Пусть $f: E \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, точка $(x_0, y_0) \in E$, $\exists r > 0$: в шаре $B((x_0, y_0), r)$ $\exists f''_{xy}, f''_{yx}$ и они непрерывны в точке (x_0, y_0) . Тогда $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$

Доказательство: Пусть $\Delta^2 f(h, k) = f(x_0, y_0) + f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)$. При фиксированном k определим функцию $\alpha(h) = \Delta^2 f(h, k)$. И пусть обе функции заданы так, чтобы аргументы f попадали в шар $B((x_0, y_0), r)$, т.е. $\Delta^2 f: B((0, 0), r/\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ и $\alpha: [0, r/\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда α непрерывна и дифференцируема на $[0, r/\sqrt{2})$ и $\alpha(0) = 0$, поэтому, применяя теорему Лагранжа сначала к функции α , затем при фиксированной первой переменной к функции f получаем

$$\alpha(h) = \alpha(h) - \alpha(0) = \alpha'(\bar{h}) \cdot h = (f'_x(x_0 + \bar{h}, y_0 + k) - f'_x(x_0 + \bar{h}, y_0)) \cdot h = (f''_{xy}(x_0 + \bar{h}, y_0 + \bar{k})) \cdot hk$$

Аналогично, при фиксированном h можно определить функцию $\beta(k) = \Delta^2 f(h, k)$ и

$$\beta(k) = \beta(k) - \beta(0) = \beta'(\hat{k}) \cdot k = (f'_y(x_0 + h, y_0 + \hat{k}) - f'_y(x_0 + h, y_0 + \hat{k})) \cdot k = (f''_{yx}(x_0 + \hat{h}, y_0 + \hat{k})) \cdot hk$$

Так как при фиксированных k и h $\alpha(h) = \beta(k) = \Delta^2 f(h, k)$, то имеем равенство

$$f''_{xy}(x_0 + \bar{h}, y_0 + \bar{k}) = f''_{yx}(x_0 + \hat{h}, y_0 + \hat{k})$$

и делая в нём предельный переход при $h \rightarrow 0$ и $k \rightarrow 0$ получаем, что $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$, так как $\bar{h}, \hat{h} \in (0, h)$, и $\bar{k}, \hat{k} \in (0, k)$, то есть $\bar{h}, \hat{h}, \bar{k}, \hat{k}$ стремятся к нулю при $h \rightarrow 0$ и $k \rightarrow 0$. \square

Определение 29: Пусть множество $E \subset \mathbb{R}^m$ — открытое, $r \in \mathbb{N}$, тогда **класс $C^r(E)$** — это множество всех функций $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ таких, что у них \exists все возможные частные производные порядка r и все эти производные непрерывны. $C(E) \supsetneq C^1(E) \supsetneq C^2(E) \supsetneq \dots$

$$C^\infty(E) \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{r=1}^{\infty} C^r(E)$$

Теорема 6 (общая теорема о независимости частной производной от порядка дифференцирования):

Пусть функция $f \in C^r(E)$, $E \subset \mathbb{R}^m$, $r, k \in \mathbb{N}$, $k \leq r$, и наборы индексов i_1, i_2, \dots, i_k и j_1, j_2, \dots, j_k опличаются друг от друга перестановкой. Тогда

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_k} \partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial^r f}{\partial x_{j_k} \partial x_{j_{k-1}} \dots \partial x_{j_1}} \quad \text{на множестве } E$$

Доказательство: Сводится к предыдущей теореме, так как любую перестановку можно получить транспозицией соседних элементов. \square

Замечание 7: Классы $C^r(E)$, $r \in \mathbb{N}$ замкнуты относительно сложения, умножения на скаляр (и образуют линейное пространство) и композиции.

Определение 30: Вектор $k = (k_1, k_2, \dots, k_m) \in \mathbb{R}^m$, где все $k_i \in \mathbb{Z}, k_i \geq 0$ называется **мультииндексом**

1. $|k| \stackrel{\text{def}}{=} k_1 + k_2 + \dots + k_m$ — называется **высотой мультииндекса**
2. $k! \stackrel{\text{def}}{=} k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$
3. $x^k \stackrel{\text{def}}{=} x_1^{k_1} \cdot x_2^{k_2} \cdot \dots \cdot x_m^{k_m}$, где $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ — вектор из \mathbb{R}^m
4. $\frac{\partial^{|k|} f}{\partial x^k} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial^{|k|} f}{(\partial x_1)^{k_1} (\partial x_2)^{k_2} \dots (\partial x_m)^{k_m}}$ $(\partial x_i)^{k_i}$ означает, что по переменной x_i частная производная берётся k_i раз (это общее обозначение; не только для мультииндекса)

Лемма 3 (полиномиальная формула):

Пусть $r \in \mathbb{N}$, $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}$, т.е. $a = (a_1, a_2, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$, тогда

$$\begin{aligned} (a_1 + a_2 + \dots + a_m)^r &= \sum_{n_1=1}^m \sum_{n_2=1}^m \dots \sum_{n_r=1}^m a_{n_1} \cdot a_{n_2} \cdot \dots \cdot a_{n_r} = \\ &= \sum_{\substack{j: |j|=r \\ j - \text{мультииндекс}}} \frac{r!}{j!} \cdot a^j \stackrel{\text{опр. 30}}{=} \sum_{\substack{(j_1, \dots, j_m) \\ j_1 + \dots + j_m = r}} \frac{r!}{j_1! \cdot j_2! \cdot \dots \cdot j_m!} \cdot a_1^{j_1} \cdot a_2^{j_2} \cdot \dots \cdot a_m^{j_m} \end{aligned}$$

Доказательство: Индукция по r . Обозначим $S_r = \sum \frac{r!}{j!} \cdot a^j$, тогда

База: при $r = 1$

$$S_1 = \sum_{\substack{(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \\ 1 \text{ стоит на месте } i \\ i \in \{1, \dots, m\}}} \frac{1!}{0! \cdot \dots \cdot 0! \cdot 1! \cdot 0! \cdot \dots \cdot 0!} \cdot a_1^0 \cdot \dots \cdot a_{i-1}^0 \cdot a_i^1 \cdot a_{i+1}^0 \cdot \dots \cdot a_m^0 = (a_1 + a_2 + \dots + a_m)^1$$

Переход: от r к $r + 1$. Раскроем скобки в выражении $S_{r+1} = (a_1 + a_2 + \dots + a_m) \cdot S_r$:

$$\sum_{j: |j|=r} \frac{r!}{j_1! \cdot j_2! \cdot \dots \cdot j_m!} \cdot a_1^{j_1+1} \cdot a_2^{j_2} \cdot \dots \cdot a_m^{j_m} + \dots + \sum_{j: |j|=r} \frac{r!}{j_1! \cdot j_2! \cdot \dots \cdot j_m!} \cdot a_1^{j_1} \cdot a_2^{j_2} \cdot \dots \cdot a_m^{j_m+1}$$

Домножим и поделим каждую сумму на соответствующее $j_i + 1$:

$$\sum_{j: |j|=r} \frac{r! \cdot (j_1 + 1)}{(j_1 + 1)! \cdot j_2! \cdot \dots \cdot j_m!} \cdot a_1^{j_1+1} \cdot a_2^{j_2} \cdot \dots \cdot a_m^{j_m} + \dots + \sum_{j: |j|=r} \frac{r! \cdot (j_m + 1)}{j_1! \cdot j_2! \cdot \dots \cdot (j_m + 1)!} \cdot a_1^{j_1} \cdot a_2^{j_2} \cdot \dots \cdot a_m^{j_m+1}$$

Изменим в пределе суммирования высоту мультииндекса на $r + 1$, учитывая, что тогда в каждой сумме соответствующее j_i должно быть ≥ 1 :

$$\sum_{\substack{j: |j|=r+1, \\ j_1 \geq 1}} \frac{r! \cdot j_1}{j_1! \cdot j_2! \cdot \dots \cdot j_m!} \cdot a_1^{j_1} \cdot a_2^{j_2} \cdot \dots \cdot a_m^{j_m} + \dots + \sum_{\substack{j: |j|=r+1, \\ j_m \geq 1}} \frac{r! \cdot j_m}{j_1! \cdot j_2! \cdot \dots \cdot j_m!} \cdot a_1^{j_1} \cdot a_2^{j_2} \cdot \dots \cdot a_m^{j_m}$$

Каждая сумма умножается на соответствующее j_i , поэтому условие $j_i \geq 1$ не нужно, так как соответствующие слагаемые при $j_i = 0$ будут равны нулю. Вынесем за скобки общий множитель:

$$\sum_{j: |j|=r+1} \frac{r! \cdot (j_1 + j_2 + \dots + j_m)}{j_1! \cdot j_2! \cdot \dots \cdot j_m!} \cdot a_1^{j_1} \cdot a_2^{j_2} \cdot \dots \cdot a_m^{j_m}$$

Множитель $(j_1 + j_2 + \dots + j_m)$ это по определению высота мультииндекса, то есть он равен $r + 1$. Значит последняя полученная сумма и есть S_{r+1}

□

13 Лемма о дифференцировании «сдвига», формула Тейлора, n-ый дифференциал

Лемма 4 (о дифференцировании «сдвига»):

$E \subset \mathbb{R}^m$, $f \in C^r(E)$ ($f: E \rightarrow \mathbb{R}$), $a \in E$. Пусть $h \in \mathbb{R}^m$: при $t \in [-1, 1]$ вектор $a + th \in E$, определим функцию $\varphi(t) = f(a + th)$, тогда $\varphi \in C^r([-1, 1])$ и $\forall k \leq r$

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{\substack{j: |j|=k \\ j - \text{мультииндекс}}} \frac{k!}{j!} \cdot h^j \cdot \frac{\partial^k f}{\partial x^j}(a + th) \quad (*)$$

Доказательство: Найдём первую производную функции φ как производную композиции:

$$\varphi'(t) = f'(a + th) \cdot h = f'_{x_1}(a + th) \cdot h_1 + f'_{x_2}(a + th) \cdot h_2 + \dots + f'_{x_m}(a + th) \cdot h_m$$

Это формула (*) при $k = 1$. Вторая производная функции φ :

$$\begin{aligned} \varphi''(t) &= \left(\sum_{i=1}^m f'_{x_i}(a + th) \cdot h_i \right)' = \sum_{i=1}^m (f'_{x_i}(a + th))' \cdot h_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f''_{x_i x_j}(a + th) \cdot h_i h_j = \\ &= \sum_{i=1}^m f''_{x_i x_i}(a + th) \cdot h_i^2 + 2 \cdot \sum_{\substack{j=1 \\ i < j}}^m f''_{x_i x_j}(a + th) \cdot h_i h_j \end{aligned}$$

В первом слагаемом написано то, что получается в формуле (*) при $k = 2$ в случае, когда мультииндекс выглядит как $(0, \dots, 0, 2, 0, \dots, 0)$, во втором слагаемом — как $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$. Тогда k -ая производная функции φ :

$$\sum_{i_1=1}^m \sum_{i_2=1}^m \dots \sum_{i_k=1}^m f^{(k)}_{x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}}(a + th) \cdot h_{i_1} h_{i_2} \dots h_{i_k} \stackrel{\text{лемма 3}}{=} \sum_{\substack{j: |j|=k \\ j - \text{мультииндекс}}} \frac{k!}{j!} \cdot h^j \cdot \frac{\partial^k f}{\partial x^j}(a + th)$$

Лемма 3 объединяет слагаемые, которые отличаются перестановкой множителей. В левой части последнего равенства каждое такое слагаемое домножено на соответствующую частную производную k -го порядка и эти производные так же отличаются друг от друга только порядком дифференцирования, значит они равны (так как непрерывны на E по условию). Поэтому слагаемые, которые объединяет лемма домножены на одно и тоже число, и его можно дописать множителем при соответствующем слагаемом. \square

Теорема 7 (формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа):

Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$, ($f: E \rightarrow \mathbb{R}$) $f \in C^{r+1}(E)$, точка $a \in E$, $R \in \mathbb{R}$: $B(a, R) \subset E$, $x \in B(a, R)$, $h = x - a$, тогда $\exists \theta \in (0, 1)$ такое, что:

$$f(x) = \sum_{\substack{k: |k| \leq r \\ k - \text{мультииндекс}}} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot h^k + \sum_{\substack{k: |k|=r+1 \\ k - \text{мультииндекс}}} \frac{f^{(k)}(a + \theta h)}{k!} \cdot h^k$$

$f^{(k)}$ — это другое обозначение для $\frac{\partial^{|k|} f}{\partial x^k}$

Доказательство: Определим функцию $\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ $\varphi(t) = f(a + th)$. Тогда $\varphi \in C^{r+1}([0, 1])$.

Формула Тейлора с центром в точке 0 с остатком в форме Лагранжа для функции φ в единице:

$$\varphi(1) = \sum_{n=1}^r \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!} \cdot 1^n + \frac{\varphi^{(r+1)}(\theta)}{(r+1)!} \cdot 1^{(r+1)}, \quad \theta \in (0, 1)$$

$\varphi(1) = f(a + h) = f(x)$. Используя лемму 4, заменяем производные функции φ . Тогда

$$f(x) = \sum_{n=1}^r \frac{1}{n!} \cdot \sum_{\substack{k: |k|=n \\ k - \text{мультииндекс}}} \frac{n!}{k!} \cdot h^k \cdot f^{(k)}(a) + \sum_{\substack{k: |k|=r+1 \\ k - \text{мультииндекс}}} \frac{1}{(r+1)!} \cdot \frac{(r+1)!}{k!} \cdot h^k \cdot f^{(r+1)}(a + \theta h)$$

Упрощая, получаем доказываемую формулу. \square

Замечание 8: Явный вид многочлена Тейлора порядка r функции f в точке a :

$$T_r(f, a)(x) = \sum_{k=1}^r \sum_{\substack{(i_1, \dots, i_m) \\ i_1 + \dots + i_m = k \\ i_1, \dots, i_m \geq 0}} \frac{1}{i_1! \cdot \dots \cdot i_m!} \cdot \frac{\partial^k f}{(\partial x_1)^{i_1} (\partial x_2)^{i_2} \dots (\partial x_m)^{i_m}}(a) \cdot (x_1 - a_1)^{i_1} \cdot (x_2 - a_2)^{i_2} \cdot \dots \cdot (x_m - a_m)^{i_m}$$

Следствие 5: В остатке формулы Тейлора есть множитель

$$h^k = \left(\frac{h_1}{\|h\|} \right)^{k_1} \cdot \left(\frac{h_2}{\|h\|} \right)^{k_2} \cdot \dots \cdot \left(\frac{h_m}{\|h\|} \right)^{k_m} \cdot \|h\|^{r+1}$$

А производная $f^{(k)}(a + \theta h)$ ограничена в некоторой окрестности точки a , замыкание которой содержится в E , потому что $f^{(k)}$ непрерывна на E . Значит остаток в формуле Тейлора это $огр. \cdot \|h\|^r \cdot \|h\| = o(\|h\|^r)$, при $x \rightarrow a$. Он называется остатком в форме Пеано.

Определение 31: Однородный многочлен от h степени n

$$d^n f(a, h) = \sum_{\substack{(i_1, \dots, i_m) \\ i_1 + \dots + i_m = n \\ i_1, \dots, i_m \geq 0}} \frac{n!}{i_1! \cdot i_2! \cdot \dots \cdot i_m!} \cdot \frac{\partial^n f}{(\partial x_1)^{i_1} (\partial x_2)^{i_2} \dots (\partial x_m)^{i_m}}(a) \cdot h_1^{i_1} \cdot h_2^{i_2} \cdot \dots \cdot h_m^{i_m}$$

называется **n -ым дифференциалом** функции f в точке a .

Тогда формулу Тейлора можно записать в виде $f(x) = f(a) + \sum_{k=1}^r \frac{d^k f(a, x-a)}{k!} + o(\|h\|^r)$

14 Последовательность функций, поточечная и равномерная сходимость, теорема Стокса-Зайдля

Определение 32: Последовательность функций — это отображение из \mathbb{N} в множество функций.

Определение 33: Пусть X — множество, Y — метрическое пространство, $f, f_1, f_2, \dots : X \rightarrow Y$, последовательность отображений f_n **сходится поточечно** к отображению f на множестве $E \subset X$ означает, что $\forall x_0 \in E \ f_n(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_0)$, т.е.

$$\forall x_0 \in E \ \forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \forall n > N \text{ выполнено } \rho(f_n(x_0), f(x_0)) < \varepsilon$$

Определение 34: Последовательность отображений f_n **сходится равномерно** к отображению f на множестве E если $\sup_{x \in E} \rho(f_n(x), f(x)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \forall n > N \ \forall x \in E \text{ выполнено } \rho(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$$

Обозначение: $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{E} f$

Замечание 9:

1. Из равномерной сходимости следует поточечная сходимость (наоборот нет)
2. Если $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{E} f$ и $E_0 \subset E$, то $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{E_0} f$

Лемма 5 (или следующий пункт замечания):

Пусть X — множество, Y — метрическое пространство, $\mathcal{F} = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ — ограничено}\}$ (f — ограничено означает, что $\exists y_0 \in Y, r \in \mathbb{R} : \forall x \in X$ выполнено $f(x) \in B(y_0, r)$). Тогда функция $\rho_{\mathcal{F}}: \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что $\rho_{\mathcal{F}}(f_1, f_2) = \sup_{x \in X} \rho(f_1(x), f_2(x))$ является метрикой на \mathcal{F} .

Доказательство: Выполнение первых двух аксиом метрики (опр. 4) следует из их выполнения в метрике на Y . Неравенство треугольника: при любом $x \in X$ выполнено

$$\rho(f_1(x), f_2(x)) \leq \rho(f_1(x), g(x)) + \rho(g(x), f_2(x)) \leq \rho_{\mathcal{F}}(f_1, g) + \rho_{\mathcal{F}}(g, f_2) \quad \forall f_1, f_2, g \in \mathcal{F}$$

Правая часть неравенства не зависит от x , поэтому она является верхней границей (для множества чисел $\{\rho(f_1(x), f_2(x)) \mid x \in X\}$), тогда она больше либо равна точной верхней границы $\Rightarrow \rho_{\mathcal{F}}(f_1, f_2) \leq \rho_{\mathcal{F}}(f_1, g) + \rho_{\mathcal{F}}(g, f_2)$ \square

Теорема 8 (Стокса-Зайдля):

Отображение f и последовательность отображений f_n действуют $X \rightarrow Y$, где X, Y — метрические пространства. Пусть все отображения из последовательности непрерывны в точке $c \in X$ и $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$. Тогда f непрерывна в точке c .

Доказательство: Применяя два раза неравенство треугольника к $\rho(f(x) - f(c))$, получаем

$$\rho(f(x) - f(c)) \leq \rho(f(x) - f_n(x)) + \rho(f_n(x) - f(c)) \leq \rho(f(x) - f_n(x)) + \rho(f_n(x) - f_n(c)) + \rho(f_n(c) - f(c))$$

Из определения равномерной сходимости f_n к f ($\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \sup_{x \in X} \rho(f_n(x) - f(x)) < \varepsilon$) получаем, что $\forall \varepsilon > 0$ первое и последнее слагаемое в правой части неравенства $< \varepsilon$. Из определения непрерывности f_n в точке c ($\forall \varepsilon > 0 \exists U(c) : \text{если } x \in U(c), \text{ то } \rho(f_n(x) - f_n(c)) < \varepsilon$) получаем, что $\exists U(c)$ — окрестность точки x такая, что если $x \in U(c)$, то второе слагаемое из правой части неравенства $< \varepsilon$. Складывая, получаем, что $\rho(f(x) - f(c)) < 3 \cdot \varepsilon$. Получилось определение непрерывности f в точке c . \square

Следствие 6: Если $f_n \in C(X)$ и $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$, то $f \in C(X)$.

Замечание 10:

1. В теореме 8 достаточно того, чтобы X было топологическим пространством.
2. В теореме 8 достаточно требовать равномерную сходимость f_n к f только в некоторой окрестности точки c .
3. В следствии (сл. 6) достаточно требовать локальную равномерную сходимость, то есть $\forall x \in X \exists U(x) : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{U(x)} f$. Из локальной равномерной сходимости не следует обычная.

Например, $X = (0, 1)$, $f_n(x) = x^n$:

Поточечная сходимость: $x^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ на $(0, 1)$.

Локальная равномерная сходимость: $\sup_{(\alpha, \beta)} |x^n - 0| = \beta^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \quad \forall (\alpha, \beta) \subset (0, 1), \beta \neq 1$

Обычной равномерной сходимости нет: $\sup_{(0, 1)} |x^n - 0| = 1$

15 Полнота пространства непрерывных функций на компакте, предельный переход под знаком интеграла для последовательностей, правило Лейбница

Теорема 9 (о полноте пространства непрерывных функций на компакте):

Пусть K — компактное метрическое пространство, тогда $C(K) = \{f: K \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ — непрерывно}\}$ есть полное метрическое пространство относительно метрики $\rho(f_1, f_2) = \sup_K |f_1(x) - f_2(x)|$

1. $\rho(f_1, f_2) = \sup_K |f_1(x) - f_2(x)|$ является метрикой по лемме 5, т.к. непрерывные функции на компакте — ограничены (теорема Вейерштрасса)
2. Метрическое пространство называется компактным, если из любого покрытия пространства открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие.
3. Метрическое пространство называется полным, если в нём любая фундаментальная последовательность сходится.
4. Последовательность x_n называется фундаментальной, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n, m > N \text{ выполнено } \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$$

5. Если последовательность сходится, то она фундаментальная. Доказательство: $\forall \varepsilon > 0$ из определения сходимости x_n к a ($\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n > N$ выполнено $\rho(x_n, a) < \varepsilon$) возьмём $n, m > N$, тогда, используя неравенство треугольника, получаем $\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, a) + \rho(a, x_m) < 2\varepsilon$. Получилось **определение фундаментальности**.

Доказательство: Нужно доказать, что любая фундаментальная последовательность сходится. Возьмём фундаментальную последовательность f_n , то есть для которой выполнено. Тогда $\forall x_0 \in K$ последовательность $f_n(x_0)$ — фундаментальная, и она вещественная \Rightarrow она сходится. Обозначим её предел $f(x_0)$. Определение фундаментальности $f_n(x)$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n, m > N \quad \forall x_0 \in K \text{ выполнено } |f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon$$

При каждом фиксированном x_0 делаем предельный переход при $m \rightarrow \infty$, получаем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n > N \quad \forall x_0 \in K \text{ выполнено } |f_n(x_0) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$

То есть f_n сходится к f равномерно. Тогда f непрерывна на K по теореме 8, то есть $f \in C(K)$, а сходимость последовательности в $C(X)$ — это равномерная сходимость функциональных последовательностей. \square

Замечание 11:

1. Пространство $\mathcal{F} = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ — ограничено}\}$, где X — множество, Y — полное метрическое пространство, тоже является полным.
2. Пространство $C_M(K) = \{f: K \rightarrow Y \mid f \text{ — непрерывно}\}$, где K — компактное метрическое пространство, Y — полное метрическое пространство, тоже является полным.
3. В $C(K)$ равномерная сходимость последовательности $f_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n, m > N$ выполнено $\sup_K |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$

Теорема 10 (о предельном переходе под знаком интеграла для последовательностей):

Пусть $f_n \in C[a, b]$ и $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{[a, b]} f$, тогда $\int_a^b f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \int_a^b f$

Доказательство: Используя определение равномерной непрерывности, получаем

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f_n - f| \leq \sup_{[a,b]} |f_n - f| \cdot (b - a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

□

Теорема 11 (правило Лейбница дифференцирования интеграла по параметру):

Пусть $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, f и f'_y — непрерывны на $[a, b] \times [c, d]$, $\Phi: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$, тогда Φ — дифференцируема на $[c, d]$ и $\Phi'(y) = \int_a^b f'_y(x, y) dx$

Доказательство: По Гейне, возьмём последовательность $h_n \rightarrow 0$, тогда

$$\frac{\Phi(y + h_n) - \Phi(y)}{h_n} = \frac{\int_a^b f(x, y + h_n) dx - \int_a^b f(x, y) dx}{h_n} \stackrel{\text{т. Лагранжа}}{=} \int_a^b f'_y(x, y + \theta h_n) dx, \quad \theta \in (0, 1)$$

По теореме Кантора (непрерывная функция на компакте равномерно непрерывна) f'_y равномерно непрерывна, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in [a, b] \times [c, d], \text{ если } \|x_1 - x_2\| < \delta, \text{ то } |f'_y(x_1) - f'_y(x_2)| < \varepsilon$$

Фиксируем $\varepsilon > 0$, тогда $\exists \delta > 0$ (из определения равномерной непрерывности) и для этого $\delta \exists N : \forall n > N$ выполнено $|h_n| < \delta$ (из определения сходимости последовательности h_n к 0). Тогда, из определения равномерной непрерывности, так как $\|(x, y + \theta h_n) - (x, y)\| < \delta$, то $|f'_y(x, y + \theta h_n) - f'_y(x, y)| < \varepsilon$, или $\left| \int_a^b f'_y(x, y + \theta h_n) dx - \int_a^b f'_y(x, y) dx \right| \leq \varepsilon \cdot (b - a)$, значит

$$\int_a^b f'_y(x, y + \theta h_n) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f'_y(x, y) dx, \text{ то есть } \Phi'(y) = \lim_{h_n \rightarrow 0} \frac{\Phi(y + h_n) - \Phi(y)}{h_n} = \int_a^b f'_y(x, y) dx$$

□