Навеску хлорида двухвалентного металла массой 0.792 г растворили в воде. К полученному раствору прибавили избыток раствора карбоната калия. Выпавший осадок средней соли растворили в избытке соляной кислоты и к образовавшемуся раствору добавили избыток серной кислоты до полного осаждения катионов металла. Выделившийся осадок отфильтровали, промыли водой и высушили, получили 0.917 г белого порошка.

- 1) Определите, хлорид какого металла был взят. Ответ подтвердите расчетом.
- 2) Напишите уравнения всех реакций в молекулярном и ионном виде.
- 3) Почему осадок надо было промывать водой? Ответ обоснуйте.

Решение:

1. Определение формулы хлорида.

Металл двухвалентный – хлорид - MCl₂, сульфат – MSO₄.

Обозначим атомную массу металла через X. Тогда молярная масса хлорида = X + 71, а сульфата = X +96

Число моль хлорида и сульфата одинаково. На этом основании составляем уравнение

$$0.792/(X+71) = 0.917/(X+96)$$
 Откуда $X = 87.4$ г/моль.

Обращаясь к Периодической системе, делаем заключение, что металл – стронций.

Искомый хлорид — $SrCl_2$.

2. Уравнения протекающих реакций:

$$MCl_2 + K_2CO_3 = MCO_3 \downarrow + 2KCl$$

 $MCO_3 + 2HCl = MCl_2 + CO_2 \uparrow + H_2O$
 $MCl_2 + H_2SO_4 = MSO_4 \downarrow + 2HCl$

Уравнения реакций в ионном виде (приводим сокращенные ионные уравнения):

$$M^{2+} + CO_3^{2-} \rightleftarrows MCO_3 \downarrow$$

 $MCO_3 + 2H^+ \rightleftarrows M^{2+} + CO_2 \uparrow + H_2O$
 $M^{2+} + SO_4^{2-} \rightleftarrows MSO_4 \downarrow$

3. Промывание осадка водой необходимо для того, чтобы отмыть от него серную кислоту, т.к. в избытке серной кислоты возможно образование растворимой кислой соли по реакции, что вносит погрешность в определение массы сульфата стронция.

$$MSO_4 + H_2SO_4 = M(HSO_4)_2$$

в ионном виде:

$$MSO_4 \downarrow + H^+ \rightleftarrows M^{2+} + HSO_4^-$$