

Manuel de Mathématiques de niveau collège

Alexandre Gaubil

Dernière mise à jour le 15 juin 2021

Première partie

Logique

La Logique est la branche de la mathématique qui étudie la mathématique en tant que langage qui peut permet d'écrire des formules ou propositions qui peuvent être vraies ou fausses.

Chapitre 1

Concepts de base

La mathématique est un ensemble de concepts. Pour pouvoir comprendre la mathématique, il est important d'être familier avec certains concepts auparavant. Ces concepts nous permettent de mieux comprendre les idées sous-jacentes de la mathématique—autrement dit, nous pourrions mieux comprendre pourquoi nous faisons certaines choses d'une certaine manière et non pas d'une autre.

1.1 Logique

La logique est l'étude de *relations entre proposition*. Une proposition est une idée qui peut être vraie, fausse, ou indéterminée (dont on ne sait pas si elle est vraie ou fausse). Par exemple, “un triangle a trois sommets” est une proposition qui est vraie, “un chat a cinq pattes” est une proposition qui est fausse et “il fait soleil” est une proposition indéterminée—nous ne savons pas à priori s'il fait soleil ou non. Nous pouvons établir des relations entre propositions. Par exemple, nous pouvons établir une relation d'implication (une chose entraîne ou implique une autre) entre les trois propositions suivantes : “Minouchette est un chat” et “les chats ont quatre pattes” implique “Minouchette a quatre pattes”. En effet, si Minouchette est un chat et les chats ont quatre pattes, nous pouvons en déduire que Minouchette doit avoir quatre pattes.

Les connecteurs logiques (le terme formel pour relations) les plus communes sont les suivantes :

- “et” (\wedge) : “Minouchette est un chat” **et** “les chats ont quatre pattes” ;
- “ou” (\vee) : “il fait jour” **ou** “il fait nuit” ;
- “negation” (\neg) : la négation de “Minouchette est un chat” est “Minouchette **n'est** pas un chat” ;
- “implication” (\implies) : “Minouchette est un chat” et “les chats ont quatre pattes” **implique** “Minouchette a quatre pattes” ;
- “équivalence” (\iff) : “il fait jour” **est équivalent à** “il ne fait pas nuit”.

Exercice 1. Indique les connecteurs logiques dans les propositions suivantes :

A. J'ai un chat et un chien.

B. Je mangerai soit de la soupe, soit une salade.

C. Si une figure a trois sommets, alors c'est un triangle.

1.2 Axiomes

Nous avons vu dans la section précédente que la logique est l'étude des relations entre propositions. En mathématique, nous prenons certaines propositions comme étant vraie (par exemple, nous considérons comme vrai le fait que 1 est un nombre entier). Nous appelons ces propositions que nous prenons comme vraie des *axiomes*. Il est important de noter que nous ne pouvons pas démontrer ces axiomes. Nous ne pouvons pas montrer que 1 est un nombre entier. Plutôt, nous le déclarons comme étant vrai. Pour certaines de ces vérités moins importantes, nous ne les appelons pas axiomes mais définitions. Ensuite, nous utilisons ces axiomes et définitions pour démontrer à l'aide d'une succession de relations entre propositions de nouvelles vérités que nous appelons théorèmes, lemmes, propositions, etc.

Exemple 1: Un autre axiome qui est utilisé en mathématique sont “tout nombre entier a un successeur (un nombre qui vient après lui)”. Par exemple, nous notons le successeur de 1 $S(1)$ ou 2. De même, nous notons le successeur de 2 $S(2)$, $S(S(1))$ ou 3.

1.3 Qualificatifs

Dans l'exemple 1.2, nous avons vu que “tout nombre entier a un successeur”. Il y a deux qualificatifs clés dans cet axiome : “tout” et “a”. Le premier indique que la proposition s'applique à un ensemble de nombres

Deuxième partie

Arithmétique


L'Arithmétique est la branche de la mathématique qui étudie les nombres et les opérations de base telles que l'addition ou la multiplication.

Chapitre 2


Les Nombres Relatifs

2.1 Introduction aux nombres relatifs

Nous avons vu que nous pouvons créer des nombres de plus en plus grands. Pour le montrer, faisons une démonstration rapide. Supposons qu'il existe un nombre qui soit le plus grand nombre possible. Prenons ensuite ce nombre plus 1. Nous savons que ce nouveau nombre est plus grand que le nombre qui était supposé être le plus grand possible, ce qui ne fait pas de sens. On peut toujours créer des nombres de plus en plus grand. Cependant, nous ne pouvons pas faire l'inverse. Nous ne connaissons (pour l'instant du moins) aucun nombre plus petit que 0.



Les mathématiciens aimant faire les choses symétrique, ils se sont alors mis à créer des nombres plus petits que 0. Comment ? Tout comme nous avons fait au-dessus pour trouver un nombre plus grand, nous allons prendre le plus petit nombre que nous connaissons, soit 0, et allons lui soustraire 1 (au lieu d'ajouter 1—en effet, nous souhaitons faire un nombre plus *petit*, et non plus *grand*). Nous appelons ce nombre -1 . Si nous souhaitons faire un nombre plus petit encore, nous pouvons soustraire 1 de nouveau, ce qui nous donne -2 .



On introduit alors le concept de *nombre négatif*, soit des nombres plus petit que 0. Pour avoir un nom commun à tous ces nombres, nous créons le concept de *nombre relatif*, soit un nombre qui peut-être positif ou négatif. Les nombres négatifs ont un signe $-$ devant (par exemple, -2). Les *nombres positifs*, soit ceux que nous connaissons déjà, ont soit un signe $+$ devant, soit aucun signe (par exemple, 3 ou $+9$).

Exemple 2: Différentes écritures équivalentes (qui veulent dire la même chose) :

$$\begin{aligned} & 3 - 2 \\ &= 3 + (-2) \\ &= +3 - 2 \\ &= +3 + (-2) \end{aligned}$$

Nous introduisons aussi le concept d'*opposé*.

Définition 1. L'opposé d'un nombre est le nombre qui, ajouté à celui-ci, donne 0.

Exemple 3: -3 est l'opposé de 3 car $3 + (-3) = 3 - 3 = 0$. 2 est l'opposé de -2 car $-2 + 2 = 2 + (-2) = 2 - 2 = 0$.

0 est positif et négatif. Il est donc son propre opposé.

Exercice 2. Quel est l'opposé de 12 ? De -5 ? De 0 ? De 8.5 ? De -181.9 ?

2.2 Règles de calcul

Règle des signes

Que se passe-t-il quand deux signes se suivent ? Les règles ci-dessous sont appliquées.

Signes	Résultat
+ et +	+
- et -	+
+ et -	-
- et +	-

Exemple 4: $++3 = 3$, $--3 = 3$, $+ - 3 = -3$ et $- + 3 = -3$.

Astuce 1. Une bonne règle pour se souvenir de la règle des signes : l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi, l'ami de mon ennemi est mon ennemi et l'ennemi de mon ami est mon ennemi.

Exercice 3. Simplifie les signes suivants : $+ - 9$, $- - 10$, $- + 0$.

Reformulation de la soustraction

Propriété 1. Soustraire un nombre est équivalent à ajouter son opposé.

Exemple 5: $19 - 8 = 19 + (-8) = 11$.

Exercice 4. Calcule les résultats des opérations suivantes : $9 - 3$, $9 + (-5)$, $5 - 9$, $0 - 1$, $-83 - 12$.

Ordre

Propriété 2. Prenons deux nombres. S'ils sont de signe positif, ils respectent la règle de l'ordre que nous connaissons. Si les deux nombres sont de signe opposés, le plus petit est le négatif. S'ils sont tous les deux négatifs, ils sont rangés dans l'ordre inverse de leur opposés.

Exemple 6: $2 < 5$, $-2 < 1$, $6 > -4$, $-2 > -3$ et $-6 < -1$.

Exercice 5. Range dans l'ordre croissant les nombres suivants : 5 , 9 , -1 , -10 , 7.8 , 0 , -29.3 , -29 , -28 , -29.6 .

Produit

Propriété 3. Pour calculer le produit de deux nombres relatifs, on commence par calculer le résultat en ignorant les signes. Puis, on applique la règle des signes aux signes et on applique ce signe au résultat du produit.

Exemple 7: Pour calculer 5×-3 , on fait $5 \times 3 = 15$. Puis, d'après la règle des signes, on a $+- = -$. Donc le résultat est -15 .

Exercice 6. Effectue les calculs suivants : -8×2 , -7×-7 , 0×-1 .

Chapitre 3

Calcul Littéral

3.1 Introduction

En mathématiques, nous n'aimons pas travailler avec des nombres spécifiques. Nous préférons largement pouvoir trouver des formules qui peuvent marcher pour n'importe quel nombre. Par exemple, la formule de l'aire d'un carré : $\mathcal{A} = l \times l$, avec l étant la longueur d'un côté, est beaucoup plus pratique que de devoir retenir l'aire de tous les carrés possibles. Pour cela, il nous faut définir quelque chose de nouveau : le *calcul littéral*.

Lorsque que nous faisons du calcul littéral, nous n'utilisons pas que des nombres. Nous utilisons également des *inconnues*, soit quelque chose qui peut prendre n'importe quelle valeur. Par exemple, dans la formule de l'aire d'un carré, l et \mathcal{A} sont des inconnues. On représente une inconnue par une lettre.

Attention ! La manière d'écrire une lettre est importante. l , L , et \mathcal{L} sont toutes des inconnues représentant des nombres différents.


Définition 2. Une *inconnue* est une lettre qui représente un nombre de valeur inconnue.

Exemple 8: Dans la formule pour l'aire d'un carré ($\mathcal{A} = l \times l$), l , qui représente la longueur d'un côté, est une inconnue.

Définition 3. Un calcul avec des inconnues est appelé une *expression littérale*.

Exemple 9: La formule pour l'aire d'un carré est une expression littérale.

Exercice 7. Je cherche une formule pour la longueur suivante :



Exprime le résultat en fonction de a et b .

3.2 Bases du calcul littéral

Simplification d'écriture

Les mathématiciens sont paresseux : ils n'aiment pas écrire plus que nécessaire. Ainsi, ils ont trouver des moyens de simplifier l'écriture. Les écritures suivantes sont équivalentes :

Écriture Longue	Écriture courte
$2 \times a$	$2a$
$a \times b$	ab
$2 \times (a - 4)$	$2(a - 4)$
3×3	3^2 (se lit “3 au carré”)
$3 \times 3 \times 3$	3^3 (se lit “3 au cube”)

Attention ! On ne peut pas écrire 2×3 sous la forme 23, pour des raisons évidentes. . .

Exercice 8. Simplifie les écritures suivantes autant que possible $5 \times x \times 3$.

Appliquer une formule

Pour appliquer une formule, on remplace les inconnues par leur valeur.

Exemple 10: Pour appliquer la formule de l’aire d’un carré ($\mathcal{A} = l^2$) pour un carré de côté de longueur 5, on remplace l par 5. On a alors $\mathcal{A} = l^2 = 5^2 = 5 \times 5 = 25$.

3.3 Distributivité et factorisation

Distributivité simple

La multiplication est *distributive* par rapport à l’addition. Qu’est-ce que cela signifie ? Pour trois nombres a , b et c , on a :

$$a(b + c) = ab + ac \quad (3.1)$$

ou

$$a(b - c) = ab - ac \quad (3.2)$$

Exemple 11: $2(4 + 5) = 2 \times 9 = 18$ et $2 \times 4 + 2 \times 5 = 8 + 10 = 18$. Donc $2(4 + 5) = 2 \times 4 + 2 \times 5$.

Définition 4. *Factoriser* est l’inverse de la distribution : on trouve un *facteur* (nombre(s) par lequel tous les termes d’une somme sont multipliés) commun à plusieurs termes (par exemple, a dans $ab + ac + ad + \dots + az$) et on le retire de tous les termes, pour obtenir $a(b + c + d + \dots + z)$.

Exemple 12: Factoriser $2x + 4y + 8$ donne $2(x + 2y + 4)$, car $2x + 4y + 8 = 2 \times x + 2 \times 2y + 2 \times 4$.

Distributivité double

En appliquant la formule de distributivité simple deux fois, nous avons, pour tout nombres a , b , c et d :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

3.4 Équations

Définition 5. Une *équation* est une égalité à trous où les trous sont des inconnues.

Exemple 13: On peut représenter $3 - \dots = 2$ par $3 - x = 2$.

Définition 6. Une équation est composé de deux *membres*, un de chaque côté du signe $=$.

Exemple 14: $3 - x = 2$ a deux membres : $3 - x$ et 2.

Tester une égalité

Pour vérifier si une égalité est vraie pour certaines valeurs, calcule chaque membre de l'équation séparément pour la valeur donnée. Puis, on compare les deux résultats. Si les deux résultats sont égaux, on dit que cette valeur est une *solution* du système ou de l'équation.

Exemple 15: Pour vérifier si $x = 2$ est une solution du système $2 - x = x - x$, on calcule chaque membre séparément. Pour le premier, on obtient $2 - 2 = 0$ et pour le second, $2 - 2 = 0$. Donc oui, $x = 2$ est une solution du système.

Exercice 9. Vérifie si $x = 0$ et $x = 1$ sont des solutions du système $1.5x - 4 = -4$.

Opérations sur une équations

On peut faire certaines opérations sur une équation. Pour que cela soit valide, on doit faire la même opération sur les deux membres. Les opérations qui sont valides sont :

- ajouter quelque chose à chaque membre,
- soustraire quelque chose à chaque membre,
- multiplier chaque membre par quelque chose,
- diviser chaque membre par quelque chose.

Lorsque nous effectuons une de ces opérations, nous ne changeons pas l'équation : nous disons que ces équations sont *équivalentes*.

Exemple 16: Les équations suivantes sont équivalentes :

$$\begin{array}{ll} x = 1 & \\ x - 2 = -1 & \text{(soustraire 2 à chaque membre)} \\ x + 2 = 3 & \text{(ajouter 2 à chaque membre)} \\ 2x = 2 & \text{(multiplier chaque membre par 2)} \\ \frac{x}{2} = \frac{1}{2} & \text{(diviser chaque membre par 2)} \end{array}$$

Exercice 10. Les équations suivantes sont-elles équivalentes ?

A. $x - 1 = 0$

D. $2x - 2 = 0$

B. $x = 1$

E. $x^2 - x = 0$

C. $x^2 - 1 = 0$

Résoudre une équation

Résoudre une équation revient à trouver les valeurs des inconnues pour que l'égalité soit vraie. Pour ce faire, nous devons utiliser les opérations vu dans la section précédente pour *isoler* l'inconnue dans un membre (n'avoir que l'inconnue dans un membre). La valeur de l'inconnue est alors dans l'autre membre.

Exemple 17: Pour résoudre l'équation $x - 3 = 5$, on fait :

$$\begin{array}{ll} x - 3 = 5 & \\ \iff x - 3 + 3 = 5 + 3 & \text{(soustraire 3 à chaque membre)} \\ \iff x = 8 & \end{array}$$

Donc la solution du système est $x = 8$.

Exemple 18: Pour résoudre l'équation $\frac{x}{2} = 8$, on fait :

$$\begin{aligned}\frac{x}{2} &= 8 \\ \Longleftrightarrow \frac{x}{2} \times 2 &= 8 \times 2 \quad (\text{multiplier chaque membre par } 2) \\ \Longleftrightarrow x &= 16\end{aligned}$$

Donc la solution du système est $x = 16$.

Astuce 2. Pour vérifier la solution d'une équation, on peut tester l'égalité pour la valeur de la solution. Si l'égalité tiens, notre solution est bonne. Sinon, notre solution n'est pas bonne.

Exercice 11. Résout les équations suivantes : $2 + x = 7$, $9x = 8$, $2x - 1 = 6$, $3 = x$. Vérifie tes solutions après les avoir trouvées.

Équations produit-nul

Quel type de produit donne 0 ? Lorsque nous avons un produit de plusieurs nombres dont le résultat est nul, un de ces nombres doit être nul. Par exemple, $3a = 0$ implique que $a = 0$. On a alors la propriété suivante :

Propriété 4. Si on a $ab = 0$, les solutions sont $a = 0$ ou $b = 0$.

Chapitre 4

Opérations de base

4.1 Introduction

Definition 4.1.1. Une *opération* est un processus nous permettant d'obtenir un résultat à partir d'un ou plusieurs *opérandes*.

En *arithmétique* (la mathématique qui étudie les nombres), nous avons quatre opérations de base : l'*addition*, la *soustraction*, la *multiplication* et la *division*.

Note sur la notation : le symbole \forall signifie “pour tout”. Le symbole \exists signifie “il existe”.

4.2 Addition et soustraction

Propriété de l'addition

Les propriétés de l'addition sont :

- *commutative* : $\forall a, b, a + b = b + a$;
- *associative* : $\forall a, b, c, (a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$;
- existence d'un *opposé* : $\forall a, \exists -a$ tel que $a + (-a) = 0$.

L'addition possède aussi un *élément neutre* (un élément qui ne change pas l'autre nombre) : $\forall a, a + 0 = a$.

Propriété de la soustraction

La soustraction est :

- *anticommutative* : $\forall a, b, a - b = -(b - a)$;
- pas *associative* : en général, $a - (b - c) \neq (a - b) - c$;
- *involutive* : $\forall a, a - a = 0$.

La soustraction possède un *élément neutre* seulement à droite : $\forall a, a - 0 = 0$, mais $0 - a \neq a$.

Lien entre addition et soustraction

On peut considérer la soustraction comme un cas particulier de l'addition. En effet, $\forall a, b$, on a $a - b = a + (-b)$.

4.3 Multiplication et division

Propriété de la multiplication

Les propriétés de la multiplication :

- *associativité* : $\forall a, b, c, a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$;
- *commutativité* : $\forall a, b, a \times b = b \times a$;
- existence d'un *élément neutre* : $\forall a, a \times 1 = a$;
- existence d'un *inverse* : $\forall a \neq 0, \exists \frac{1}{a}$ tel que $a \times \frac{1}{a} = 1$;
- existence d'un *élément absorbant* : $\forall a, a \times 0 = 0$.

Propriété de la division

Les propriétés de la division :

- *non-associativité* : $\forall a, b, c, a \div (b \div c) \neq (a \div b) \div c$;
- *non-commutativité* : $\forall a, b, a \div b \neq b \div a$;
- existence d'un *élément neutre* à droite : $\forall a, a \div 1 = a$;
- existence d'un *élément absorbant* à gauche : $\forall a, 0 \div a = 0$.

Lien entre multiplication et division

On peut considérer la division comme un cas particulier de la multiplication. En effet, $a \div b = a \times \frac{1}{b}$.

4.4 Symétrie entre addition et multiplication

Il y a une certaine forme de symétrie entre l'addition et la multiplication.

Propriété	Addition	Multiplication
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
Élément neutre	$a + 0 = a$	$a \times 1 = a$
Opposé / inverse	$a + (-a) = 0$	$a \times \frac{1}{a} = 1$
Écriture	Somme de n a : $a + a + \dots + a = a^n$	Produit de n a : $a \times a \times \dots \times a = a^n$
Opération inverse	Soustraction : $a + (-b) = a - b$	Division : $a \times \frac{1}{b} = a \div b$

Propriété	Soustraction	Division
Non-associativité	$a - (b - c) \neq (a - b) - c$	$a \div (b \div c) \neq (a \div b) \div c$
Anti-commutativité	$a - b = -(b - a)$	$a \div b = 1 \div (b \div a)$ (si $a \neq 0$)
Élément neutre	$a - 0 = a$ (à droite seulement : $0 - a \neq a$)	$a \div 1 = a$ (à droite seulement : $1 \div a \neq a$)
Involutive	$a - a = 0$	$a \div a = 1$
Opération inverse	Addition : $a - b = a + (-b)$	Multiplication : $a \div b = a \times \frac{1}{b}$

4.5 Exposants et racines

Exposants

Définition 7. L'*exponentiation* est une opération, définie de la façon suivante : $a \times a \times \cdots \times a = a^n$.

Propriété 5. Les exposants ont les propriétés suivantes :

- $a^{b+c} = a^b \times a^c$;
- $(ab)^c = a^c \times b^c$;
- $(a^b)^c = a^{bc}$.

Exemple 19: On a : $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, $2^{4+3} = 2^4 \times 2^3 = 16 \times 8 = 128 = 2^7$.

Racines

Définition 8. La *racine* est l'opération inverse des exposants. On la définit comme suit : $\sqrt[n]{a^n} = a$.
 $\sqrt[n]{a}$ n'est défini que pour $a \geq 0$.

Propriété 6. Nous avons la propriété suivantes : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

Notations

Il existe de nombreuses façons d'écrire un nombre. Dans cette section, nous verrons plusieurs systèmes de notation particulièrement utilisés.

Le système décimal est le système de notation utilisé le plus couramment. Dans ce système, nous écrivons les nombres en utilisant les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Le système de numération romaine fut développé par les romains et provient de pratiques développées avant l'apparition de l'écriture—il y a donc très longtemps. Aujourd'hui, ils sont principalement utilisés pour désigner les siècles (ex. : **XXI^e** siècle) et le numéro d'ordre des noms de souverains (ex. : Louis **XIV**). Les règles d'utilisation de ce système d'écriture sont les suivantes :

- 1 s'écrit I, 2 s'écrit II et 3 s'écrit III;
- 5 s'écrit V, 10 s'écrit X, 50 s'écrit L, 100 s'écrit C, 500 s'écrit D et 1000 s'écrit M;
- tout symbole qui suit un symbole de valeur supérieure ou égale s'ajoute à celui-ci (ex. : 6 s'écrit VI);
- tout symbole qui précède un symbole de valeur supérieure se soustrait à ce dernier (ex. : 4 s'écrit IV).

Quelques exemples pour mieux comprendre : XVI = X + V + I = 10 + 5 + 1 = 16, XL = L - X = 50 - 10 = 40, XIV = X + (V - I) = 10 + (5 - 1) = 14.

Dans de nombreuses disciplines scientifiques telles que la physique (l'étude des phénomènes naturels de l'univers), la chimie (l'étude de certains types de transformations de la matière impliquant des électrons) ou la géologie (l'étude de la Terre), nous avons affaire à de très grands ou très petits nombres. Par exemple, un gogol ($10\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$) ou la masse d'un nucléon ($0.000\ 938\ 272\ 088\ 609\ 734\ 634\ 030\ 158\ 628\ 119\ 125\ 015\ 246\ 566\ 488\ 004\ 879\ 272\ 474\ 667$). La notation décimale devient

alors très rapidement encombrante, surtout lors de calculs impliquant plusieurs de ces valeurs. Les mathématiciens ont donc eu l'idée d'utiliser les exposants (que nous avons vu dans le chapitre 4.5)

Troisième partie

Analyse

L'Analyse est la branche de la mathématique qui étudie la notion de limite (des objets qui deviennent de plus en plus petits ou grands) ainsi que des fonctions.

Quatrième partie

Géométrie

La Géométrie est la branche de la mathématique qui étudie les espaces (dans notre cas, les espaces de deux ou trois dimensions, que nous nommons respectivement le plan et l'espace).


Chapitre 6

Propriétés des triangles


6.1 Droites et segments remarquables

Médiatrices

Définition 9. La *médiatrice* d'un segment est la droite qui passe par le milieu du segment et qui lui est perpendiculaire.



Propriété 7. Si un point est sur la médiatrice d'un segment alors il est *équidistant* des extrémités de ce segment. Réciproquement, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point est sur la médiatrice de ce segment.




Exemple 20: Dans l'image au-dessus, les deux segments bleus sont de même longueur.

Propriété 8. Les médiatrices des côtés d'un triangle non aplati sont concourantes en un point qui est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit.

Propriété 9. Si l'un des côtés d'un triangle est un diamètre de son cercle circonscrit, alors ce triangle est rectangle (le diamètre du cercle circonscrit est alors son hypoténuse).

Bissectrices

Définition 10. La bissectrice d'un angle est la droite qui partage cet angle en deux angles égaux.



Propriété 10. Si un point est sur la bissectrice d'un angle, alors il est à égale distance des côtés de l'angle et inversement.


Propriété 11. Les trois bissectrices d'un triangle sont concourantes. Leur point de concours, étant équidistant des trois côtés du triangle, est le centre d'un cercle tangent aux trois côtés du triangle. Ce cercle est appelé cercle inscrit au triangle.

6.2 Théorème de Pythagore et réciproque


Théorème de Pythagore

Propriété 12. [Théorème de Pythagore] Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse (le côté opposé à l'angle droit) est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Démonstration. La démonstration du théorème de Pythagore est particulièrement connue. Elle commence traditionnellement avec la figure suivante.



□




Formule de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 + CB^2$$

Exemple 21: Pour le triangle suivant, nous avons d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned}AB^2 &= AC^2 + CB^2 \\ \Rightarrow AB &= \sqrt{AC^2 + CB^2} \\ \Rightarrow AB &= \sqrt{2.5^2 + 1.5^2} \\ \Rightarrow AB &= \sqrt{6.25 + 2.25} \\ \Rightarrow AB &= \sqrt{8.5} \text{ cm} \\ \Rightarrow AB &\approx 2.92 \text{ cm}\end{aligned}$$



Donc $AB = \sqrt{8.5} \text{ cm} \approx 2.92 \text{ cm}$.

Exercice 12. Considérons le triangle ABC rectangle en B . Nous savons que $AC = 5 \text{ cm}$ et que $BA = 3 \text{ cm}$. Quelle est la longueur de BC ?

Réciproque du théorème de Pythagore

Avant tout, que signifie le mot réciproque ? Dans la Propriété 6.2, nous avons vu que si un triangle est rectangle, alors nous pouvons en déduire quelque chose. La réciproque inverse ces deux parties de la proposition : si nous avons que cette deuxième partie, alors nous pouvons en déduire la première partie. Attention, la réciproque d'une proposition n'est pas toujours vraie. Dans le cas du théorème de Pythagore cependant, elle l'est. Nous avons alors le résultat suivant :

Propriété 13. Si dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle (en le sommet opposé au plus grand côté).

Contraposée du théorème de Pythagore

Propriété 14. Si dans un triangle, le carré du plus grand côté est différent de la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas rectangle.

6.3 Théorème de Thalès

Le théorème de Thalès est un autre théorème fondamental pour les relations entre distances au sein d'un triangle.

Cinquième partie

Probabilité et Statistique

La Probabilité est la branche de la mathématique qui étudie la probabilité (la “chance”) qu’un évènement se produise. La Statistique est la branche de la mathématique qui étudie des évènements à travers des informations incomplètes.

Sixième partie

Algorithmique

L'Algorithmique est la branche de la mathématique qui étudie les règles et le fonctionnement des algorithmes, soit des processus systématiques de résolution de problèmes.

Septième partie

Exercices

Chapitre 7

Exercices

7.1 Mardi 22 Décembre

Nombres Relatifs

Exercice 13. Effectue les calculs suivants.

$$A = 19 - 4$$

$$B = -17 + 8$$

$$C = 2 - 9$$

$$D = -8 - 6$$

$$E = 9 - 7 + (-3)$$

$$F = 8 \times (-4) + (-6)$$

$$G = -1.5 \times (-6 - 8)$$

$$H = 6 - 7 \times (-3)$$

Distribution et factorisation

Exercice 14. Distribue les expressions suivantes.

$$A = y(2 - x)$$

$$B = -b \times (5 - y + x)$$

$$C = (a - b)(6 - b)$$

$$D = (1.5 - zy)(y + 3)$$

Exercice 15. Factorise les expressions suivantes.

$$A = ac + ab$$

$$B = 25 + 5x$$

$$C = 7a + 21 - 56y$$

$$D = 8f - 18g + 6b$$

Équations

Exercice 16. Vérifie si $x = 1.5$ et $y = -7$ sont des solutions des équations suivantes.

$$A. 5x - y = \frac{1}{2}$$

$$B. x = y - 2$$

$$C. 4.2y = 27.9 + x$$

$$D. 6y = -5x$$

Exercice 17. Résout les équations suivantes.

- A. $6x = 9$
 B. $x - 52.3 = 8$

- C. $2x - 7 = 9$
 D. $9x - 4 = x$

7.2 Mercredi 23 Décembre

Exercice 18. Résout les équations suivantes :

- A. $x + 3 = 7$
 B. $2x - 5 = 6$
 C. $-x - 3 = 4$
 D. $-6x + 3 = -9$
 E. $4(x - 5) = -6$

- F. $\frac{3}{5} = \frac{x}{7}$
 G. $\frac{11}{4} = \frac{7}{x}$
 H. $\frac{4}{3}x + 6 = 10$
 I. $\frac{5}{2}x - \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$
 J. $\frac{1}{8}x - \frac{7}{5} = \frac{13}{20}$

Exercice 19. Résout les équations suivantes :

- A. $3x + 4 = 2x - 1$
 B. $x + 7 = 3 - 5x$
 C. $\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} = \frac{9}{5} - \frac{7}{3}x$
 D. $9x - \frac{5}{2} = 2x + \frac{5}{6}$

- E. $\frac{3}{7} \left(\frac{7}{3}x + 2 \right) = \frac{2}{3} \left(4 - \frac{7}{5}x \right)$
 F. $\frac{7}{3} - 5x + \frac{16}{9} = 2 - x + \frac{5}{6}$
 G. $\frac{-2x-5}{5} = \frac{3x-8}{4}$

Exercice 20. Résout les équations suivantes en appliquant la méthode du produit nul.

- A. $(5x - 2)(x + 6) = 0$
 B. $(3x + 4)(4x + 5) = 0$
 C. $(3x - 5)(-9x + 1) = 0$

- D. $\left(x - \frac{1}{2}\right) \left(2x + \frac{1}{3}\right) = 0$
 E. $\left(\frac{3}{5}x - 1\right) \left(\frac{8}{3}x + 2\right) = 0$

Exercice 21.

- A. $96 + -98x = -95$
 B. $95 + 31x = -5$
 C. $92 + 18x = -18$
 D. $-67 + 91x = 4$
 E. $-87 + 19x = -85$

- F. $-72 + 67x = -53$
 G. $53 + 46x = 1$
 H. $57 + 67x = 25$
 I. $41 + 19x = -49$
 J. $-58 + -72x = -49$

Exercice 22.

- A. $(-83x + -28)(9 + -58x) = 0$
 B. $(59x + 85)(-53 + 26x) = 0$
 C. $(-99x + -32)(71 + 13x) = 0$
 D. $(72x + 28)(-42 + -78x) = 0$
 E. $(30x + -75)(-26 + -6x) = 0$

- F. $(40x + -19)(-12 + -4x) = 0$
 G. $(-17x + 29)(18 + -27x) = 0$
 H. $(-35x + -89)(82 + -40x) = 0$
 I. $(96x + -16)(-9 + 32x) = 0$
 J. $(-98x + 88)(30 + -81x) = 0$

7.3 Nombres relatifs

Calculs automatisés : <https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2>

Exercice 23. Effectue les calculs suivants :

$$\begin{aligned}A &= 5 - 11 \\B &= -3 + 9 \\C &= -8 + 5 \\D &= -11 - 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= 7 - 12 \\F &= -4 + 2 \\G &= 6 + 5 \\H &= -6 - 7\end{aligned}$$

Exercice 24. Effectue les calculs suivants :

$$\begin{aligned}A &= -3.12 + 5.08 + 3.12 \\B &= 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= 8 - 9 + 8 - 7 + 7 - 8 + 9 - 6 \\D &= 2.3 - 1.8 + 3.7 - 1.2\end{aligned}$$

Exercice 25. Effectue les calculs suivants :

$$\begin{aligned}A &= (3 - 2) - (2 - 7) \\B &= 3 - (6 - 2) + (-5 + 2) \\C &= 4 + 3 - 2 - (3 + 4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= (-2 + 4) - (3 - 7) + 3 - 5 + 1 \\E &= 3 - (2 + 5) - (3 - 7) - 5 \\F &= 1 - 4 + (3 + 5) - (2 + 7) + 2\end{aligned}$$

Exercice 26. Effectue les calculs suivants :

$$\begin{aligned}A &= 5 \times (-3) \\B &= -9 \times 4 \\C &= -6 \times (-5) \\D &= 1.5 \times (-8)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= -6.3 \times (-7.8) \\F &= -3.9 \times 1.54 \\G &= 6.1 \times (-5.6)\end{aligned}$$

7.4 Équations

Simplification d'écriture

Exercice 27. Simplifie les expressions suivantes :

$$\begin{aligned}A &= 7x + 5x \\B &= 3y + 12y \\C &= 12a - 5a \\D &= x + 3x \\E &= x + x^2 + x + x + x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F &= 4x(-5 + 1) \\G &= -6(x - 5) \\H &= (a + b)(a + b) \\I &= 2 \times 3 \times a \times (b \times c) \\J &= y^2 + x^3 + x^2 + x \times x + 4x\end{aligned}$$

Distributivité et factorisation

Exercice 28. Distribue les calculs suivants, puis effectue les.

$$\begin{aligned}A &= 8 \times (17 + 8) \\B &= 5(20 - 7) \\C &= -3(7 - 5)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= (9 - 6) \times (-8) \\E &= (7 + 4) \times 3 \\F &= (11 + 9) \times (-2)\end{aligned}$$

Exercice 29. Distribue les expressions suivantes.

$$\begin{aligned} A &= x(y + z) \\ B &= -x(-2 + y) \\ C &= 4(x - y) \\ D &= z(f + (-y)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= hj(e - t) \\ F &= (7 - d)h \\ G &= (4 + r)(-t) \\ H &= (-b + 8)b \end{aligned}$$

Tester une égalité

Exercice 30. Calcule chacune des expressions suivantes pour $x = 1$ et $y = 4$.

$$\begin{aligned} A &= x^2 + x + y & C &= x^2y \\ B &= x^2 + 2xy + y^2 & D &= x^2 + y^2 \end{aligned}$$

Calcule chacune des expressions suivantes pour $x = 3$ et $y = 2$.

$$\begin{aligned} A &= xy + 4 & C &= xy - x - y + 4 \\ B &= x - y + 8 & D &= xyx \end{aligned}$$

Exercice 31. Vérifie si $x = 1$ et $y = 5$ sont des solutions des équations suivantes.

$$\begin{aligned} A. \quad x + y &= 6 & C. \quad 7 &= y - (-2) \\ B. \quad 2x - 4 &= y - 7 & D. \quad 8 &= 2x + y \end{aligned}$$

Résoudre une équation

Exercice 32. Résout les équations suivantes.

$$\begin{aligned} A. \quad x + 3 &= 12 & D. \quad 15 + 7x &= 2x \\ B. \quad \frac{x}{8} &= 16 & E. \quad 2x + 8 &= 6x \\ C. \quad -3x + 17 &= 21 - x & F. \quad 3(5x + 9) &= 4(7 + 5x) \end{aligned}$$

7.5 Samedi 2 Janvier

Exercice 33.

$$\begin{aligned} A. \quad 40 + 43x &= -53 & C. \quad 28 + -31x &= -42 \\ B. \quad 93 + -79x &= -33 & D. \quad -54 + -24x &= -27 \end{aligned}$$

Exercice 34.

$$\begin{aligned} A. \quad (-76x + 51)(41 + -60x) &= 0 & B. \quad (90x + -94)(87 + -14x) &= 0 \end{aligned}$$

Exercice 35. Calcule les résultats suivants :

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{9} & C &= \sqrt{4^2} \\ B &= \sqrt[3]{8} & D &= \sqrt{4} + \sqrt{2} \end{aligned}$$

Exercice 36. Simplifie les expressions suivantes :

$$A = a^b \times a^b$$

$$B = a^b \times a^{-b}$$

$$C = \sqrt[4]{x^3 \times x} \times x$$

Exercice 37. Une mère a 30 ans, sa fille a 4 ans. Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il le triple de celui de sa fille ?

Exercice 38. Un père dispose de 1600 € pour ses trois enfants. Il veut que l'aîné ait 200 € de plus que le second et que le second ait 100 € de plus que le dernier. Quelle somme doit-il donner à chacun ?

7.6 Dimanche 3 Janvier

Exercice 39. Calcule les résultats suivants.

$$A = \sqrt{25}$$

$$B = \sqrt{36}$$

$$C = \sqrt{-90}$$

$$D = \sqrt{81}$$

Exercice 40. Vrai ou faux ?

A. -7 est la racine carrée de 49

B. 9 est la racine carrée de 81

C. 900 a pour racine carrée 30

D. $\sqrt{6} \times \sqrt{6} = 6$

7.7 Semaine du 11 Janvier 2021

Exercice 41. Résout les équations suivantes :

A. $5(6x - 9) + 3 = 8x - 4$

B. $8x - 9 = 3(x - 1)$

C. $(5(x - 7) + 2)(8x - 4) = 0$

D. $\sqrt{25x^2} + 8 = -x$

Exercice 42. Simplifie les écritures suivantes :

$$A = a + 4(b - a) + 7b^2(a^3 - b)$$

$$B = (x^2 - 4 + 5x)(x - 1.5)$$

$$C = \sqrt{25x^2} \times \sqrt{81y} + \sqrt{14}$$

Exercice 43. Un père a 27 ans et son fils en a 3. Dans combien d'années l'âge du fils sera-t-il égal au quart de celui de son père ?

Exercice 44. Christophe est chargé d'organiser l'excursion de sa classe. Il calcule le prix du voyage à 11€ par personne. Un élève devant renoncer à participer à l'excursion, le prix s'élève finalement à 11,50€. Combien d'élèves compte la classe de Christophe ? Tu peux assumer que le prix total du voyage ne dépend pas du nombre d'étudiants qui viennent.

Exercice 45. Le triple d'un nombre diminué de 12 est 108. Quel est ce nombre ?