

Convergência de Operadores e o Teorema de Toeplitz

Alexandre do Amaral João Vitor Parada Poletto
Professor: José Carlos Corrêa Eidam

Universidade Federal do Paraná

20 de novembro de 2019



Convergência de sequências de operadores

Seja X e Y espaços normados. Uma sequência de operadores (T_n) de operadores $T_n \in B(X, Y)$ é dita:

- (1) **uniformemente operador convergente** se existe um operador $T : X \longrightarrow Y$ tal que $\|T_n - T\| \longrightarrow 0$.

Convergência de sequências de operadores

Seja X e Y espaços normados. Uma sequência de operadores (T_n) de operadores $T_n \in B(X, Y)$ é dita:

- (1) **uniformemente operador convergente** se existe um operador $T : X \longrightarrow Y$ tal que $\|T_n - T\| \longrightarrow 0$.
- (2) **fortemente operador convergente** se existe um operador $T : X \longrightarrow Y$ tal que $\|T_n x - Tx\| \longrightarrow 0$ para todo $x \in X$.

Convergência de sequências de operadores

Seja X e Y espaços normados. Uma sequência de operadores (T_n) de operadores $T_n \in B(X, Y)$ é dita:

- (1) **uniformemente operador convergente** se existe um operador $T : X \longrightarrow Y$ tal que $\|T_n - T\| \longrightarrow 0$.
- (2) **fortemente operador convergente** se existe um operador $T : X \longrightarrow Y$ tal que $\|T_n x - Tx\| \longrightarrow 0$ para todo $x \in X$.
- (3) **fracamente operador convergente** se existe um operador $T : X \longrightarrow Y$ tal que $|f(T_n x) - f(Tx)| \longrightarrow 0$ para todo $x \in X$ e para todo $f \in Y'$.

Convergência de sequências de operadores

Seja X e Y espaços normados. Uma sequência de operadores (T_n) de operadores $T_n \in B(X, Y)$ é dita:

- (1) **uniformemente operador convergente** se existe um operador $T : X \longrightarrow Y$ tal que $\|T_n - T\| \longrightarrow 0$.
- (2) **fortemente operador convergente** se existe um operador $T : X \longrightarrow Y$ tal que $\|T_n x - Tx\| \longrightarrow 0$ para todo $x \in X$.
- (3) **fracamente operador convergente** se existe um operador $T : X \longrightarrow Y$ tal que $|f(T_n x) - f(Tx)| \longrightarrow 0$ para todo $x \in X$ e para todo $f \in Y'$.

T é chamado o operador limite *uniforme, forte e fraco* de T_n , respectivamente.

Exemplos

No espaço l^2 nós consideramos a sequência (T_n) , onde $T_n : l^2 \rightarrow l^2$ é definido por:

$$T_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ zeros}}, \xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \xi_{n+3}, \dots);$$

com $x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in l^2$.

Exemplos

No espaço l^2 nós consideramos a sequência (T_n) , onde $T_n : l^2 \rightarrow l^2$ é definido por:

$$T_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ zeros}}, \xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \xi_{n+3}, \dots);$$

com $x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in l^2$. Este operador é linear e limitado e é fortemente convergente para 0 mas não é uniformemente convergente.

Exemplos

Ainda no espaço l^2 , uma outra sequência T_n de operadores $T_n : l^2 \rightarrow l^2$ é definida por:

$$T_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ zeros}}, \xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots);$$

com $x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in l^2$.

Ainda no espaço l^2 , uma outra sequência T_n de operadores $T_n : l^2 \rightarrow l^2$ é definida por:

$$T_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ zeros}}, \xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots);$$

com $x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in l^2$. O operador T_n é linear e limitado e mostraremos que ele é fracamente operador convergente para 0 mas não fortemente. Para isso recorramos ao Teorema de Riesz.

Teorema de Riesz (Funcionais no espaço de Hilbert)

Todo funcional linear f em um espaço de Hilbert pode ser representado em termos do produto interno, chamado:

$$f(x) = \langle x, z \rangle$$

onde z depende de f , é unicamente determinado pelo funcional e tem norma:

$$\|z\| = \|f\|$$

Exemplos

Qualquer funcional $f \in l^2$ pode ser escrito como

$$f(x) = \langle x, z \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \xi_j \bar{\eta}_j$$

onde $z = (\eta_j) \in l^2$.

Exemplos

Qualquer funcional $f \in l^2$ pode ser escrito como

$$f(x) = \langle x, z \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \xi_j \bar{\eta}_j$$

onde $z = (\eta_j) \in l^2$. Desta forma, chamando $j = n + k$

$$f(T_n x) = \langle T_n x, z \rangle = \sum_{j=n+1}^{\infty} \xi_{j-n} \bar{\eta}_j = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \bar{\eta}_{n+k}$$

Exemplos

Qualquer funcional $f \in l^2$ pode ser escrito como

$$f(x) = \langle x, z \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \xi_j \bar{\eta}_j$$

onde $z = (\eta_j) \in l^2$. Desta forma, chamando $j = n + k$

$$f(T_n x) = \langle T_n x, z \rangle = \sum_{j=n+1}^{\infty} \xi_{j-n} \bar{\eta}_j = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \bar{\eta}_{n+k}$$

Usando a desigualdade de Holder para somas, temos que:

$$\begin{aligned} |f(T_n x)| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \bar{\eta}_{n+k} \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k \bar{\eta}_{n+k}| \leq \\ &\left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{m=n+1}^{\infty} |\eta_m|^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

Elevando ambos os lados ao quadrado:

$$|f(T_n x)|^2 = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2 \right) \left(\sum_{m=n+1}^{\infty} |\xi_m|^2 \right)$$

Como o lado direito da desigualdade vai a 0, temos que $f(T_n x) \rightarrow 0$. Consequentemente, (T_n) é fracamente operador convergente para 0.

Elevando ambos os lados ao quadrado:

$$|f(T_n x)| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2 \right) \left(\sum_{m=n+1}^{\infty} |\xi_m|^2 \right)$$

Como o lado direito da desigualdade vai a 0, temos que $f(T_n x) \rightarrow 0$. Consequentemente, (T_n) é fracamente operador convergente para 0.

Porém $T_n x$ não é fortemente operador convergente, basta considerarmos a sequência $x = (1, 0, 0, \dots)$

Convergência de funcionais

E sobre convergência de funcionais?

E sobre convergência de funcionais?

Como funcionais são operadores lineares, as definições citadas anteriormente se aplicam. Além disso, para uma sequência de funcionais, convergência operador forte e fraca são equivalentes, basta relembrar o seguinte teorema:

Teorema (convergência forte e fraca)

Seja (x_n) uma sequência em um espaço normado de dimensão X . Então

- a) Convergência forte implica convergência fraca com o mesmo limite.
- b) A recíproca de a não é sempre verdadeira.
- c) **Se $\dim X \leq \infty$, convergência fraca implica convergência forte.**

Convergência de funcionais

Para uma sequência de funcionais f_n temos que $f_n x \in F$ para todo $x \in X$.

Convergência de funcionais

Para uma sequência de funcionais f_n temos que $f_n x \in F$ para todo $x \in X$.

Então, assumindo que exista um funcional f para o qual a sequência de funcionais converge fracamente significa que para cada $x \in X$ e $g \in F'$, temos que: $\|f_n - f\| \longrightarrow 0 \iff |g(f_n x) - g(fx)|$ pelo item c do teorema anterior.

Convergência de funcionais

Para uma sequência de funcionais f_n temos que $f_n x \in F$ para todo $x \in X$.

Então, assumindo que exista um funcional f para o qual a sequência de funcionais converge fracamente significa que para cada $x \in X$ e $g \in F'$, temos que: $\|f_n - f\| \longrightarrow 0 \iff |g(f_n x) - g(fx)|$ pelo item c do teorema anterior.

Por esse motivo, há as seguintes definições:

Convergência de funcionais

Definição (forte e fraca* convergência de uma sequência de funcionais)

Seja f_n uma sequência de funcionais lineares limitados no espaço normado X . Então:

- (a) Convergência forte de f_n significa que existe um $f \in X'$ tal que $\|f_n - f\| \rightarrow 0$. Escrevemos:

$$f_n \rightarrow f.$$

Convergência de funcionais

Definição (forte e fraca* convergência de uma sequência de funcionais)

Seja f_n uma sequência de funcionais lineares limitados no espaço normado X . Então:

- (a) Convergência forte de f_n significa que existe um $f \in X'$ tal que $\|f_n - f\| \rightarrow 0$. Escrevemos:

$$f_n \rightarrow f.$$

- (b) Convergência fraca* de f_n significa que existe um $f \in X'$ tal que $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X$. Escrevemos:

$$f_n \xrightarrow{w^*} f$$

Convergência de funcionais

Definição (forte e fraca* convergência de uma sequência de funcionais)

Seja f_n uma sequência de funcionais lineares limitados no espaço normado X . Então:

- (a) Convergência forte de f_n significa que existe um $f \in X'$ tal que $\|f_n - f\| \rightarrow 0$. Escrevemos:

$$f_n \rightarrow f.$$

- (b) Convergência fraca* de f_n significa que existe um $f \in X'$ tal que $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X$. Escrevemos:

$$f_n \xrightarrow{w^*} f$$

f em (a) e (b) é chamado limite forte e limite fraco* de f_n , respectivamente.

Convergência de operadores

Voltando para convergência de operadores $T_n \in B(X, Y)$ o que pode ser dito do operador limite?

Convergência de operadores

Voltando para convergência de operadores $T_n \in B(X, Y)$ o que pode ser dito do operador limite?

Em primeiro lugar, convergência uniforme implica que $T : X \longrightarrow Y$ nas definições anteriores é limitado.

Convergência de operadores

Voltando para convergência de operadores $T_n \in B(X, Y)$ o que pode ser dito do operador limite?

Em primeiro lugar, convergência uniforme implica que $T : X \longrightarrow Y$ nas definições anteriores é limitado.

Em segundo lugar, se a convergência é forte ou fraca o operador ainda é linear, mas não necessariamente limitado.

Exemplo

O espaço X das sequências $x = (\xi_j)$ no l^2 com somente finitos termos não nulos, na métrica do l^2 não é completo.

Exemplo

O espaço X das sequências $x = (\xi_j)$ no l^2 com somente finitos termos não nulos, na métrica do l^2 não é completo.

É possível construir uma sequência de operadores nesse espaço que converge fortemente para um operador ilimitado.

Exemplo

O espaço X das sequências $x = (\xi_j)$ no l^2 com somente finitos termos não nulos, na métrica do l^2 não é completo.

É possível construir uma sequência de operadores nesse espaço que converge fortemente para um operador ilimitado.

Tal sequência é:

$$T_n x = (\xi_1, 2\xi_2, 3\xi_3, \dots, n\xi_n, \xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots).$$

Exemplo

O espaço X das sequências $x = (\xi_j)$ no l^2 com somente finitos termos não nulos, na métrica do l^2 não é completo.

É possível construir uma sequência de operadores nesse espaço que converge fortemente para um operador ilimitado.

Tal sequência é:

$$T_n x = (\xi_1, 2\xi_2, 3\xi_3, \dots, n\xi_n, \xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots).$$

Porém, se X é completo, convergência operador forte implica que o limite dos operadores é um operador limitado.

Lema (Convergência forte de operadores)

Seja $T_n \in B(X, Y)$ uma sequência de operadores, onde X é um espaço de Banach e Y é um espaço normado. Se T_n é fortemente operador convergente com limite T , então $T \in B(X, Y)$.

Lema (Convergência forte de operadores)

Seja $T_n \in B(X, Y)$ uma sequência de operadores, onde X é um espaço de Banach e Y é um espaço normado. Se T_n é fortemente operador convergente com limite T , então $T \in B(X, Y)$.

Demonstração: A linearidade de T segue direto da linearidade de T_n .

Lema (Convergência forte de operadores)

Seja $T_n \in B(X, Y)$ uma sequência de operadores, onde X é um espaço de Banach e Y é um espaço normado. Se T_n é fortemente operador convergente com limite T , então $T \in B(X, Y)$.

Demonstração: A linearidade de T segue direto da linearidade de T_n .

Como $T_n x \rightarrow Tx$ para cada $x \in X$, segue que a sequência $(T_n x)$ é limitada para cada x , visto que toda sequência convergente é limitada.

Lema (Convergência forte de operadores)

Como X é completo, $(\|T_n\|)$ é limitado pelo teorema da limitação uniforme. Digamos então que $(\|T_n\|) \leq c$ para todo n . Daí segue o resultado anunciado. ■

Métodos de Somabilidade

Com intuito de generalizar a noção de convergência de sequencias podemos utilizar métodos de somabilidade, que associam uma sequencia com outra possivelmente convergente.

Métodos matriciais

Um método de somabilidade é nomeado matricial se é possível escreve-lo na forma:

$$y = Ax$$

Onde y e x são vetores coluna infinitos e A é uma matriz infinita.

Método de Cesàro

Definição

O método de Cesàro é a criação de uma nova sequência utilizando os a media dos n primeiro termos da sequência e tomando o valor que esta sequência converge para como o valor que a sequência original converge.

Representação em somatório

Dada uma sequência $x = (\xi_n)_n$ temos que $y = (\eta_n)_n$ é tal que

$$\eta_n = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk} \xi_k$$

$$\alpha_{nk} = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } k \leq n \\ 0 & \text{se } k > n \end{cases}$$

Representação matricial do método de Cesàro

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \\ \vdots & & & & \ddots & \end{bmatrix}$$

Um método matricial pode ser chamado de A-método, se todas as linhas e $y = (\eta_n)_n$ convergem no sentido usual, o limite é denominado A-limite de x e x é dito A-somável, a conjunto de todas as sequencias somáveis é denominado A-domínio.

Regularidade

Um método matricial é dito regular se toda sequencia convergente pertence ao seu domínio e seu A-limite coincide com o limite usual da sequencia.

Um método matricial é regular se e somente se,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_{nk} = 0 \quad (1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk} = 1 \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_{nk}| \leq \gamma \quad (3)$$

Regularidade \implies Equação (1)

Dada a sequência x_k com todo termo igual a 0 exceto o termo k que é igual a 1, temos que $\eta_n = \alpha_{nk}$

Regularidade \implies Equação (2)

Dada a sequência x com todo termo igual a 1 temos que

$$\eta_n = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk}$$

Regularidade \implies Equação (3)

Dado o espaço métrico c com a norma do ℓ^∞ definimos funcionais lineares

$$f_{nm}(x) = \sum_{k=1}^m \alpha_{nk} \xi_k \quad m, n = 1, 2, \dots$$

então temos que o método define funcionais lineares

$$\eta_n = f_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk} \xi_k \quad n = 1, 2, \dots$$

$$f_{nm}(x) \rightarrow f_n(x) \quad \text{ou seja} \quad f_{nm} \xrightarrow{w^*} f_n$$

Regularidade \implies Equação (3)

$$\xi_k^{(n,m)} = \begin{cases} \frac{\alpha_{nk}}{|\alpha_{nk}|} & \text{se } k \leq m \text{ e } \alpha_{nk} \neq 0 \\ 0 & \text{se } k > m \text{ ou } \alpha_{nk} = 0 \end{cases}$$

então temos

$$\sum_{k=1}^m |\alpha_{nk}| = f_{nm}(x_{nm}) \leq \|f_{nm}\|$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_{nk}| \leq \|f_n\| \leq \gamma$$

Equações (1), (2), (3) \implies Regularidade

Definimos o funcional linear

$$f(x) = \xi = \lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k$$

que é limitado pois

$$|f(x)| \leq \|x\|$$

Dado o conjunto M das sequencias quase constantes, que é denso, e $x \in M$ com todo termo igual apos j

Equações (1), (2), (3) \implies Regularidade

$$\begin{aligned}\eta_n = f_n(x) &= \sum_{k=1}^{j-1} \alpha_{nk} \xi_k + \xi \sum_{k=j}^{\infty} \alpha_{nk} \\ &= \sum_{k=1}^{j-1} \alpha_{nk} (\xi_k - \xi) + \xi \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk}\end{aligned}$$

Pelas Equações (1), (2)

$$\eta_n = f_n(x) \rightarrow 0 + \xi * 1 = \xi = f(x)$$

Equações (1), (2), (3) \implies Regularidade

E pela Equação (3) temos

$$|f_n(x)| \leq \|x\| \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_{nk}| \leq \gamma \|x\|$$

então f_n é limitado, e como $f_n(x) \rightarrow f(x)$, $x \in M$ temos $f_n \xrightarrow{w^*} f$
então se $f(x)$ existe $\eta_n \rightarrow \xi$ e portanto é regular.