$\boxed{\Gamma \vdash t \sim_{\mathrm{h}} t' \rhd T}$ Neutrals t and t' are comparable, inferring the reduced type T

$$\textsc{NRed}\ \frac{\Gamma \vdash n \sim n' \rhd T \qquad T \rightsquigarrow^{\star} S}{\Gamma \vdash n \sim_{\mathrm{h}} n' \rhd S}$$

$\boxed{\Gamma \vdash t \sim t' \rhd T}$ Neutrals t and t' are comparable, inferring the type T

$$\textsc{NVar}\ \frac{(x{:}T) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x \sim x \rhd T} \qquad \textsc{NApp}\ \frac{\Gamma \vdash n \sim_{\mathrm{h}} n' \rhd \Pi\, x{:}A.B \qquad \Gamma \vdash u \cong u' \lhd A}{\Gamma \vdash n\ u \sim n'\ u' \rhd B[u]}$$

$$\textsc{NSig}_1\ \frac{\Gamma \vdash n \sim_{\mathrm{h}} n' \rhd \Sigma\, x{:}A.B}{\Gamma \vdash \pi_1\ n \sim \pi_1\ n' \rhd A} \qquad \textsc{NSig}_2\ \frac{\Gamma \vdash n \sim_{\mathrm{h}} n' \rhd \Sigma\, x{:}A.B}{\Gamma \vdash \pi_2\ n \sim \pi_2\ n' \rhd B[\pi_1\ n]}$$

$$\textsc{NNatElim}\ \frac{\begin{array}{c}\Gamma \vdash n \sim n' \rhd \mathbb{N} \qquad \Gamma, x{:}\mathbb{N} \vdash P \cong P' \lhd \\ \Gamma \vdash b_0 \cong b_0' \lhd P[0] \qquad \Gamma, x{:}\mathbb{N}, y{:}P[n] \vdash b_{\mathrm{S}} \cong b_{\mathrm{S}}' \lhd P[\mathrm{S}(n)]\end{array}}{\Gamma \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{N}}(n, x.P, b_0, x.y.b_{\mathrm{S}}) \sim \mathrm{rec}_{\mathbb{N}}(n', x.P', b_0', x.y.b_{\mathrm{S}}') \rhd P[n]}$$

$$\textsc{NEmptyElim}\ \frac{\Gamma \vdash n \sim_{\mathrm{h}} n' \rhd \bot \qquad \Gamma, x{:}\bot \vdash P \cong P' \lhd}{\Gamma \vdash \mathrm{rec}_{\bot}(n, x.P) \sim \mathrm{rec}_{\bot}(n', x.P') \rhd P[s]}$$

$$\textsc{NIdInd}\ \frac{\begin{array}{c}\Gamma \vdash n \sim_{\mathrm{h}} n' \rhd \mathbb{Id}(A'', a'', b'') \\ \Gamma, x{:}A, y{:}\mathbb{Id}(A, a, x) \vdash P \cong P' \lhd \qquad \Gamma \vdash h \cong h' \lhd P[a, \mathrm{refl}_{A,a}]\end{array}}{\Gamma \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{Id}(A,a,\cdot)}(n, x.y.P, h) \sim \mathrm{rec}_{\mathbb{Id}(A',a',\cdot)}(h', x.y.z.P', x.h') \rhd P[b'']}$$